



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人は使用しないでください。

本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群） 中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様水ぶくれ等の激しい症状が全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状が良くならない場合

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去。

用法・用量 次の量を使用してください。

口の中に含み、かまずにできるだけゆっくり溶かして使用してください。

年 齢	1 回 量	1日使用回数
大人（15歳以上）	1個	4～5回
5歳以上 15歳未満	1個	2～3回
5歳未満	使用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。

成分・分量 5個（大人1日量）中

成 分	含 量
塩化セチルピリジニウム	5.0mg
グリチルリチン酸二カリウム	15.0mg
塩化リゾチーム	37.5mg（力価）
セネガ乾燥エキス（原生薬換算量）	23.95mg（400mg）

添加物：白糖、炭酸 Ca、デキストリン、ショ糖脂肪酸エステル、ポビドン、ステアリン酸 Mg、ℓ-メントール、香料、黄色 5 号

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。