

生後3ヶ月頃 お腹・背中などに皮膚炎発症
 →以来、リンデロンVG(強度/Strong)等のステロイド剤使用
 →2002年4月中旬(1才半)、全身がひどい状態で、入院(2週間)し、ステロイド剤ODT(密封法)を行い、驚く程にキレイになる



2002年6月1日
 退院後、約1ヶ月すると、ODTを行わなかった、顔と手の指先に再発



2002年7月27日
 症状の出ている部位にステロイド剤を塗り、綺麗な肌になりました。異常に白く(血色がなくなる)のが、ステロイド剤で(一時的)快方する特長です。毛細血管が収縮される証です。



2003年1月下旬
 退院後、約半年、ステロイド剤を塗り続けた結果、強い薬剤であるネリゾナ(強度/Very Strong)さえも効かなくなり、全身に発症。



2003年2月26日
 全ての薬剤(別紙参照)をストップし、HMSを開始した日です。



2003年4月3日
 薬剤をストップして、約1ヶ月後。予想はしてたとはいえ、まるで全身ヤケドのようなリバウンドが発現してしまいました。



2004年2月13日
 ジュクジュクが乾いてきて良い状態



2003年11月6日



2003年11月6日



2003年10月8日



2003年9月14日



2004年6月22日
 我が子にステロイド剤を塗っていたお母さんにもリバウンド発現



2004年7月17日
 リバウンドは広がり首や背中にも症状が出てきました。



2004年9月26日
 治まってきましたが、この後もリバウンドは繰り返します。



2004年12月10日
 美人なお母さん似の、穏やかな表情が出るようになり、とても良い状態。「このまま、キレイになって！」と、皆が祈りましたが、この後もリバウンドは繰り返します。



次号に続く