4 直線の方程式 (数学)

数学と測量では、 y 軸 $\times$ 軸が逆となるので、ここでは軽くおさらいとしておきましょう。

(1) 傾き a 、切片 b の直線

傾きが a であり、 y 軸上の b (切片) を通る直線の方程式は、次のように表される。

$$y = ax + b \dots$$

a : 傾き

b : 切片

たとえば、生まれたばかりの赤ん坊の身長は b cm であった。1年に a cm ずつ成長したとすると、 x 年後には何 (y) cm でしょう。ということである
具体的に $b = 40$ cm、 $a = 5$ cm とした場合、10年後には

$$\begin{aligned} y &= 5x + 40 \\ &= 5 \times 10 + 40 \\ &= 90 \text{ cm} \quad \text{である。} \end{aligned}$$

傾き a は、

$$a = \frac{y}{x}$$

であり、 x 軸からの角度 α とすると、
 $a = \tan \alpha$ である。

したがって、上記の 式は

$$y = \frac{y}{x} x + b \quad \dots \quad \text{あるいは、}$$

$$y = \tan \alpha x + b \quad \dots \quad \text{ということができる。}$$

ところでbは、 (x_1, y_1) を通るときに、式に代入しても成り立つので

$$y = a x + b \quad \dots$$

$$y_1 = a x_1 + b$$

したがって $b = y_1 - a x_1$ これを再度 式に代入すると

$$y = a x + (y_1 - a x_1) \quad \text{である。}$$

先の事例で確認すると、1年で5cm伸びる子が10年後に90cmであるとき、生まれたとき何**(b)** cmか。 $(x_1, y_1) = (10, 90)$

$$b = 90 - 10 \times 5 = 40 \text{cm}$$

(2) 点 (x_1, y_1) を通る傾き a、切片 b とする直線式

式に (x_1, y_1) を代入すると、

$$y_1 = a x_1 + b \quad \dots\dots$$

式 - 式 とすると、

$$y = a x + b$$

$$-) y_1 = a x_1 + b$$

$$y - y_1 = a (x - x_1)$$

である。つまり、

(x_1, y_1) を通り、傾き a の直線式は、

$$\boxed{y - y_1 = a (x - x_1)} \quad \text{覚える}$$

である。

(3) 2点 (x_1, y_1) (x_2, y_2) を通る直線

2点 (x_1, y_1) (x_2, y_2) とする

とき、任意の $P(x, y)$ とするとき、

右図から

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

であるので、これを变形すると

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \dots$$

覚える

である。つまり 式の a を入れ替えた式である。

例題

2点 $(-2, 8)$ $(4, 2)$ を通る直線式を求めよ。

解説

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

に代入すると、

$$\begin{aligned} y - 8 &= \frac{2 - 8}{4 + 2} (x + 2) \\ &= -1 (x + 2) + 8 \\ &= -x + 6 \end{aligned}$$

である。グラフにすると次のようになる。

(4) 2直線の平行と直交

次の2つの直線があるとき、

$$y = ax + b \quad \dots$$

$$y = a'x + b' \quad \dots$$

2直線の平行

2つの直線が平行であるということは、傾き a が等しいということである。

つまり、 $a = a'$ が平行な2直線の条件である。 b がどんな値をとっても平行である。

2直線の直交

2つの直線が直交するためには、

$$a \cdot a' = -1 \text{ である。}$$

なぜなら、右図において直角であるとピタゴラスの定理から、

$$(a - a')^2 = (1^2 + a^2) \cdot (1^2 + a'^2) \text{ で}$$

あり、整理すると、

$$a \cdot a' = -1 \text{ である。}$$

(5) 2直線の交点

2つの直線

$$y = ax + b \quad \dots$$

$$y = a'x + b' \quad \dots$$

があるとき、2つの式を同時に満足する点 (x_0, y_0) が、交点 P である。

式 - 式

$$\begin{aligned} y &= ax + b \\ -) y &= a'x + b' \\ \hline 0 &= (a - a')x + (b - b') \\ (a' - a)x &= b - b' \end{aligned}$$

$$x_0 = \frac{b - b'}{a' - a} \quad \text{である。}$$

これを、式に代入し

$y_0 = a x_0 + b$ として、 y を求めることができる。

たとえば、 $y = -x + 6$

$$y = x + 2$$

とする、2つの直線の交点は、

$$\begin{array}{r} y = -x + 6 \\ -) y = x + 2 \\ \hline 0 = -2x + 4 \\ x = 2 \\ y = -2 + 6 = 4 \end{array}$$

交点は $(2, 4)$ である。

5 円の方程式 (数学)

原点 $O(0, 0)$ 中心とする半径 r を通る $P(x, y)$ は、

図のように O から常に r の距離に存する点 P の集まりであるから、

$$x^2 + y^2 = r^2$$

で表される。

また、 (a, b) を中心とする、半径 r の式は、

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

である。

たとえば、 $(3, 2)$ を中心とする半径5の式は、

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 5^2 \text{ である。}$$

6 2次関数と2次方程式

$y = x^2 + 1$ のように、変数 x が自乗であるとき2次関数という。

2次関数のグラフは

$$y = a(x - p)^2 + q \quad \text{と}$$

するとき (p, q) を頂点、

$y = ax^2$ とする、グラフの平行移動をしたものである。

たとえば、 $y = (x - 2)^2 - 9$ は右図のとおりである。

一般に2次関数は、その次数の高い係数から順に並べ、

$$y = ax^2 + bx + c$$

と表す。

このとき、 $y = 0$ とするとき、2次方程式という。

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$y = 0$ とするとき x 軸上に図から2個存在することが分かる。

2次方程式を $(x - e)(x - f) = 0$ のように因数に分解したとき e, f である。因数に分解することが難しいので、次式をもちいる。

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

たとえば、 $y = (x - 2)^2 - 9$ は、 $y = x^2 - 4x - 5$ であり

$a = 1, b = -4, c = -5$ として上式に代入すると

$$x = \frac{+4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \times 1 \times (-5)}}{2 \times 1}$$

$= +5$ 、又は -1 である。グラフの x 軸上の点である。

先の2次方程式の解を証明すると次のとおりである。

証明 $ax^2 + bx + c = 0$ $a \neq 0$ のとき、両辺を a で割ると、

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 - \left[\frac{b}{2a}\right]^2 \text{ であるので、}$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 - \left[\frac{b}{2a}\right]^2 + \frac{c}{a} = 0$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

7 複素数 (complex number)

正の数の平方根を求めることができるが、通常は0未満の平方根を求めることできない。たとえば $\sqrt{-1}$ である。そこで $i^2 = -1$ と定義し、 $\sqrt{-1} = 1i$ 、 $\sqrt{-2} = 2i$ というように表す。

この i を用いた数 $a+bi$ (a, b は実数) を複素数という。 a を実部、 b を虚部という。

これを平面上に表すと次のようになる。

平面位置は、実軸 (x) に実部 a をとり、虚軸 (y) に虚部 b をとったときの交点である。原点 O と Z までの距離 r 、 X 軸と OZ の直線に挟まれる角 θ を偏角といい、

$$Z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\text{なぜなら、 } a = r \cdot \cos \theta \text{、 } b = r \cdot \sin \theta$$

である。このとき、極座標形式では

$$Z = (r, \theta)$$

と表す。

複素数の加減算

複素数の加減算は、次のように計算する。

$$P = (a+bi) + (c+id) = (a+c) + (b+d)i$$

$$Q = (a+bi) - (c+id) = (a-c) + (b-d)i$$

つまり、実部と虚部をそれぞれ加減すればよい。加算の式は平面上では次のとおりである。

$a+bi$ であるときの距離 r_1 、偏角 θ_1 を (r_1, θ_1) 、 $c+id$ とするととき距離 r_2 、偏角 θ_2 (r_2, θ_2)とするととき、原点OとPの距離を r 、その偏角を θ とするととき、極座標形式で表すと

$$(r_1, \theta_1) + (r_2, \theta_2) = (r, \theta) \\ = (a+c) + (b+d)i$$

である。そのとき原点OからPまでの距離 r と偏角 θ は

$$r = \sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2}$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{b+d}{a+c} \right)$$

である。

測定の計算では、虚数を取り扱う複素数では計算しないが、偏角 を方向角、 a を x 座標、 b を y 座標と置き換えることによって、関数電卓の複素数機能を利用することができる。

8 弧度法 (ラジアン)

ラジアンは、円周上でその円の半径1と同じ長さの弧となる2本の半径が成す角と定義される。度数法で測った360度は、弧度法においては2 ラジアンになる。

よって、1ラジアンは、 $360^\circ = 2 \pi$ であり

$$1 \text{ ラジアン} = 360^\circ \div 2\pi$$

57.29578度

3437分

206265秒

である

(応用については、 をみよ。)