

Fludiazepam 用藥指導單張

★ 規格：0.25 mg/tablet

★ 醫師為什麼會開此藥？

Fludiazepam 作用有舒緩焦慮、安眠、肌肉鬆弛等。有時候此藥還有用於其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

★ 此藥該如何服用？

Fludiazepam 通常在睡前服用。服用次數及每次劑量請遵照醫師的指示用藥，如果對於藥品有任何疑問，應詢問醫師或藥師。如果服藥後還是有睡眠障礙請告訴醫師，醫師會判斷這藥品是否適合您。服用此藥可能會有依賴性，未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。不要服用超過四個禮拜或者是未經醫師指示突然停藥，突然停藥的話可能會造成戒斷症狀(焦慮、失眠、易怒)，因此如果要停藥時，醫師通常會慢慢減低藥品的劑量。在慢慢停藥的第一天及第二天可能會睡眠困難。

★ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

1. 是否對 Fludiazepam、alprazolam(Xanax)、chlordiazepoxide(Librium, Librax)、clonazepam(Klonopin)、clorazepate(Tranxene)、diazepam(Valium)、estazolam(ProSom)、lorazepam、(Ativan)、oxazepam(Serax)、prazepam(Centrax)、temazepam(Restoril)、triazolam(Halcion)或其他藥品過敏。

2. 您正在使用的藥品(包括非處方藥)，尤其是抗凝血藥抗過敏藥、cimetidine(Tagamet)、digoxin(Lanoxin)、disulfiram(Antabuse)、isoniazid(INH, Laniazid, Nydrazid)、抗憂鬱劑、癲癇用藥、帕金森症用藥、氣喘用藥、肌肉鬆弛劑、口服避孕藥、probenicid(Benemid)、rifampin(Rifadin)、鎮靜劑、安眠藥、Theophylline、vitamins。這些藥品可能會加強藥品安眠的作用

3. 是否您目前或曾有過青光眼、癲癇、肝臟、肺臟、心臟的問題。

4. 如果您將進行手術(包含牙科手術)，記得告訴醫師或牙醫師您正在使用的藥品。

5. 請告訴醫師您是否有懷孕、計畫懷孕或是有哺乳行為。若在使用期間懷孕，務必告訴醫師。

6. 如果有喝抽菸要告訴醫生，香菸可能會降低藥品的作用。

7. 您必須知道這個藥品可能會導致嗜睡，在您清楚藥品可能對您的影響前不要開車或使用危險儀器。

服用藥品後，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師
衛生福利部苗栗醫院藥品諮詢電話 037-261920 轉 2142

8. 酒精會加重藥品導致的嗜睡作用，服用此藥期間請勿飲酒。

★ 當忘記服用一個劑量時，我該怎麼辦呢？

按時服用下次的劑量，不要補服遺漏的劑量。

★ 此藥會造成什麼副作用？我該怎麼做？

一般副作用：頭痛、胃灼熱、腹瀉、頭暈、嗜睡、虛弱、口乾。

若是有以下的症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請儘快通知您的醫師：便秘、排尿不順、頻尿、視線模糊。

若您有下列任何一種症狀，請立刻就醫：抽筋、言語困難、紅疹、震顫、發熱、呼吸吞嚥困難、皮膚癢、眼睛皮膚發黃、心跳不正常。

★ 此藥儲存時的條件為何？

將藥品存放於容器中緊鎖，並置於小孩子拿不到的地方。將藥品儲存在室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)和直接的陽光照射。將過期或不再需要的藥品丟棄。尋問藥師如何適當地處理此藥。

★ 我還應該知道什麼其他資訊？

要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查來確定你對於藥品的反應，必要時讓醫生為您調整劑量。此外不要讓任何人服用您的藥品。