

試験問題の作成に関する手引き

(令和4平成30年3月)

目次

第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 .....	111
I 医薬品概論 .....	111
1) 医薬品の本質 .....	111
2) 医薬品のリスク評価 .....	2
3) 健康食品 .....	333
4) セルフメディケーションへの積極的な貢献 .....	444
II 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 .....	555
1) 副作用 .....	555
2) 不適正な使用と副作用 .....	777
3) 他の医薬品や食品との相互作用、飲み合わせ .....	888
4) 小児、高齢者等への配慮 .....	101010
5) プラセボ効果 .....	141414
6) 医薬品の品質 .....	141414
III 適切な医薬品選択と受診勧奨 .....	151515
1) 一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲 .....	151515
2) 販売時のコミュニケーション .....	161616
IV 薬害の歴史 .....	171717
1) 医薬品による副作用等に対する基本的考え方 .....	171717
2) 医薬品による副作用等にかかる主な訴訟 .....	181818
第2章 人体の働きと医薬品 .....	222222
I 人体の構造と働き .....	222222
1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官 .....	222222
1) 消化器系 .....	222222
2) 呼吸器系 .....	272727
3) 循環器系 .....	282828
4) 泌尿器系 .....	323232
2 目、鼻、耳などの感覚器官 .....	333333
1) 目 .....	333333
2) 鼻 .....	353535
3) 耳 .....	353535

3 皮膚、骨・関節、筋肉などの運動器官 .....	363636
1) 外皮系 .....	363636
2) 骨格系 .....	383838
3) 筋組織 .....	383838
4 脳や神経系の働き .....	393939
1) 中枢神経系 .....	393939
2) 末梢神経系 .....	404040
<b>II 薬が働く仕組み</b> .....	<b>414141</b>
1) 薬の生体内運命 .....	414141
2) 薬の体内での働き .....	444444
3) 剤形ごとの違い、適切な使用方法 .....	454545
<b>III 症状からみた主な副作用</b> .....	<b>474747</b>
1 全身的に現れる副作用 .....	484848
1) ショック（アナフィラキシー） .....	484848
2) 重篤な皮膚粘膜障害 .....	484848
3) 肝機能障害 .....	494949
4) 偽アルドステロン症 .....	505050
5) 病気等に対する抵抗力の低下等 .....	505050
2 精神神経系に現れる副作用 .....	515151
1) 精神神経障害 .....	515151
2) 無菌性髄膜炎 .....	515151
3) その他 .....	515151
3 体の局所に現れる副作用 .....	525252
1) 消化器系に現れる副作用 .....	525252
2) 呼吸器系に現れる副作用 .....	535353
3) 循環器系に現れる副作用 .....	545454
4) 泌尿器系に現れる副作用 .....	545454
5) 感覚器系に現れる副作用 .....	555555
6) 皮膚に現れる副作用 .....	565656
<b>第3章 主な医薬品とその作用</b> .....	<b>595959</b>
<b>I 精神神経に作用する薬</b> .....	<b>595959</b>
1 かぜ薬 .....	595959
1) かぜの諸症状、かぜ薬の働き .....	595959
2) 主な配合成分等 .....	606060

3) 主な副作用、相互作用、受診勧奨	656565
2 解熱鎮痛薬	676767
1) 痛みや発熱が起こる仕組み、解熱鎮痛薬の働き	676767
2) 代表的な配合成分等、主な副作用	676767
3) 相互作用、受診勧奨	747474
3 眠気を促す薬	757575
1) 代表的な配合成分等、主な副作用	757575
2) 相互作用、受診勧奨等	787878
4 眠気を防ぐ薬	797979
1) カフェインの働き、主な副作用	797979
2) 相互作用、休養の勧奨等	808080
5 鎮 <sup>うん</sup> 蕈薬 (乗物酔い防止薬)	818181
1) 代表的な配合成分、主な副作用	818181
2) 相互作用、受診勧奨等	838383
6 小児の <sup>かん</sup> 瘡を適応症とする生薬製剤・漢方処方製剤 (小児鎮静薬)	848484
1) 代表的な配合生薬等、主な副作用	848484
2) 相互作用、受診勧奨	868686
<b>II 呼吸器官に作用する薬</b>	868686
1 <sup>せま</sup> 咳止め・ <sup>たん</sup> 痰を出しやすくする薬 (鎮 <sup>がい</sup> 咳去 <sup>たん</sup> 痰薬)	868686
1) <sup>せま</sup> 咳や <sup>たん</sup> 痰が生じる仕組み、鎮 <sup>がい</sup> 咳去 <sup>たん</sup> 痰薬の働き	868686
2) 代表的な配合成分等、主な副作用	878787
3) 相互作用、受診勧奨	939393
2 口 <sup>くう</sup> 腔咽喉薬、うがい薬 (含 <sup>そう</sup> 嗽薬)	949494
1) 代表的な配合成分等、主な副作用	959595
2) 相互作用、受診勧奨	989898
<b>III 胃腸に作用する薬</b>	989898
1 胃の薬 (制酸薬、健胃薬、消化薬)	989898
1) 胃の不調、薬が症状を抑える仕組み	989898
2) 代表的な配合成分等、主な副作用、相互作用、受診勧奨	999999
2 腸の薬 (整腸薬、止 <sup>しゃ</sup> 瀉薬、 <sup>しゃ</sup> 瀉下薬)	105105105
1) 腸の不調、薬が症状を抑える仕組み	105105105
2) 代表的な配合成分等、主な副作用	106106106
3) 相互作用、受診勧奨	114114114
3 胃腸鎮痛鎮 <sup>けい</sup> 痙薬	116116116

1) 代表的な鎮 <sup>けい</sup> 痙成分、症状を抑える仕組み、主な副作用	116116116
2) 相互作用、受診勧奨	117117117
4 その他の消化器用薬	118118118
1) 洗 <sup>かん</sup> 腸薬	118118118
2) 駆虫薬	120120120
<b>IV 心臓などの器官や血液に作用する薬</b>	122122122
1 強心薬	122122122
1) 動 <sup>き</sup> 悸、息切れ等を生じる原因と強心薬の働き	122122122
2) 代表的な配合成分等、主な副作用	122122122
3) 相互作用、受診勧奨	124124124
2 高コレステロール改善薬	125125125
1) 血中コレステロールと高コレステロール改善成分の働き	125125125
2) 代表的な配合成分、主な副作用	126126126
3) 生活習慣改善へのアドバイス、受診勧奨等	126126126
3 貧血用薬（鉄製剤）	127127127
1) 貧血症状と鉄製剤の働き	127127127
2) 代表的な配合成分、主な副作用	128128128
3) 相互作用、受診勧奨等	128128128
4 その他の循環器用薬	129129129
1) 代表的な配合成分等、主な副作用	129129129
2) 相互作用、受診勧奨等	131131131
<b>V 排<sup>せつ</sup>に関わる部位に作用する薬</b>	131131131
1 痔 <sup>じ</sup> の薬	131131131
1) 痔 <sup>じ</sup> の発症と対処、痔 <sup>じ</sup> 疾用薬の働き	131131131
2) 代表的な配合成分等、主な副作用	132132132
3) 相互作用、受診勧奨	136136136
2 その他の泌尿器用薬	137137137
1) 代表的な配合成分等、主な副作用	137137137
2) 相互作用、受診勧奨	139139139
<b>VI 婦人薬</b>	139139139
1) 適用対象となる体質・症状	139139139
2) 代表的な配合成分等、主な副作用	140140140
3) 相互作用、受診勧奨	143143143
<b>VII 内服アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）（点鼻薬、点眼薬はそれぞれⅧ、Ⅸを参照）</b>	

.....	<a href="#">144144144</a>
1) アレルギーの症状、薬が症状を抑える仕組み .....	<a href="#">144144144</a>
2) 代表的な配合成分等、主な副作用.....	<a href="#">145145145</a>
3) 相互作用、受診勧奨 .....	<a href="#">149149149</a>
<b>VIII 鼻に用いる薬</b> .....	<a href="#">151151151</a>
1) 代表的な配合成分、主な副作用 .....	<a href="#">151151151</a>
2) 相互作用、受診勧奨 .....	<a href="#">153153153</a>
<b>IX 眼科用薬</b> .....	<a href="#">154154154</a>
1) 目の調節機能を改善する配合成分.....	<a href="#">156156156</a>
2) 目の充血、炎症を抑える配合成分.....	<a href="#">156156156</a>
3) 目の乾きを改善する配合成分.....	<a href="#">157157157</a>
4) 目の痒 <sup>かゆ</sup> みを抑える配合成分.....	<a href="#">157157157</a>
5) 抗菌作用を有する配合成分.....	<a href="#">158158158</a>
6) その他の配合成分（無機塩類、ビタミン類、アミノ酸）と配合目的.....	<a href="#">158158158</a>
<b>X 皮膚に用いる薬</b> .....	<a href="#">159159159</a>
1) きず口等の殺菌消毒成分 .....	<a href="#">160160160</a>
2) 痒 <sup>かゆ</sup> み、腫れ、痛み等を抑える配合成分 .....	<a href="#">163163163</a>
3) 肌の角質化、かさつき等を改善する配合成分 .....	<a href="#">169169169</a>
4) 抗菌作用を有する配合成分.....	<a href="#">170170170</a>
5) 抗真菌作用を有する配合成分.....	<a href="#">171171171</a>
6) 頭皮・毛根に作用する配合成分 .....	<a href="#">173173173</a>
<b>X I 歯や口中に用いる薬</b> .....	<a href="#">174174174</a>
1 歯痛・歯槽膿 <sup>のう</sup> 漏薬 .....	<a href="#">174174174</a>
1) 代表的な配合成分、主な副作用 .....	<a href="#">174174174</a>
2) 相互作用、受診勧奨 .....	<a href="#">177177177</a>
2 口内炎用薬.....	<a href="#">177177177</a>
1) 代表的な配合成分、主な副作用 .....	<a href="#">177177177</a>
2) 相互作用、受診勧奨 .....	<a href="#">178178178</a>
<b>X II 禁煙補助剤</b> .....	<a href="#">179179179</a>
1) 喫煙習慣とニコチンに関する基礎知識 .....	<a href="#">179179179</a>
2) 主な副作用、相互作用、禁煙達成へのアドバイス・受診勧奨.....	<a href="#">180180180</a>
<b>X III 滋養強壮保健薬</b> .....	<a href="#">181181181</a>
1) 医薬品として扱われる保健薬.....	<a href="#">181181181</a>
2) ビタミン、カルシウム、アミノ酸等の働き、主な副作用 .....	<a href="#">181181181</a>

3) 代表的な配合生薬等、主な副作用.....	<a href="#">185185185</a>
4) 相互作用、受診勧奨 .....	<a href="#">187187187</a>
<b>XIV 漢方処方製剤・生薬製剤</b> .....	<a href="#">188188188</a>
1 漢方処方製剤 .....	<a href="#">188188188</a>
1) 漢方の特徴・漢方薬使用における基本的な考え方 .....	<a href="#">188188188</a>
2) 代表的な漢方処方製剤、適用となる症状・体質、主な副作用 .....	<a href="#">190190190</a>
3) 相互作用、受診勧奨 .....	<a href="#">191191191</a>
2 その他の生薬製剤 .....	<a href="#">192192192</a>
1) 代表的な生薬成分、主な副作用 .....	<a href="#">192192192</a>
2) 相互作用、受診勧奨 .....	<a href="#">194194194</a>
<b>XV 公衆衛生用薬</b> .....	<a href="#">195195195</a>
1 消毒薬 .....	<a href="#">195195195</a>
1) 感染症の防止と消毒薬 .....	<a href="#">195195195</a>
2) 代表的な殺菌消毒成分、取扱い上の注意等 .....	<a href="#">195195195</a>
2 殺虫剤・忌避剤 .....	<a href="#">197197197</a>
1) 衛生害虫の種類と防除 .....	<a href="#">197197197</a>
2) 代表的な配合成分・用法、誤用・事故等への対処 .....	<a href="#">200200200</a>
<b>XVI 一般用検査薬</b> .....	<a href="#">204204204</a>
1 一般用検査薬とは .....	<a href="#">204204204</a>
2 尿糖・尿タンパク検査薬 .....	<a href="#">205205205</a>
1) 尿中の糖・タンパク値に異常を生じる要因 .....	<a href="#">205205205</a>
2) 検査結果に影響を与える要因、検査結果の判断、受診勧奨 .....	<a href="#">205205205</a>
3 妊娠検査薬 .....	<a href="#">207207207</a>
1) 妊娠の早期発見の意義 .....	<a href="#">207207207</a>
2) 検査結果に影響を与える要因、検査結果の判断、受診勧奨 .....	<a href="#">207207207</a>
<b>第4章 薬事関係法規・制度</b> .....	<a href="#">209209209</a>
<b>I 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等</b> .....	<a href="#">209209209</a>
<b>II 医薬品の分類・取扱い等</b> .....	<a href="#">212212212</a>
1) 医薬品の定義と範囲 .....	<a href="#">212212212</a>
2) 容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 .....	<a href="#">219219219</a>
3) 医薬部外品、化粧品、保健機能食品等 .....	<a href="#">221221221</a>
<b>III 医薬品の販売業の許可</b> .....	<a href="#">228228228</a>
1) 許可の種類と許可行為の範囲 .....	<a href="#">228228228</a>
2) リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 .....	<a href="#">236236236</a>

<b>IV 医薬品販売に関する法令遵守</b> .....	<a href="#">255255255</a>
1) 適正な販売広告.....	<a href="#">255255255</a>
2) 適正な販売方法.....	<a href="#">258258258</a>
3) 行政庁の監視指導、苦情相談窓口.....	<a href="#">259259259</a>
(参考) 関係条文 等.....	<a href="#">270270270</a>
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）抄.....	<a href="#">270270270</a>
○ 薬局等構造設備規則（昭和36年厚生省令第2号）.....	<a href="#">348348348</a>
○ 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令（昭和39年厚生省令第3号）抄.....	<a href="#">351351351</a>
○ 医療法（昭和23年法律第205号）抄.....	<a href="#">354354354</a>
○ 食品安全基本法（平成15年法律第48号）抄.....	<a href="#">355355355</a>
○ 食品衛生法（昭和22年法律第233号）抄.....	<a href="#">355355355</a>
○ 健康増進法（平成14年法律第103号）抄.....	<a href="#">355355355</a>
○ 食品表示法（平成25年法律第70号）抄.....	<a href="#">356356356</a>
○ 食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）抄.....	<a href="#">356356356</a>
○ 不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）抄.....	<a href="#">357357357</a>
○ 不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件（昭和37年公正取引委員会告示第3号）抄.....	<a href="#">362362362</a>
○ 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限（昭和52年公正取引委員会告示第3号）抄.....	<a href="#">362362362</a>
○ 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限（昭和52年公正取引委員会告示第5号）抄.....	<a href="#">363363363</a>
(参考) 主な関係通知 等.....	<a href="#">364364364</a>
<b>第5章 医薬品の適正使用・安全対策</b> .....	<a href="#">370370370</a>
<b>I 医薬品の適正使用情報</b> .....	<a href="#">370370370</a>
1) 添付文書の読み方.....	<a href="#">370370370</a>
2) 製品表示の読み方.....	<a href="#">378378378</a>
3) 安全性情報など、その他の情報.....	<a href="#">380380380</a>
<b>II 医薬品の安全対策</b> .....	<a href="#">383383383</a>
1 医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置.....	<a href="#">384384384</a>
1) 副作用情報等の収集.....	<a href="#">384384384</a>
2) 副作用情報等の評価及び措置.....	<a href="#">385385385</a>
2 医薬品による副作用等が疑われる場合の報告の仕方.....	<a href="#">386386386</a>

<b>Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済</b> .....	<a href="#">387387387</a>
1) 医薬品副作用被害救済制度.....	<a href="#">387387387</a>
2) 医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介.....	<a href="#">388388388</a>
<b>Ⅳ 一般用医薬品に関する主な安全対策</b> .....	<a href="#">390390390</a>
<b>V 医薬品の適正使用のための啓発活動</b> .....	<a href="#">391391391</a>
第5章 別表.....	<a href="#">393393393</a>
5-1. 主な使用上の注意の記載とその対象成分・薬効群等.....	<a href="#">393393393</a>
5-2. 主な使用上の注意の記載とその対象成分・薬効群等.....	<a href="#">399399399</a>
5-3. 「医薬品・医療機器等安全性情報」：一般用医薬品に関連する主な記事...	<a href="#">404404404</a>
5-4. 企業からの副作用等の報告.....	<a href="#">406406406</a>
5-5. 医薬品安全性情報報告書.....	<a href="#">407407407</a>
(参考) 主な情報入手先、受付窓口等.....	<a href="#">410410410</a>



## 1 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識

### 問題作成のポイント

- 医薬品の本質、効き目や安全性に影響を与える要因等について理解していること
- 購入者等から医薬品を使用しても症状が改善しないなどの相談があった場合には、医療機関の受診を勧奨するなど、適切な助言を行うことができること
- 薬害の歴史を理解し、医薬品の本質等を踏まえた適切な販売等に努めることができること

2

## 3 I 医薬品概論

### 4 1) 医薬品の本質

5 医薬品は、多くの場合、人体に取り込まれて作用し、効果を発現させるものである。しかし、  
6 本来、医薬品も人体にとっては異物（外来物）であるため、また、医薬品が人体に及ぼす作用は  
7 複雑、かつ、多岐に渡り、そのすべてはが解明されていないため、必ずしも期待される有益な効  
8 果（薬効）のみをもたらすとは限らず、好ましくない反応（副作用）を生じる場合もある。

9 人体に対して使用されない医薬品についても、例えば、殺虫剤の中には誤って人体がそれに曝  
10 されれば健康を害するおそれがあるものもあり、検査薬は検査結果について正しい解釈や判断が  
11 なされなければ医療機関を受診して適切な治療を受ける機会を失うおそれがあるなど、人の健康  
12 に影響を与えるものもである。

13 医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造や機能  
14 に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であり、その有用性が認められたものであるが、  
15 使用には、このような保健衛生上のリスクを伴うものであることに注意が必要である。このこと  
16 は、医療用医薬品と比較すればリスクは相対的に低いと考えられる一般用医薬品であっても同様  
17 であり、科学的な根拠に基づく適切な理解や判断によって適正な使用が図られる必要がある。

18 医薬品は、効能効果、用法用量、副作用等の必要な情報が適切に伝達されることを通じて、購  
19 入者等が適切に使用することにより、初めてその役割を十分に発揮するものであり、そうした情  
20 報を伴わなければ、単なる薬物（有効成分を含有する化学物質）に過ぎない。このため、一般用  
21 医薬品には、製品に添付されている文書（添付文書）や製品表示に必要な情報が記載されている。

22 一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用するものであるが、一般の生活者において  
23 は、添付文書や製品表示に記載された内容を見ただけでは、効能効果や副作用等について誤解や  
24 認識不足を生じることもある。購入者等が、一般用医薬品を適切に選択し、適正に使用するため  
25 には、その販売に専門家が関与し、専門用語を分かりやすい表現で伝えるなどの適切な情報提供  
26 を行い、また、購入者等が知りたい情報を十分に得ることができるように、相談に対応すること  
27 が不可欠である。

28 また、医薬品は、市販後にも、医学・薬学等の新たな知見、使用成績等に基づき、その有効性、  
29 安全性等の確認が行われる仕組みになっており、それらの結果を踏まえ、リスク区分の見直し、

30 承認基準の見直し等がなされ、販売時の取扱い、製品の成分分量、効能効果、用法用量、使用上  
31 の注意等が変更となった場合には、それが添付文書や製品表示の記載に反映されている。

32 医薬品は、このようなに知見の積み重ねや使用成績の結果等によって、有効性、安全性等に関  
33 する情報が集積されており、随時新たな情報が付加されるものである。一般用医薬品の販売に従  
34 事する専門家においては、これらに円滑に対応できるよう常に新しい情報の把握に努める必要が  
35 ある。

36 このほか、医薬品は、人の生命や健康に密接に関連するものであるため、高い水準で均一な品  
37 質が保証されていなければならない。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に  
38 関する法律<sup>1</sup>（昭和35年法律第145号。以下「法」という。）では、健康被害の発生の可能性の  
39 有無にかかわらず、異物等の混入、変質等がある医薬品を販売等してはならない旨を定めてお  
40 り、医薬品の販売等を行う者においても、そのようなことがないように注意するとともに、製造販  
41 売業者による製品回収等の措置がなされることもあるので、製造販売業者等からの情報に日頃か  
42 ら留意しておくことが重要である。

43 一般用医薬品として販売される製品は、製造物責任法（平成6年法律第85号。以下「PL法」  
44 という。）の対象でもある。

45 PL法は、製造物の欠陥により、人の生命、身体、財産に係る被害が生じた場合における製造  
46 業者等の損害賠償の責任について定めており、販売した一般用医薬品に明らかな欠陥があった場  
47 合などは、PL法の対象となりえることも理解しておく必要がある。

48

## 49 2) 医薬品のリスク評価

50 医薬品は、使用方法を誤ると健康被害を生じることがある。医薬品の効果とリスクは、用量と  
51 作用強度の関係薬物曝露時間と曝露量との積で表現される（用量-反応関係）に基づいて評価され  
52 る。投与量と効果又は毒性の関係は、薬物用量のを増加させるに伴い、効果の発現が検出されな  
53 い「無作用量」から、最小有効量を経て「治療量」に至る。治療量上限を超えると、やがて効果よ  
54 りも有害反応が強く発現する「中毒量」となり、「最小致死量」を経て、「致死量」に至る。動物実  
55 験により求められる50%致死量（LD<sub>50</sub>）は、薬物の毒性の指標として用いられる。

56 治療量を超えた量を単回投与した後に毒性が発現するおそれが高いことは当然であるが、少量  
57 の投与でも長期投与されれば慢性的な毒性が発現する場合もある。また、少量の医薬品の投与で  
58 も発がん作用、胎児毒性や組織・臓器の機能不全を生じる場合もある。このような考えから、新  
59 規に開発される医薬品のリスク評価は、医薬品開発の国際的な標準化（ハーモナイゼーション）  
60 制定の流れのなかで、個々の医薬品の用量-反応関係に基づいて、医薬品の安全性に関する非臨床  
61 試験の基準である Good Laboratory Practice（GLP）に準拠して薬効-薬理試験や一般薬理作

<sup>1</sup>薬事法等の一部を改正する法律（平成25年11月27日公布、平成26年11月25日施行）により法律の名称が「薬事法」から改められた。「医薬品医療機器等法」「医薬品医療機器法」「薬機法」等と略される。

62 用試験の他に、医薬品毒性試験法ガイドラインに沿って、単回投与毒性試験、反復投与毒性試験、  
63 生殖・発生毒性試験、遺伝毒性試験、がん原性試験、依存性試験、抗原性試験、局所刺激性試験、  
64 皮膚感作性試験、皮膚光感作性試験などの毒性試験が厳格に実施されている。

65 動物実験で医薬品の安全性が確認されると、ヒトを対象とした臨床試験が行われる。ヒトを対  
66 象とした臨床試験の実施における効果と安全性の評価基準には、国際的に Good Clinical  
67 Practice (GCP)が制定されており、これに準拠した手順で安全な治療量を設定することが新規  
68 医薬品の開発に関連する臨床試験（治験）の目標の一つである。

69 さらに、医薬品に対しては製造販売後の調査及び試験の実施の基準として Good Post-marketing  
70 Study Practice (GPS)と製造販売後安全管理の基準として Good Vigilance Practice (G  
71 VP)が制定されている。このように、医薬品については、食品などよりもはるかに厳しい安全性  
72 基準が要求されているのである。

73

### 74 3) 健康食品

75 「薬（医）食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進との関連は  
76 関心を持たれてきた。健康増進や維持の助けとなる食品は一般的に「健康食品」として呼ばれ、  
77 広く使用されている。食品は、法で定める医薬品とは異なり、身体構造や機能に影響する効果を  
78 表示することはできないが、例外的に特定保健用食品については、「特定の保健機能の表示」、例  
79 えばキシリトールを含む食品に対して「虫歯の原因になりにくい食品です」などの表示が許可さ  
80 れており、「栄養機能食品」については、各種ビタミン、ミネラルに対して「栄養機能の表示」が  
81 できる。（（第4章Ⅱ-3）【保健機能食品等の食品】参照。）

82 近年、セルフメディケーション<sup>※</sup>への関心が高まるとともに、健康補助食品（いわゆるサプリメント）  
83 などが健康推進・増進を目的として広く国民に使用されるようになった。それらの中にはカ  
84 プセル、錠剤等の医薬品と類似した形状で発売されているものも多く、誤った使用法により健康  
85 被害を生じた例も報告されている。医薬品を扱う者は、いわゆる健康食品は法的にも、また安全  
86 性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なるものであることを認識し、消費者に  
87 指導・説明を行わなくてはならない。

88 また、平成27年4月より「機能性表示食品」制度が施行された。「機能性表示食品」は、疾病に  
89 罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨（疾病リスクの低減に係るもの  
90 を除く。）を表示するものである。

91 「薬（医）食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関  
92 心を持たれてきた。特に近年では、食品やその成分についての健康増進効果の情報がメディア等  
93 を通して大量に発信され、消費者の関心も高い。

<sup>※</sup>世界保健機関（WHO：World Health Organization）によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」こととされている。

94 健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、  
95 医薬品とは法律上区別される。しかしながら、健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保  
96 健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品であ  
97 る。（第4章Ⅱ-3 参照）「保健機能食品」には現在、以下の3種類がある。

98 「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別  
99 に（一部は規格基準に従って）特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受  
100 け、許可されたものである。

101 「栄養機能食品」は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分（ビタミン、ミネ  
102 ラルなど）の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養  
103 成分の健康機能を表示できる。

104 「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維  
105 持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届け出された商品であ  
106 るが、特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない。

107 いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形  
108 状で販売されている。健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じ  
109 た例も報告されている。また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食  
110 品は、食品であるため、摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られ  
111 るが、法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十  
112 分理解しておく必要がある。一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認する  
113 ことは重要で、購入相談者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取に  
114 ついての指導も行うべきである。

#### 115 4) セルフメディケーション<sup>iii</sup>への積極的な貢献

116 急速に少子高齢化が進む中、持続可能な医療制度の構築に向け、医療費の増加やその国民負担  
117 の増大を解決し、健康寿命を伸ばすことが日本の大きな課題である。セルフメディケーションの  
118 推進は、その課題を解決する重要な活動のひとつであり、地域住民の健康相談を受け、一般用医  
119 薬品の販売や必要な時は医療機関の受診を勧める業務は、その推進に欠かせない。セルフメディ  
120 ケーションを的確に推進するためにも、一般用医薬品の販売等を行う登録販売者は、一般用医薬  
121 品等に関する正確で最新の知識を常に修得するよう心がけるとともに、薬剤師や医師、看護師な  
122 ど地域医療を支える医療スタッフあるいは行政などとも連携をとって、地域住民の健康維持・増  
123 進、生活の質（QOL）の改善・向上などに携わることが望まれる。少子高齢化の進む社会では、  
124 地域包括ケアシステムなどに代表されるように、自分、家族、近隣住民、専門家、行政など全て  
125 の人たちで協力して個々の住民の健康を維持・増進していくことが求められる。医薬品の販売等

<sup>iii</sup> 世界保健機関（WHO：World Health Organization）によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とされている。

に従事する専門家はその中でも重要な情報提供者であり、薬物療法の指導者となることを常に意識して活動することが求められる。

また、平成29年1月からは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、条件を満たした場合にスイッチOTC医薬品<sup>iv</sup>の購入の対価について、一定の金額をその年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制が導入され、令和4年1月の見直しにより、スイッチOTC医薬品以外にも腰痛や肩こり、風邪やアレルギーの諸症状に対応する一般用医薬品が税制の対象となっている。

## II 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因

### 1) 副作用

世界保健機関（WHO）の定義によれば、医薬品の副作用とは、「疾病の予防、診断、治療のため、又は身体の機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされている。

医薬品の副作用は、発生原因の観点から次のように大別することができる。いずれも具体的な副作用の症状については第2章 III（症状からみた主な副作用）を、原因となる具体的な医薬品、成分等については第3章（主な医薬品とその作用）を参照して問題作成のこと。

#### (a) 薬理作用による副作用

医薬品の有効成分である薬という物質、すなわち薬物が生体の生理機能に影響を与えることを薬理作用という。通常、薬物医薬品は複数の薬理作用を併せ持つため、医薬品を使用した場合には、期待される有益な反応（主作用）以外の反応が現れることがある。主作用以外の反応であっても、特段の不都合を生じないものであれば、通常、副作用として扱われることはないが、好ましくないもの（有害事象）については一般に副作用という。

複数の疾病を有する人の場合、ある疾病のために使用された医薬品の作用が、その疾病に対して薬効をもたらす一方、別の疾病に対しては症状を悪化させたり、治療が妨げられたりすることもある。

#### (b) アレルギー（過敏反応）

免疫は、本来、細菌やウイルスなどが人体に取り込まれたとき、人体を防御するために生じる反応であるが、免疫機構が過敏に反応して、好ましくない症状が引き起こされることがある。通常の免疫反応の場合、炎症やそれに伴って発生する痛み、発熱等は、人体にとって有害なものを体内から排除するための必要な過程であるが、アレルギーにおいては過剰に組織に刺激を与える場合も多く、引き起こされた炎症自体が過度に苦痛を与えることになる。

<sup>iv</sup> 一般用医薬品は、カウンター越しに（OTC（Over The Counter））販売等されることからOTC医薬品と呼ばれ、このうち、医師等の診断、処方箋に基づき使用されていた医療用医薬品を薬局や店舗販売業などで購入できるように転用（スイッチ）した医薬品をスイッチOTC医薬品という。

157 このように、アレルギーにより体の各部位に生じる炎症等の反応をアレルギー症状といい、  
158 流涙や眼の痒み等の結膜炎症状、鼻汁やくしゃみ等の鼻炎症状、蕁麻疹や湿疹、かぶれ等の  
159 皮膚症状、血管性浮腫<sup>v</sup>のようなやや広い範囲にわたる腫れ等が生じることが多い。

160 アレルギーは、一般的にあらゆる物質によって起こり得るものであるため、医薬品の薬理  
161 作用等とは関係なく起こり得るものであり、また、内服薬だけでなく外用薬等でも引き起こ  
162 されることがある。さらに、医薬品の有効成分だけでなく、基本的に薬理作用がない添加物<sup>vi</sup>  
163 も、アレルギーを引き起こす原因物質（アレルゲン）となり得る。アレルゲンとなり得る添  
164 加物としては、黄色4号（タートラジン）、カゼイン、亜硫酸塩（亜硫酸ナトリウム、ピロ硫  
165 酸カリウム等）等が知られている。

166 普段は医薬品にアレルギーを起こしたことがない人でも、病気等に対する抵抗力が低下し  
167 ている状態などの場合には、医薬品がアレルゲンになることがあり、思わぬアレルギーを生  
168 じることがある。また、アレルギーには体質的・遺伝的な要素もあり、アレルギーを起こし  
169 やすい体質の人や、近い親族にアレルギー体質の人がいる場合には、注意が必要である。

170 医薬品を使用してアレルギーを起こしたことがある人は、その原因となった医薬品の使用  
171 を避ける必要がある。また、医薬品の中には、鶏卵や牛乳等を原材料として作られているも  
172 のがあるため、それらに対するアレルギーがある人では使用を避けなければならない場合も  
173 ある。

174  
175 副作用は、眠気や口渇等の比較的良好に見られるものから、日常生活に支障を来す程度の健康被  
176 害を生じる重大なものまで様々であるが、どのような副作用であれ、起きないことが望ましい。  
177 そのため、副作用が起きる仕組みや起こしやすい要因の認識、また、それらに影響を与える体質  
178 や体調等をあらかじめ把握し、適切な医薬品の選択、適正な使用が図られることが重要である。

179 しかし、医薬品が人体に及ぼす作用は、すべてが解明されているわけではないため、十分注意  
180 して適正に使用された場合であっても、副作用が生じることがある。そのため、医薬品を使用す  
181 る人が副作用をその初期段階で認識することにより、副作用の種類に応じて速やかに適切に処置  
182 し、又は対応し、重篤化の回避が図られることが重要となる。

183 一般用医薬品は、軽度な疾病に伴う症状の改善等を図るためのものであり、一般の生活者が自  
184 らの判断で使用するものである。通常は、その使用を中断することによる不利益よりも、重大な  
185 副作用を回避することが優先され、その兆候が現れたときには基本的に使用を中止することとさ  
186 れており、必要に応じて医師、薬剤師などに相談がなされるべきである<sup>vii</sup>。

<sup>v</sup> 皮膚の下の毛細血管が拡張して、その部分に局所的な腫れを生じるもので、蕁麻疹と異なり、痒みを生じることは少ない。全身で起こり得るが、特に目や口の周り、手足などで起こる場合が多い。

<sup>vi</sup> 有効成分を医薬品として製する（「製剤化する」という）のに際して、その安定性、安全性又は均質性を保持し、また、その製剤の特徴に応じて、有効成分の溶解促進、放出制御等の目的で添加される物質。

<sup>vii</sup> 医療機関・薬局で交付された薬剤（医療用医薬品）の場合は、一般の生活者が自己判断で使用を中止すると、副作用による不都合よりも重大な治療上の問題を生じることがあるため、診療を行った医師（又は歯科医師）、調剤した薬剤師に確認する

187 一般用医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等から副作用の発生の経過を十分  
188 に聴いて、その後の適切な医薬品の選択に資する情報提供を行うほか、副作用の状況次第では、  
189 購入者等に対して、速やかに適切な医療機関を受診するよう勧奨する必要がある。

190 また、副作用は、容易に異変を自覚できるものばかりでなく、血液や内臓機能への影響等のよ  
191 うに、直ちに明確な自覚症状として現れないこともあるので、継続して使用する場合には、特段  
192 の異常が感じられなくても医療機関を受診するよう、医薬品の販売等に従事する専門家から促し  
193 ていくことも重要である。

194

## 195 2) 不適正な使用と副作用有害事象

196 医薬品は、保健衛生上のリスクを伴うものであり、疾病の種類や症状等に応じて適切な医薬品  
197 が選択され、適正な使用がなされなければ、症状の悪化、副作用や事故等の好ましくない結果（有  
198 害事象）を招く危険性が高くなる。一般用医薬品の場合、その使用を判断する主体が一般の生活  
199 者であることから、その適正な使用を図っていく上で、販売時における専門家の関与が特に重要  
200 である。

201 医薬品の不適正な使用は、概ね以下の2つに大別することができる。いずれも具体的な副作用  
202 有害事象については第2章 III（症状からみた主な副作用）を、原因となる具体的な医薬品、成分  
203 等については第3章（主な医薬品とその作用）を参照して問題作成のこと。また、それらに関す  
204 る実務的な知識、理解を問う出題として、事例問題を含めることが望ましい。

### 205 (a) 使用する人の誤解や認識不足に起因する不適正な使用

206 一般用医薬品は、購入者等の誤解や認識不足のために適正に使用されないことがある。

207 例えば、選択された医薬品が適切ではなく、症状が改善しないまま使用し続けている場合  
208 や、症状の原因となっている疾病の根本的な治療や生活習慣の改善等がなされないまま、手  
209 軽に入手できる一般用医薬品を使用して症状を一時的に緩和するだけの対処を漫然と続けて  
210 いるような場合には、いたずらに副作用有害事象を招く危険性が増すばかりでなく、適切な  
211 治療の機会を失うことにもつながりやすい。また、「薬はよく効けばよい」「多く飲めば早く  
212 効く」等と短絡的に考えて、定められた用量を超える量を服用したり、小児への使用を避け  
213 るべき医薬品を「子供だから大人用のものを半分にして飲ませればよい」として服用させる  
214 など、安易に医薬品を使用するような場合には、特に副作用有害事象につながる危険性が高  
215 い。このほか、人体に直接使用されない医薬品についても、使用する人の誤解や認識不足に  
216 よって使い方や判断を誤り、副作用有害事象につながることもある。

217 また、使用量は指示どおりであっても、便秘や不眠、頭痛など不快な症状が続くために、  
218 長期にわたり一般用医薬品をほぼ毎日連用（常習）する事例も見られる。便秘薬や総合感冒

---

必要がある。

219 薬、解熱鎮痛薬などはその時の不快な症状を抑えるための医薬品であり、長期連用すれば、  
220 その症状を抑えていることで重篤な疾患の発見が遅れたり、肝臓や腎臓などの医薬品を代謝  
221 する器官を傷めたりする可能性もある。このほか、長期連用により精神的な依存がおり、  
222 使用量が増え、購入するための経済的な負担も大きくなる例も見られる。

223 このような誤解や認識不足による不適正な使用や、それに起因する副作用有害事象の発生  
224 の防止を図るには、医薬品の販売等に従事する専門家が、購入者等に対して、正しい情報を  
225 適切に伝えていくことが重要となる。購入者等が医薬品を使用する前に添付文書や製品表示  
226 を必ず読むなどの適切な行動がとられ、その適正な使用が図られるよう、購入者等の理解力  
227 や医薬品を使用する状況等に即して説明がなされるべきである。

#### 228 (b) 医薬品を本来の目的以外の意図で使用する不適正な使用

229 医薬品は、その目的とする効果に対して副作用が生じる危険性が最小限となるよう、使用  
230 する量や使い方が定められている。医薬品を本来の目的以外の意図で、定められた用量を意  
231 図的に超えて服用したり、みだりに他の医薬品や酒類等と一緒に摂取するといった乱用がな  
232 されると、過量摂取による急性中毒等を生じる危険性が高くなり、また、乱用の繰り返しに  
233 よって慢性的な臓器障害等を生じるおそれもある。

234 一般用医薬品にも習慣性・依存性がある成分を含んでいるもの（濫用等のおそれのある医  
235 薬品の成分については第4章Ⅲ-2【その他の遵守事項等】参照。）があり、そうした医薬品  
236 がしばしば乱用されることが知られている。特に、青少年は、薬物乱用の危険性に関する認  
237 識や理解が必ずしも十分でなく、好奇心から身近に入手できる薬物を興味本位で乱用するこ  
238 とがあるので、注意が必要である。（第5章 V（医薬品の適正使用のための啓発活動）参照。）

239 適正な使用がなされる限りは安全かつ有効な医薬品であっても、乱用された場合には薬物  
240 依存<sup>viii</sup>を生じることがあり、一度、薬物依存が形成されると、そこから離脱することは容易  
241 ではない。医薬品の販売等に従事する専門家においては、必要以上の大量購入や頻回購入な  
242 どを試みる不審な購入者等には慎重に対処する必要があり、積極的に事情を尋ねる、状況に  
243 よっては販売を差し控えるなどの対応が図られることが望ましい。

### 245 3) 他の医薬品や食品との相互作用、飲み合わせ

246 複数の医薬品を併用した場合、又は保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性  
247 表示食品）や、いわゆる健康食品を含む特定の食品と一緒に摂取した場合に、医薬品の作用が増  
248 強したり、減弱したりすることを相互作用という。作用が増強すれば、作用が強く出過ぎたり、

<sup>viii</sup> ある薬物の精神的な作用を体験するために、その薬物を連続的、あるいは周期的に摂取することへの強迫（欲求）を常に伴っている行動等によって特徴づけられる精神的・身体的な状態。

なお、依存性とは、物質が有する依存を形成する性質のことであり、依存形成性ともいう。依存性が「強い・弱い」というのは、依存をより生じやすいかどうかを表したもの。習慣性とは、明確な依存を形成するほどではないものの、習慣的に使用することにつながりやすい性質をいう。



249 副作用が発生しやすくなり、また、作用が減弱すれば、十分な効果が得られないなどの不都合を  
250 生じる。

251 相互作用には、医薬品が吸収、分布、代謝（体内で化学的に変化すること）、~~分布~~又は排泄<sup>せつ</sup>され  
252 る過程で起こるものと、医薬品が薬理作用をもたらす部位において起こるものがある。相互作用  
253 を回避するには、ある医薬品を使用している期間やその前後を通じて、その医薬品との相互作用  
254 を生じるおそれのある医薬品や食品の摂取を控えなければならないのが通常である。

255 相互作用に留意されるべき具体的な医薬品、成分等に関する出題については、第3章（主な医  
256 薬品とその作用）を参照して作成のこと。また、それらに関する実務的な知識、理解を問う出題  
257 として、事例問題を含めることが望ましい。

258 (a) 他の医薬品との成分の重複・相互作用

259 一般用医薬品は、一つの医薬品の中に作用の異なる複数の成分を組み合わせ含んでいる  
260 （配合される）ことが多く、他の医薬品と併用した場合に、同様な作用を持つ成分が重複す  
261 ることがあり、これにより、作用が強くなり過ぎたり、副作用を招く危険性が増すことがある。  
262 例えば、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰<sup>がい たん</sup>薬、アレルギー用薬等では、成分や作用が重  
263 複することが多く、通常、これらの薬効群に属する医薬品の併用は避けることとされている。  
264 副作用や相互作用による副作用のリスクを減らす観点から、緩和を図りたい症状が明確であ  
265 る場合には、なるべくその症状に合った成分のみが配合された医薬品が選択されることが望  
266 ましい。

267 複数の疾病を有する人では、疾病ごとにそれぞれ医薬品が使用される場合が多く、医薬品  
268 同士の相互作用に関して特に注意が必要となる。医療機関で治療を受けている場合には、通  
269 常、その治療が優先されることが望ましく、一般用医薬品を併用しても問題ないかどうかに  
270 ついては、治療を行っている医師若しくは又は歯科医師、又は若しくは処方された医薬品を  
271 調剤する薬剤師に確認する必要がある。一般用医薬品の販売等に従事する専門家においては、  
272 購入者等に対し、医薬品の種類や使用する人の状態等に即して情報提供を行い、医療機関・  
273 薬局から交付された薬剤を使用している場合には、診療を行った医師若しくは歯科医師又は  
274 調剤した薬剤師に相談するよう<sup>ix</sup>説明がなされるべきである。

275 (b) 食品との飲み合わせ

276 食品と医薬品の相互作用は、しばしば「飲み合わせ」と表現され、食品と飲み薬が体内で  
277 相互作用を生じる場合が主に想定される。

278 例えば、酒類（アルコール）は、医薬品の吸収や代謝に影響を与えることがある。アルコ  
279 ールは、主として肝臓で代謝されるため、酒類（アルコール）をよく摂取する者では、肝臓

<sup>ix</sup> 多くの生活者は、一般用医薬品の使用について、医師（歯科医師）や薬剤師に話すのをおろそかにしがちである。また、医師（歯科医師）、薬剤師も、処方や調剤をするときに、一般用医薬品を使用しているかどうか確認することまで思い至らないことがある。医療機関を受診する際に、使用している一般用医薬品があれば、その添付文書等を持参して見せるよう説明がなされるべきである。

その代謝機能が高まっていることが多い。その結果、肝臓で代謝されるアセトアミノフェンなどでは、通常よりも代謝されやすくなり、体内から医薬品が速く消失して十分な薬効が得られなくなることがある。また、代謝によって産生する物質（代謝産物）に薬効があるもの場合には、作用が強く出過ぎたり、逆に、代謝産物が人体に悪影響を及ぼす医薬品の場合には副作用が現れやすくなる。

このほか、カフェインやビタミンA等のように、食品中に医薬品の成分と同じ物質が存在するために、それらを含む医薬品（例：総合感冒薬）と食品（例：カフェインとコーヒー）と一緒に服用すると過剰摂取となるものもある。また、生薬成分等については、医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていなければ、食品（ハーブ等）として流通可能なものもあり、そうした食品を合わせて摂取すると、生薬成分が配合された医薬品の効き目や副作用を増強させることがある。

また、外用薬や注射薬であっても、食品によって医薬品の作用や代謝に影響を受ける可能性がある。

#### 4) 小児、高齢者等への配慮

小児、高齢者等が医薬品を使用する場合には、保健衛生上のリスク等に関して、成人と別に考える必要がある。

それぞれについて、特に留意されるべき具体的な医薬品、成分等については、第3章（主な医薬品とその作用）を参照して問題を作成のこと。また、それらに関する実務的な知識、理解を問う出題として、事例問題を含めることが望ましい。

##### (a) 小児

「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」（平成29年6月8日付け薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知別添） 医薬品の使用上の注意において、新生児、乳児、幼児、小児という場合には、おおよその目安として、次の年齢区分が用いられている。

新生児：生後4週未満、乳児：生後4週以上、1歳未満、幼児：1歳以上、7歳未満、小児：7歳以上、15歳未満

ただし、一般的に15歳未満を小児とすることもあり、具体的な年齢が明らかな場合は、  
医薬品の使用上の注意においては、「3歳未満の小児」等と表現される場合がある。

小児は、医薬品を受けつける生理機能が未発達であるため、その使用に際して特に配慮が必要である。例えば、小児は大人と比べて身体の大きさに対して腸が長く、服用した医薬品の吸収率が相対的に高い。また、血液脳関門が未発達であるため、吸収されて循環血液中に移行した医薬品の成分が脳に達しやすく、中枢神経系に影響を与える医薬品で副作用を起こしやすい。加えて、肝臓や腎臓の機能が未発達であるため、医薬品の成分の代謝・排泄に時

314 間がかかり、作用が強く出過ぎたり、副作用がより強く出ることがある。

315 医薬品の販売に従事する専門家においては、小児に対して使用した場合に副作用等が発生  
316 する危険性が高まり、安全性の観点から小児への使用を避けることとされている医薬品の販  
317 売等に際しては、購入者等から状況を聞いて、想定される使用者の把握に努めるなど、積極  
318 的な情報収集と、それに基づく情報提供が重要となる。また、保護者等に対して、成人用の  
319 医薬品の量を減らして小児へ与えるような安易な使用は避け、必ず年齢に応じた用法用量が  
320 定められているものを使用するよう説明がなされることも重要である。

321 医薬品によっては、形状等が小児向けに作られていないため小児に対して使用しないこと  
322 などの注意を促している場合もある。例えば、錠剤、カプセル剤等は、小児、特に乳児にそ  
323 のまま飲み下させることが難しいことが多い。このため、5歳未満の幼児に使用される錠剤  
324 やカプセル剤などの医薬品では、服用時に喉につかえやすいので注意するよう添付文書に記  
325 載されている。医薬品が喉につかえると、大事に至らなくても咳き込んで吐き出し苦しむこ  
326 とになり、その体験から乳幼児に医薬品の服用に対する拒否意識を生じさせることがある。

327 乳児向けの用法用量が設定されている医薬品であっても、乳児は医薬品の影響を受けやす  
328 く、また、状態が急変しやすく、一般用医薬品の使用の適否が見極めにくいいため、基本的  
329 には医師の診療を受けることが優先され、一般用医薬品による対処は最小限（夜間等、医師の  
330 診療を受けることが困難な場合）にとどめるのが望ましい。また、一般に乳幼児は、容態が  
331 変化した場合に、自分の体調を適切に伝えることが難しいため、医薬品を使用した後は、保  
332 護者等が乳幼児の状態をよく観察することが重要である。何か変わった兆候が現れたときに  
333 は、早めに医療機関に連れて行き、医師の診察を受けさせることが望ましい。

334 乳幼児が誤って薬を大量に飲み込んだ、又は目に入れてしまったなどの誤飲・誤用事故の  
335 場合には、通常の使用状況から著しく異なるため、想定しがたい事態につながるおそれがあ  
336 る。このような場合には、一般用医薬品であっても高度に専門的判断が必要となることが多  
337 いので、応急処置等について関係機関の専門家に相談し、又は様子がおかしいようであれば  
338 医療機関に連れて行くなどの対応がなされる必要がある。なお、小児の誤飲・誤用事  
339 故を未然に防止するには、家庭内において、小児が容易に手に取れる場所や、小児の目につ  
340 く場所に医薬品を置かないようにすることが重要である。

#### 341 (b) 高齢者

342 [「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」\(平成29年6月8日付け薬生安発0](#)  
343 [608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知別添\)](#) [医薬品の使用上の注意に](#)  
344 [おいては](#)、おおよその目安として65歳以上を「高齢者」としている。

345 一般に高齢者は生理機能が衰えつつあり、特に、肝臓や腎臓の機能が低下していると医薬  
346 品の作用が強く現れやすく、若年時と比べて副作用を生じるリスクが高くなる。しかし、高  
347 齢者であっても基礎体力や生理機能の衰えの度合いは個人差が大きく、年齢のみから一概に

348 どの程度リスクが増大しているかを判断することは難しい。一般用医薬品の販売等に際して  
349 は、実際にその医薬品を使用する高齢者の個々の状況に即して、適切に情報提供や相談対応  
350 がなされることが重要である。

351  
352 また、高齢者は、生理機能の衰えのほか、喉の筋肉が衰えて飲食物を飲み込む力が弱まっ  
353 ている（嚥下障害）場合があり、内服薬を使用する際に喉に詰まらせやすい。さらに、医薬  
354 品の副作用で口渇を生じることがあり、その場合、誤嚥（食べ物等が誤って気管に入り込む  
355 こと）を誘発しやすくなるので注意が必要である。

356 加えて、高齢者は、持病（基礎疾患）を抱えていることが多く、一般用医薬品の使用によ  
357 って基礎疾患の症状が悪化したり、治療の妨げとなる場合があるほか、複数の医薬品が長期  
358 間にわたって使用される場合には、副作用を生じるリスクも高い。

359 このほか、高齢者によくみられる傾向として、医薬品の説明を理解するのに時間がかかる  
360 場合や、細かい文字が見えづらく、添付文書や製品表示の記載を読み取るのが難しい場合等  
361 があり、情報提供や相談対応において特段の配慮が必要となる。また、高齢者では、手先の  
362 衰えのため医薬品を容器や包装から取り出すことが難しい場合や、医薬品の取り違いや飲み  
363 忘れを起こしやすなどの傾向もあり、家族や周囲の人（介護関係者等）の理解や協力も含  
364 めて、医薬品の安全使用の観点からの配慮が重要となることがある。

365 (c) 妊婦又は妊娠していると思われる女性

366 妊婦は、体の変調や不調を起こしやすいため、一般用医薬品を使用することにより、症状  
367 の緩和等を図ろうとする場合もあるが、その際には妊婦の状態を通じて胎児に影響を及ぼす  
368 ことがないように配慮する必要があり、そもそも一般用医薬品による対処が適切かどうかを含  
369 めて慎重に考慮されるべきである。

370 胎児は、誕生するまでの間は、母体との間に存在する胎盤を通じて栄養分を受け取ってい  
371 る。胎盤には、胎児の血液と母体の血液とが混ざらない仕組み（血液-胎盤関門）がある。母  
372 体が医薬品を使用した場合に、血液-胎盤関門によって、どの程度医薬品の成分の胎児への移  
373 行が防御されるかは、未解明のことも多い。一般用医薬品においても、多くの場合、妊婦が  
374 使用した場合における安全性に関する評価が困難であるため、妊婦の使用については「相談  
375 すること」としているものが多い。

376 さらに、ビタミンA含有製剤のように、妊娠前後の一定期間に通常の用量を超えて摂取す  
377 ると胎児に先天異常を起こす危険性が高まるとされているものや、便秘薬のように、配合成  
378 分やその用量によっては流産や早産を誘発するおそれがあるものがある。このような医薬品  
379 については、十分注意して適正に使用するか、又は使用そのものを避ける必要があり、その  
380 販売等に際しては、購入者等から状況を聞いて、想定される使用者の把握に努めるなど、積  
381 極的な情報収集と、それに基づく情報提供がなされることが重要となる。

382 なお、妊娠の有無やその可能性については、購入者等側にとって他人に知られたくない場  
383 合もあることから、一般用医薬品の販売等において専門家が情報提供や相談対応を行う際に  
384 は、十分に配慮することが必要である。

385 (d) 母乳を与える女性（授乳婦）

386 医薬品の種類によっては、授乳婦が使用した医薬品の成分の一部が乳汁中に移行すること  
387 が知られており、母乳を介して乳児が医薬品の成分を摂取することになる場合がある。この  
388 ような場合、乳幼児に好ましくない影響が及ぶことが知られている医薬品については、授乳  
389 期間中の使用を避けるか、使用後しばらくの間は授乳を避けることができるよう、医薬品の  
390 販売等に従事する専門家から購入者等に対して、積極的な情報提供がなされる必要がある。

391 吸収された医薬品の一部が乳汁中に移行することが知られていても、通常の使用の範囲で  
392 は具体的な悪影響は判明していないものもあり、購入者等から相談があったときには、乳汁  
393 に移行する成分やその作用等について適切な説明がなされる必要がある。

394 (e) 医療機関で治療を受けている人等

395 近年、生活習慣病等の慢性疾患を持ちながら日常生活を送る生活者が多くなっている。疾  
396 患の種類や程度によっては、一般用医薬品の有効性や安全性に影響を与える要因となること  
397 があり、また、一般用医薬品を使用することで、よってその症状が悪化したり、治療が妨げ  
398 られることもある。

399 購入しようとする医薬品を使用することが想定される人が医療機関で治療を受けている場  
400 合には、疾患の程度やその医薬品の種類等に応じて、問題を生じるおそれがあれば使用を避  
401 けることができるよう情報提供がなされることが重要であり、る。必要に応じ、いわゆるお  
402 薬手帳を活用する必要がある。なお、医療機関・薬局で交付された薬剤を使用している人に  
403 ついては、登録販売者において一般用医薬品との併用の可否を判断することは困難なことが  
404 多く、その薬剤を処方した医師若しくは歯科医師又は調剤を行った薬剤師に相談するよう説  
405 明する必要がある。

406 過去に医療機関で治療を受けていた（今は治療を受けていない）という場合には、どのよ  
407 うな疾患について、いつ頃かかっていたのか（いつ頃治癒したのか）を踏まえ、購入者等が  
408 使用の可否を適切に判断することができるよう情報提供がなされることが重要である。

409 また、医療機関で治療を受ける際には、使用している一般用医薬品の情報を医療機関の医  
410 師や薬局の薬剤師等に伝えるよう購入者等に説明することも重要である。

411 医療機関での治療は特に受けていない場合であっても、医薬品の種類や配合成分等によっ  
412 ては、特定の症状がある人が使用するとその症状を悪化させるおそれがある等、注意が必要  
413 なものがある。

414 注意が必要な基礎疾患や既往症、症状、注意すべき医薬品の種類、配合成分等については、  
415 第5章 別表を参照して問題作成のこと。

416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447

## 5) プラセボ効果

医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果（偽薬効果）という。プラセボ効果は、医薬品を使用したこと自体による楽観的な結果への期待（暗示効果）や、条件付けによる生体反応、時間経過による自然発生的な変化（自然緩解など）等が関与して生じると考えられている。

医薬品を使用したときにもたらされる反応や変化には、薬理作用によるもののほか、プラセボ効果によるものも含まれている。プラセボ効果によってもたらされる反応や変化にも、望ましいもの（効果）と不都合なもの（副作用）とがある。

プラセボ効果は、主観的な変化だけでなく、客観的に測定可能な変化として現れることもあるが、不確実であり、それを目的として医薬品が使用されるべきではない。購入者等が、適切な医薬品の選択、医療機関の受診機会を失うことのないよう、正確な情報が適切に伝えられることが重要である。

## 6) 医薬品の品質

医薬品は、高い水準で均一な品質が保証されていなければならないが、配合されている成分（有効成分及び添加物成分）には、高温や多湿、光（紫外線）等によって品質の劣化（変質・変敗）を起こしやすいものが多く、適切な保管・陳列がなされなければ、医薬品の効き目が低下したり、人体に好ましくない作用をもたらす物質を生じることがある。

医薬品が保管・陳列される場所については、清潔性が保たれるとともに、その品質が十分保持される環境となるよう（高温、多湿、直射日光等の下に置かれることのないよう）留意される必要がある。その品質が承認等された基準に適合しない医薬品、その全部又は一部が変質・変敗した物質から成っている医薬品の販売等の禁止については、第4章 II（医薬品の分類・取扱い等）を参照して問題作成のこと。

また、医薬品は、適切な保管・陳列がなされたとしても、経時変化による品質の劣化は避けられない。一般用医薬品では、薬局又は店舗販売業において購入された後、すぐに使用されるとは限らず、家庭における常備薬として購入されることも多いことから、外箱等に記載されている使用期限から十分な余裕をもって販売等がなされることも重要である。

なお、表示されている「使用期限」は、未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限であり、液剤などでは、いったん開封されると記載されている期日まで品質が保証されない場合がある。（（第5章 I-2）（製品表示の読み方）参照。）

### 448 Ⅲ 適切な医薬品選択と受診勧奨

#### 449 1) 一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲

450 一般用医薬品は、法<sup>ii</sup>において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が  
451 著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択  
452 により使用されることが目的とされているもの（要指導医薬品を除く。）」（第4条第5項第4号）  
453 と定義されている。

454 その役割としては、(1) 軽度な疾病に伴う症状の改善、(2) 生活習慣病<sup>x</sup>等の疾病に伴う症状発  
455 現の予防（科学的・合理的に効果が期待できるものに限る。）、(3) 生活の質（QOL）の改善・  
456 向上、(4) 健康状態の自己検査、(5) 健康の維持・増進、(6) その他保健衛生の6つがあり<sup>xi</sup>、医  
457 療機関での治療を受けるほどではない体調不良の不調や疾病の初期段階、あるいは日常において、  
458 生活者が自らの疾病の治療、予防又は生活の質の改善・向上を図ることを目的としている。

459 近年、急速な高齢化の進展や生活習慣病の増加など疾病構造の変化、生活の質の向上への要請  
460 等に伴い、自分自身の健康に対する関心が高い生活者が多くなっている。そのような中で、専門  
461 家による適切なアドバイスの下、身近にある一般用医薬品を利用する「セルフメディケーション」  
462 の考え方がみられるようになってきている。セルフメディケーションの主役は一般の生活者であ  
463 り、一般用医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して常に科学的な根拠に  
464 基づいた正確な情報提供を行い、セルフメディケーションを適切に支援していくことが期待され  
465 ている。したがって、情報提供は必ずしも医薬品の販売に結びつけるのではなく、医療機関の受診  
466 を勧めたり（受診勧奨）、医薬品の使用によらない対処を勧めることが適切な場合があることにも  
467 留意する必要がある。

468 症状が重いとき（例えば、高熱や激しい腹痛がある場合、患部が広範囲である場合等）に、一  
469 般用医薬品を使用することは、一般用医薬品の役割にかんがみて、適切な対処とはいえない。体  
470 調不良の不調や軽度の症状等について一般用医薬品を使用して対処した場合であっても、一定期  
471 間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診  
472 して医師の診療を受ける必要がある。

473 なお、一般用医薬品で対処可能な範囲は、医薬品を使用する人によって変わってくるものであ  
474 り、例えば、乳幼児や妊婦等では、通常の成人の場合に比べ、その範囲は限られてくることにも  
475 留意される必要がある。

476 また、スポーツ競技者については、医薬品使用においてドーピングに注意が必要である。一般  
477 用医薬品にも使用すればドーピングに該当する成分を含んだものがあるため、スポーツ競技者か  
478 ら相談があった場合は、専門知識を有する薬剤師などへの確認が必要である。

<sup>x</sup> 生活習慣病については、運動療法及び食事療法が基本となる。

<sup>xi</sup> 一般用医薬品承認審査合理化等検討会中間報告書「セルフメディケーションにおける一般用医薬品のあり方について」（平成14年11月）

479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512

## 2) 販売時のコミュニケーション

一般用医薬品は、一般の生活者がその選択や使用を判断する主体であり、生活者が自らの健康上の問題等について一般用医薬品を利用して改善を図ろうとすること、すなわち生活者のセルフメディケーションに対して、登録販売者は、第二類医薬品及び第三類医薬品の販売、情報提供等を担う観点から、支援していくという姿勢で臨むことが基本となる。

医薬品の適正な使用のため必要な情報は、基本的に添付文書や製品表示に記載されているが、それらの記載は一般的・網羅的な内容となっているため、個々の購入者や使用者にとって、どの記載内容が当てはまり、どの注意書きに特に留意すべきなのか等について適切に理解することは必ずしも容易でなく、十分に目を通さずに医薬品が使用されるおそれもある。また、購入者等側があらかじめ購入する医薬品を決めていることも多いが、使う人の体質や症状等にあった製品を事前に調べて選択しているのではなく、宣伝広告や販売価格等に基づいて漠然と選択していることも少なくない。

医薬品の販売に従事する専門家においては、購入者等が、自分自身や家族の健康に対する責任感を持ち、適切な医薬品を選択して、適正に使用しようとするよう、働きかけていくことが重要である。専門家からの情報提供は、単に専門用語を分かりやすい平易な表現で説明するだけでなく、説明した内容が購入者等にどう理解され、行動に反映されているか、などの実情を把握しながら行うことにより、その実効性が高まるものである。

購入者等が適切な医薬品を選択し、実際にその医薬品を使用する人が必要な注意を払って適正に使用していくためには、医薬品の販売に従事する専門家が、可能な限り、購入者等側の個々の状況の把握に努めることが重要となる。一般用医薬品の場合、必ずしも情報提供を受けた本人が医薬品を使用するとは限らないことを踏まえ、販売時のコミュニケーションを考える必要がある。

医薬品の販売等に従事する専門家が購入者等から確認しておきたい基本的なポイントとしては、次のような事項が挙げられる。

- ① 何のためにその医薬品を購入しようとしているか（購入者等側のニーズ、購入の動機）
- ② その医薬品を使用するのは情報提供を受けている本人か、又はその家族等が想定されるか
- ③ その医薬品を使用する人として、小児や高齢者、妊婦等が想定されるか
- ④ その医薬品を使用する人が医療機関で治療を受けていないか
- ⑤ その医薬品を使用する人が過去にアレルギーや医薬品による副作用等の経験があるか
- ⑥ その医薬品を使用する人が相互作用や飲み合わせで問題を生じるおそれのある他の医薬品の使用や食品の摂取をしていないか

なお、第一類医薬品を販売する場合は、③～⑤の事項を販売する薬剤師が確認しなければならず、第二類医薬品を販売する場合は、③～⑤の事項を販売する薬剤師又は登録販売者が確認するよう努めなければならない。



513 さらに、一般用医薬品は、すぐに使用する必要に迫られて購入されるとは限らず、家庭におけ  
514 る常備薬として購入されることも多いことから、その販売等に従事する専門家においては、以下  
515 の点に関して把握に努めることが望ましい。

516 ⑦ その医薬品がすぐに使用される状況にあるか<sup>xii</sup>（その医薬品によって対処しようとする症  
517 状等が現にあるか）

518 ⑧ 症状等がある場合、それはいつ頃からか、その原因や患部等の特定はなされているか

519 こうした購入者側の状況を把握するには、医薬品の販売等に従事する専門家から購入者等に尋  
520 ねることが少なくないが、話しやすい雰囲気づくりに努め、購入者等が健康への高い関心を有  
521 する生活者として参加意識を持って、医薬品を使用する状況等について自らの意志で伝えてもら  
522 えるよう促していくことが重要である。

523 しかし、購入者自身、何を期待して医薬品を購入するのか漠然としている場合もあり、また、  
524 購入者側に情報提供を受けようとする意識が乏しく、コミュニケーションが成立しがたい場合も  
525 ある。医薬品の販売等に従事する専門家は、そうした場合であっても、購入者側から医薬品の使  
526 用状況に係る情報をできる限り引き出し、可能な情報提供を行っていくためのコミュニケーション  
527 技術を身につけるべきである。例えば、情報提供を受ける購入者等が医薬品を使用する本人で、  
528 かつ、現に症状等がある場合には、言葉によるコミュニケーションから得られる情報のほか、そ  
529 の人の状態や様子全般から得られる情報も、状況把握につながる重要な手がかりとなる。

530 また、購入者等が医薬品を使用する状況は随時変化する可能性があるため、販売数量は一時期  
531 に使用する必要量とする等、販売時のコミュニケーションの機会が継続的に確保されるよう配慮  
532 することも重要である。

533

#### 534 IV 薬害の歴史

##### 535 1) 医薬品による副作用等に対する基本的考え方

536 医薬品は、人体にとって本来異物であり、治療上の効能・効果とともに何らかの有害な作用（副  
537 作用）等が生じることは避けがたいものである。副作用は、眠気、口渇等の比較的良好に見られる  
538 ものから、死亡や日常生活に支障を来すほどの重大なものまで、その程度は様々であるが、それ  
539 までの使用経験を通じて知られているもののみならず、科学的に解明されていない未知のものが  
540 生じる場合もあり、医薬品の副作用被害やいわゆる薬害は、医薬品が十分注意して使用された  
541 しても起こり得るものである。

542 このように医薬品が「両刃の剣」であることを踏まえ、医薬品の販売に従事する専門家を含め、  
543 関係者が医薬品の安全性の確保に最善の努力を重ねていくことが重要である。

544

---

<sup>xii</sup> すぐに医薬品を使用する状況にない場合には、購入者等に対して、実際に使用する際に、販売時になされた情報提供の内容を思い起こしながら、改めて添付文書等に目を通すよう促すことが重要である。

545 2) 医薬品による副作用等にかかる主な訴訟

546 (a) サリドマイド訴訟

547 催眠鎮静剤等として販売されたサリドマイド製剤を妊娠している女性が使用したことによ  
548 り、出生児に四肢欠損、耳の障害等の先天異常（サリドマイド胎芽症）が発生したことに対  
549 する損害賠償訴訟である。1963年6月に製薬企業を被告として、さらに翌年12月には  
550 国及び製薬企業を被告として提訴され、1974年10月に和解が成立した。

551 サリドマイドは催眠鎮静成分として承認された（その鎮静作用を目的として、胃腸薬にも  
552 配合された）が、副作用として血管新生<sup>xiii</sup>を妨げる作用もあった。妊娠している女性が摂取  
553 した場合、サリドマイドは血液-胎盤関門を通過して胎児に移行する。胎児はその成長の過程  
554 で、諸器官の形成のため細胞分裂が活発に行われるが、血管新生が妨げられると細胞分裂が  
555 正常に行われず、器官が十分に成長しないことから、四肢欠損、視聴覚等の感覚器や心肺機  
556 能の障害等の先天異常が発生する。

557 なお、血管新生を妨げる作用は、サリドマイドの光学異性体<sup>xiv</sup>のうち、一方の異性体（S  
558 体）のみが有する作用であり、もう一方の異性体（R体）にはなく、また、鎮静作用はR体の  
559 みが有するとされている。サリドマイドが摂取されると、R体とS体は体内で相互に転換す  
560 るため、R体のサリドマイドを分離して製剤化しても<sup>xv</sup>催奇形性は避けられない。

561 サリドマイド製剤は、1957年に西ドイツ（当時）で販売が開始され、日本我が国では  
562 1958年1月から販売されていた。1961年11月、西ドイツのレント博士がサリドマ  
563 イド製剤の催奇形性について警告を発し、西ドイツでは製品が回収されるに至った。一方、  
564 日本我が国では、同年12月に西ドイツ企業から勧告が届いており、かつ翌年になってから  
565 もその企業から警告が発せられていたにもかかわらず、出荷停止は1962年5月まで行わ  
566 れず、販売停止及び回収措置は同年9月であるなど、対応の遅さが問題視された。

567 サリドマイドによる薬害事件は、日本我が国のみならず世界的にも問題となったため、W  
568 HO加盟国を中心に市販後の副作用情報の収集の重要性が改めて認識され、各国における副  
569 作用情報の収集体制の整備が図られることとなった。

570 (b) スモン訴訟

571 整腸剤として販売されていたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症

<sup>xiii</sup> 既に存在する血管から新しい血管が形成されること。また、広義にはそれに伴い、新しい血管によって栄養分等が運ばれることも指す。胎児の成長過程のみならず、健康な成人においても重要であるが、成人における新しい血管の形成は胎児期に比べると活発でない。なお、腫瘍化した細胞近辺では血管新生が活発化し、腫瘍の成長を促すことから、血管新生を妨げる物質を抗がん剤として用いることがある。

<sup>xiv</sup> 分子の化学的配列は同じであるが、鏡像関係（鏡に映ったように左右対称の関係）にあり、互いに重ね合わせることができないもの。互いに光学異性体にあるものについて、それぞれR体とS体として区別する表示方法のほか、d体とf体として区別する表記方法、D-体とL-体として区別する表記方法があり、医薬品の配合成分の名称の記載においては、それらの表記方法が用いられていることが多い。

<sup>xv</sup> サリドマイド製剤はR体とS体が分離されていない混合体（ラセミ体）を用いて製造されており、当時は、光学異性体の違いによって有効性や安全性に差が生じることは明確でなかった。その後、新たな有効成分を含む医薬品の承認にあたっては、光学異性体の有無や有効性、安全性等への影響についても確認、評価がなされるようになった。

572 （英名 Subacute Myelo-Optico-Neuropathy の頭文字をとってスモンと呼ばれる。）に罹患し  
573 たことに対する損害賠償訴訟である。スモンはその症状として、初期には腹部の膨満感から  
574 激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺れや脱力、歩行困難等が現れる。麻痺は上  
575 半身にも広がる場合があり、ときに視覚障害から失明に至ることもある。

576 キノホルム製剤は、1924年から整腸剤として販売されていたが、1958年頃から消  
577 化器症状を伴う特異な神経症状が報告されるようになり、米国では1960年にアメーバ赤  
578 痢への使用に限ることが勧告制限された。日本我が国では、1970年8月になって、ス  
579 モンの原因はキノホルムであるとの説が発表され、同年9月に販売が停止された。

580 1971年5月に国及び製薬企業を被告として提訴された。被告である国は、スモン患者  
581 の早期救済のためには、和解による解決が望ましいとの基本方針に立って、1977年10  
582 月に東京地裁において和解が成立して以来、各地の地裁及び高裁において和解が勧められ、  
583 1979年9月に全面和解が成立した。

584 スモン患者に対する施策や救済制度としては、治療研究施設の整備、治療法の開発調査研  
585 究の推進、施術費及び医療費の自己負担分の公費負担、世帯厚生資金貸付による生活資金の  
586 貸付のほか、重症患者に対する介護事業が講じられている。

587 サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、1979年、医薬品の副作用による健康被  
588 害の迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済制度が創設された。

#### 589 (c) HIV訴訟

590 血友病患者が、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）が混入した原料血漿から製造された血液  
591 凝固因子製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟であ  
592 る。国及び製薬企業を被告として、1989年5月に大阪地裁、同年10月に東京地裁で提  
593 訴された。大阪地裁、東京地裁は、1995年10月、1996年3月にそれぞれ和解勧告  
594 を行い、1996年3月に両地裁で和解が成立した。

595 和解確認書において、国（厚生大臣（当時））は、「我が国における血友病患者のHIV感  
596 染という悲惨な被害を拡大させたことについて指摘された重大な責任を深く自覚、反省して、  
597 原告らを含む感染被害者に物心両面にわたり甚大な被害を被らせるに至ったことにつき、深  
598 く衷心よりお詫びする」とともに、「サリドマイド、キノホルムの医薬品副作用被害に関する  
599 訴訟の和解による解決に当たり、前後2回にわたり、薬害の再発を防止するため最善の努力  
600 をすることを確約したにもかかわらず、再び本件のような医薬品による悲惨な被害を発生さ  
601 せるに至ったことを深く反省し、その原因についての真相の究明に一層努めるとともに、安  
602 全かつ有効な医薬品を国民に供給し、医薬品の副作用や不良医薬品から国民の生命、健康を  
603 守るべき重大な責務があることを改めて深く認識し、薬事法上医薬品の安全性確保のため厚  
604 生大臣に付与された各種権限を十分活用して、本件のような医薬品による悲惨な被害を再び  
605 発生させることがないよう、最善、最大の努力を重ねることを改めて確約する」としている。

606 本訴訟の和解を踏まえ、国は、H I V感染者に対する恒久対策として、エイズ治療・研究  
607 開発センター及び拠点病院の整備や治療薬の早期提供等の様々な取り組みを推進してきてい  
608 る。

609 また、1999年8月24日には、厚生大臣が出席し、関係患者団体等を招いて「誓いの  
610 碑」の竣工式が行われた。「誓いの碑」には、「命の尊さを心に刻みサリドマイド、スモン、  
611 H I V感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させることのないよう医薬品の安全  
612 性・有効性の確保に最善の努力を重ねていくことをここに銘記する 千数百名もの感染者を  
613 出した『薬害エイズ』事件 このような事件の発生を反省しこの碑を建立した 平成11年  
614 8月 厚生省」と刻まれている。

615 H I V感染者に対する恒久対策のほか、医薬品の副作用等による健康被害の再発防止に向  
616 けた取り組みも進められ、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構（当時）との連携によ  
617 る承認審査体制の充実、製薬企業に対し従来の副作用報告に加えて感染症報告の義務づけ、  
618 緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする  
619 改正薬事法が1996年に成立し、翌年4月に施行された。また、血液製剤の安全確保対策  
620 として検査や献血時の問診の充実が図られるとともに、薬事行政組織の再編、情報公開の推  
621 進、健康危機管理体制の確立等がなされた。

622 (d) C J D 訴訟

623 脳外科手術等に用いられていたヒト乾燥硬膜を介してクロイツフェルト・ヤコブ病（C J  
624 D）に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。C J Dは、細菌でもウイルスでもないタン  
625 パク質の一種であるプリオンが原因とされ、プリオンが脳の組織に感染し、次第に認知症  
626 に類似した症状が現れ、死に至る重篤な神経難病である。ヒト乾燥硬膜の原料が採取された  
627 段階でプリオンに汚染されている場合があり、プリオン不活化のための十分な化学的処理が  
628 行われないうまま製品として流通し、脳外科手術で移植された患者にC J Dが発生した。

629 国、輸入販売業者及び製造業者を被告として、1996年11月に大津地裁、1997年  
630 9月に東京地裁で提訴された。大津地裁、東京地裁は2001年11月に和解勧告を行い、  
631 2002年3月に両地裁で和解が成立した。

632 本訴訟の和解に際して、国（厚生労働大臣）は、生物由来の医薬品等によるH I VやC J  
633 Dの感染被害が多発したことにかんがみ、こうした医薬品等の安全性を確保するため必要な  
634 規制の強化を行うとともに、生物由来の医薬品等による被害の救済制度を早期に創設できる  
635 よう努めることを誓約し、2002年に行われた薬事法改正に伴い、生物由来製品の安全対  
636 策強化、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による生物由来製品による感染等被害救済制  
637 度の創設等がなされた。これらのほか、C J D患者の入院対策・在宅対策の充実、C J Dの  
638 診断・治療法の研究開発、C J Dに関する正しい知識の普及・啓発、患者家族・遺族に対す  
639 る相談事業等に対する支援、C J D症例情報の把握、ヒト乾燥硬膜の移植の有無を確認する

640 ための患者診療録の長期保存等の措置が講じられるようになった。

641 (e) C型肝炎訴訟

642 出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤の  
643 投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟である。  
644 国及び製薬企業を被告として、2002年から2007年にかけて、5つの地裁で提訴され  
645 たが、2006年から2007年にかけて言い渡された5つの判決は、国及び製薬企業が責  
646 任を負うべき期間等について判断が分かれていた。このような中、C型肝炎ウイルス感染者  
647 の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、2008  
648 年1月に特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者  
649 を救済するための給付金の支給に関する特別措置法（平成20年法律第2号）が制定、施行  
650 された。国では、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、現在、和解を進めてい  
651 る。

652 また、「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて（最終提言）」（平成22年4  
653 月28日薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会）を受け、  
654 医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委  
655 員会が設置された。

656 サリドマイド製剤、キノホルム製剤については、過去に一般用医薬品として販売されていたこ  
657 と製品もあり、一般用医薬品の販売等に従事する者においては、薬害事件の歴史を十分に理解し、  
658 医薬品の副作用等による健康被害の拡大防止に関して、製薬企業や国だけでなく、医薬品の情報  
659 提供、副作用報告等を通じて、その責務の一端を担っていることを肝に銘じておく必要がある。

660

## 1 第2章 人体の働きと医薬品

### 問題作成のポイント

- 身体の構造と働き、薬の働く仕組み、副作用の症状等に関する基本的な知識を、購入者等への情報提供や相談対応に活用できること

2

### 3 I 人体の構造と働き

4 ヒトの体は、細胞が集まって構成されており、関連する働きを持つ細胞が集まって組織を作り、  
5 複数の組織が組み合わさって一定の形態を持ち、特定の働きをする器官が形成される。器官が互  
6 いに連絡して協働し、全体として一つの機能を持つ場合、それらを器官系という。

7 ~~また、細胞と細胞の間には、カルシウム化合物、粘液物質、膠原線維等の物質が存在し、これ~~  
8 ~~を細胞間質という。~~

9

10 1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官

11 1) 消化器系

12 飲食物を消化して生命を維持していくため必要な栄養分として吸収し、その残渣を体外に排出  
13 する器官系である。これに関わる器官として、次のものがある。

14 ○ 消化管：口腔、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肛門

15 ○ 消化腺：唾液腺、肝臓、胆嚢、膵臓など

16 消化管は、口腔から肛門まで続く管で、平均的な成人で全長約9mある。飲食物はそのままの  
17 形で栄養分として利用できず、消化管で吸収される形に分解する必要があるが、これを消化とい  
18 う。消化には、消化腺から分泌される消化液による化学的消化と、咀嚼（食物を噛み、口腔内  
19 で粉砕すること）や消化管の運動による機械的消化とがある。

20 ○ 化学的消化：消化液に含まれる消化酵素の作用によって飲食物を分解する。

21 ○ 機械的消化：口腔における咀嚼や、消化管の運動などによって消化管の内容物を細かくし  
22 て消化液と混和し、化学的消化を容易にする。

23 (a) 口腔

24 ① 歯

25 歯は、歯周組織（歯肉、歯根膜、歯槽骨、セメント質）によって上下の顎の骨に固定され  
26 ている。歯槽骨の中に埋没している歯の部分を歯根、歯頸（歯肉線のあたり）を境に口腔  
27 に露出する部分を歯冠という。

28 歯冠の表面はエナメル質で覆われ、体で最も硬い部分となっている。エナメル質の下に  
29 は象牙質と呼ばれる硬い骨状の組織があり、神経や血管が通る歯髄を取り囲んでいる。歯

30 の齶蝕<sup>xvi</sup>が象牙質に達すると、神経が刺激されて、歯がしみたり痛みを感じるようになる。

31 ② 舌

32 舌の表面には、舌乳頭という無数の小さな突起があり、味覚を感知する部位である味蕾  
33 が分布している。舌は味覚を感知するほか、咀嚼<sup>そしゃく</sup>された飲食物を攪拌<sup>かくはん</sup>して唾液と混和させ  
34 る働きがある。

35 ③ 唾液腺

36 唾液を分泌し、食物を湿潤させてかみ砕きやすくし、また、咀嚼<sup>そしゃく</sup>物を滑らかにして嚥下<sup>えんげ</sup>  
37 を容易にする。唾液には、デンプンをデキストリンや麦芽糖に分解する消化酵素（プチア  
38 リン。唾液アミラーゼともいう。）が含まれ、また、味覚の形成にも重要な役割を持つ。

39 唾液は、リゾチーム<sup>xvii</sup>等の殺菌・抗菌物質を含んでおり、口腔粘膜の保護・洗浄、殺菌  
40 等の作用もある。また、唾液によって口腔内は pH がほぼ中性に保たれ、酸による歯の齶  
41 蝕<sup>しよく</sup>を防いでいる。

42 (b) 咽頭、食道

43 咽頭は、口腔<sup>くわう</sup>から食道に通じる食物路と、呼吸器の気道とが交わる場所である。飲食物  
44 を飲み込む運動（嚥下<sup>えんげ</sup>）が起きるときには、喉頭の入り口にある弁（喉頭蓋）が反射的に閉  
45 じることにより、飲食物が喉頭や気管に流入せず食道へと送られる。

46 食道は喉もとから上腹部のみぞおち近くまで続く、直径1～2cmの管状の器官で、消化液  
47 の分泌腺はない。嚥下<sup>えんげ</sup>された飲食物は、重力によって胃に落ち込むのではなく、食道の運動に  
48 よって胃に送られる。食道の上端と下端には括約筋があり、胃の内容物が食道や咽頭に逆流  
49 しないように防いでいる。胃液が食道に逆流すると、むねやけが起きる。

50 (c) 胃

51 上腹部にある中空の臓器で、中身が空の状態では扁平<sup>へんぺい</sup>に縮んでいるが、食道から内容物が  
52 送られてくると、その刺激に反応して胃壁の平滑筋が弛緩<sup>しじゆん</sup>し、容積が広がる（胃適応性弛緩）。

53 胃の内壁は粘膜で覆われて多くのひだをなしている。粘膜の表面には無数の微細な孔があ  
54 り、胃腺につながって塩酸（胃酸）のほか、ペプシノーゲンなどを分泌している。ペプシノ  
55 ーゲンは胃酸によって、タンパク質を消化する酵素であるペプシンとなり、胃酸とともに胃  
56 液として働く。タンパク質がペプシンによって半消化された状態をペプトンという。また、  
57 胃酸は、胃内を強酸性に保って内容物が腐敗や発酵を起こさないようにする役目も果たして  
58 いる。

59 胃液による消化作用から胃自体を保護するため、胃の粘膜表皮を覆う細胞から粘液が分泌  
60 されている。胃液分泌と粘液分泌のバランスが崩れると、胃液により胃の内壁が損傷を受け

<sup>xvi</sup> 口腔内の常在細菌が糖質から産生する酸で歯が脱灰されることによって起こる歯の欠損。いわゆる「むし歯」。

<sup>xvii</sup> リゾチームには細菌の細胞壁を分解する酵素作用のほか、消炎作用などもあり、生体防御因子として働く。唾液以外に、鼻汁や涙液にも含まれている。なお、医薬品に用いられるリゾチーム塩酸塩は、卵白から精製したものである。

61 て胃痛等の症状を生じることがある。また、胃粘液に含まれる成分は、小腸におけるビタミ  
62 ンB 1 2 の吸収にも重要な役割を果たしている。

63 食道から送られてきた内容物は、胃の運動によって胃液と混和され、かゆ状となって小腸  
64 に送り出されるまで数時間、胃内に滞留する。滞留時間は、炭水化物主体の食品の場合には  
65 比較的短く、脂質分の多い食品の場合には比較的長い。

66 (d) 小腸

67 全長6～7mの管状の臓器で、十二指腸、空腸、回腸の3部分に分かれる。

68 十二指腸は、胃から連なる約25cmのC字型に彎曲した部分で、彎曲部には膵臓からの膵  
69 管と胆嚢からの胆管の開口部があって、それぞれ膵液と胆汁を腸管内へ送り込んでいる。

70 腸の内壁からは腸液が分泌され、十二指腸で分泌される腸液に含まれる成分の働きによっ  
71 て、膵液中のトリプシノーゲンがトリプシンになる。トリプシンは、胃で半消化されたタン  
72 パク質（ペプトン）をさらに細かく消化する酵素である。

73 小腸のうち十二指腸に続く部分の、概ね上部40%が空腸、残り約60%が回腸であるが、  
74 明確な境目はない。空腸で分泌される腸液（粘液）に、腸管粘膜上の消化酵素（半消化され  
75 たタンパク質をアミノ酸まで分解するエレプシン、炭水化物を単糖類（ブドウ糖、ガラクト  
76 ース、果糖）まで分解するマルターゼ、ラクターゼ等）が加わり、消化液として働く。

77 小腸の運動によって、内容物がそれらの消化液（膵液、胆汁、腸液）と混和されながら大  
78 腸へと送られ、その間に消化と栄養分の吸収が行われる。

79 小腸は栄養分の吸収に重要な器官であるため、内壁の表面積を大きくする構造を持つ。十  
80 二指腸の上部を除く小腸の内壁には輪状のひだがあり、その粘膜表面は絨毛（柔突起ともい  
81 う）に覆われてピロード状になっている。絨毛を構成する細胞の表面には、さらに微絨毛が  
82 密生して吸収効率を高めている。

83 炭水化物とタンパク質は、消化酵素の作用によってそれぞれ単糖類、アミノ酸に分解され  
84 て吸収される。脂質（トリグリセリド）は、消化酵素（リパーゼ）の作用によって分解を受け  
85 るが、小腸粘膜の上皮細胞で吸収されると脂質に再形成され、乳状脂粒（リポタンパク質<sup>xviii</sup>  
86 の一種でカイロミクロンとも呼ばれる）となる。その際、脂溶性ビタミンも一緒に取り込ま  
87 れる。

88 (e) 膵臓

89 胃の後下部に位置する細長い臓器で、膵液を十二指腸へ分泌する。膵液は弱アルカリ性で、  
90 胃で酸性となった内容物を中和するのに重要である。膵液は、消化酵素の前駆体タンパクで  
91 あり消化管内で活性体であるトリプシンに変換されるトリプシノーゲンのほか、デンプンを  
92 分解するアミラーゼ（膵液アミラーゼ）、脂質を分解するリパーゼなど、多くの消化酵素を含

<sup>xviii</sup> 脂質がタンパク質などの物質と結合した微粒子。



93 んでいる。すなわち、膵臓<sup>すい</sup>は、炭水化物、タンパク質、脂質のそれぞれを消化するすべての  
94 酵素の供給を担っている。

95 また、膵臓<sup>すい</sup>は、消化腺であるとともに、血糖値を調節するホルモン（インスリン及びグル  
96 カゴン）等を血液中に分泌する内分泌腺でもある。

97 (f) 胆嚢<sup>のう</sup>、肝臓

98 胆嚢<sup>のう</sup>は、肝臓で産生された胆汁を濃縮して蓄える器官で、十二指腸に内容物が入ってくる  
99 と収縮して腸管内に胆汁を送り込む。

100 胆汁に含まれる胆汁酸塩（コール酸、デオキシコール酸等の塩類）は、脂質の消化を容易  
101 にし、また、脂溶性ビタミンの吸収を助ける。腸内に放出された胆汁酸塩の大部分は、小腸  
102 で再吸収されて肝臓に戻される（腸肝循環）。

103 胆汁には、古くなった赤血球や過剰のコレステロール等を排出する役割もある。胆汁に含  
104 まれるビリルビン（胆汁色素）は、赤血球中のヘモグロビンが分解されて生じた老廃物で、  
105 腸管内に排出されたビリルビンは、腸管内に生息する常在細菌（腸内細菌）によって代謝さ  
106 れて、糞便<sup>ふん</sup>を茶褐色にする色素となる。

107 肝臓は、大きい臓器であり、横隔膜の直下に位置する。胆汁を産生するほかに、主な働き  
108 として次のようなものがある。

109 i) 栄養分の代謝・貯蔵

110 小腸で吸収されたブドウ糖は、血液によって肝臓に運ばれてグリコーゲンとして蓄えら  
111 れる<sup>xix</sup>。グリコーゲンは、ブドウ糖が重合してできた高分子多糖で、血糖値が下がったと  
112 きなど、必要に応じてブドウ糖に分解されて血液中に放出される。皮下組織等に蓄えられ  
113 た脂質も、一度肝臓に運ばれてからエネルギー源として利用可能な形に代謝される。

114 また、肝臓は、脂溶性ビタミンであるビタミンA、D等のほか、ビタミンB<sub>6</sub>やB<sub>12</sub>  
115 等の水溶性ビタミンの貯蔵臓器でもある。

116 ii) 生体に有害な物質の無毒化・代謝

117 消化管等から吸収された、又は体内で生成した、滞留すると生体に有害な物質を、肝細  
118 胞内の酵素系の働きで代謝して無毒化<sup>xx</sup>し、又は体外に排出されやすい形にする。

119 医薬品として摂取された物質の多くも、肝臓において代謝される。

120 アルコールの場合、胃や小腸で吸収されるが、肝臓へと運ばれて一度アセトアルデヒド  
121 <sup>xxi</sup>に代謝されたのち、さらに代謝されて酢酸となる。アミノ酸が分解された場合等に生成  
122 するアンモニアも、体内に滞留すると有害な物質であり、肝臓において尿素へと代謝され

<sup>xix</sup> ブドウ糖からのグリコーゲン生成は、骨格筋の組織でも行われ、骨格筋もその収縮のエネルギー源としてグリコーゲンを蓄えている。グリコーゲンはエネルギー源としての貯蔵効率が脂質に比べて低いため、グリコーゲンとして蓄えられたのち、消費されない余剰分は徐々に脂質へと転換される。

<sup>xx</sup> まれに物質によっては、代謝を受けて生体に有害な（発癌<sup>がん</sup>性等）物質となるものもある。

<sup>xxi</sup> 二日酔いの症状は、体内での中間代謝物であるアセトアルデヒドの毒性によるものと考えられている。

123 る。

124 ヘモグロビンが分解して生じたビリルビンも肝臓で代謝されるが、肝機能障害や胆管閉  
125 塞などを起こすとビリルビンが循環血液中に滞留して、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる症  
126 状）を生じる。

127 iii) 生体物質の産生

128 生体物質とは生物の体内に存在する化学物質の総称であり、胆汁酸やホルモンなどの生  
129 合成の出発物質となるコレステロール、フィブリノゲン等の血液凝固因子、アルブミン等、  
130 生命維持に必須な役割を果たす種々の生体物質は、肝臓において産生される。また、肝臓  
131 では、必須アミノ酸<sup>xxii</sup>以外のアミノ酸を生合成することができる。

132 (g) 大腸

133 盲腸、虫垂、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸からなる管状の臓器で、内壁  
134 粘膜に絨毛がない点で小腸と区別される。

135 腸の内容物は、大腸に入ってきたときはかゆ状であるが、大腸の運動によって腸管内を通  
136 過するに従って水分とナトリウム、カリウム、リン酸等の電解質の吸収が行われ、固形状の  
137 糞便が形成される。大腸では消化はほとんど行われない。大腸の粘膜から分泌される粘液（大  
138 腸液）は、便塊を粘膜上皮と分離しやすく滑らかにする。

139 大腸内には腸内細菌が多く存在し、腸管内の食物繊維（難消化性多糖類）を発酵分解する。  
140 大腸の粘膜上皮細胞は、腸内細菌が食物繊維を分解して生じる栄養分を、その活動に利用し  
141 ており、大腸が正常に働くには、腸内細菌の存在が重要である。また、大腸の腸内細菌は、  
142 血液凝固や骨へのカルシウム定着に必要なビタミンK等の物質も産生している。なお、腸内  
143 細菌による発酵で、糞便の臭気の原因となる物質やメタン、二酸化炭素等のガスが生成される。

144 通常、糞便の成分の大半は水分で、そのほか、はがれ落ちた腸壁上皮細胞の残骸（15～  
145 20%）や腸内細菌の死骸（10～15%）が含まれ<sup>xxiii</sup>、食物の残渣は約5%に過ぎない。  
146 糞便となって直腸に達すると、刺激が脳に伝わって便意を生じる。

147 直腸は、大腸の終末の部分で、肛門へと続いている。通常、糞便は下行結腸、S状結腸に  
148 滞留し、直腸は空になっている。S状結腸に溜まった糞便が直腸へ送られてくると、その刺  
149 激に反応して便意が起こる。

150 (h) 肛門

151 直腸粘膜が皮膚へと連なる体外への開口部である。直腸粘膜と皮膚の境目になる部分には  
152 歯状線と呼ばれるギザギザの線がある。

153 肛門周囲は肛門括約筋で囲まれており、排便を意識的に調節することができる。また、静

<sup>xxii</sup> 体内で作られないため、食品などから摂取する必要があるアミノ酸。ヒトの場合、トリプトファン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、ヒスチジンの9種のアミノ酸が必須アミノ酸とされる。

<sup>xxiii</sup> 食事を摂らなくても排泄される糞便は、これらが排出されたものである。

154 脈が細かい網目状に通っていて、肛門周囲の組織これらの血管がうっ血鬱血すると痔の原因  
155 となる。

156

## 157 2) 呼吸器系

158 呼吸を行うための器官系で、鼻腔<sup>くう</sup>、咽頭<sup>くう</sup>、喉頭<sup>くう</sup>、気管、気管支、肺からなる。鼻腔から気管支ま  
159 での呼気及び吸気の通り道を気道といい、そのうち、咽頭・喉頭までの部分を上気道、気管から  
160 気管支、肺までの部分を下気道という。

161 呼吸器は常時外気と接触する器官であり、様々な異物、病原物質の侵入経路となるため、幾つ  
162 もの防御機構が備わっている。

163 (a) 鼻腔<sup>くう</sup>

164 鼻の内側の空洞部分である。鼻腔<sup>くう</sup>の入り口（鼻孔）にある鼻毛は、空気中の塵<sup>ちり</sup>、埃<sup>ほこり</sup>等を吸  
165 い込まないようにするフィルターの役目を果たしている。

166 鼻腔<sup>くう</sup>の内壁は、粘膜で覆われた棚状の凸凹凹凸になっており、吸入された空気との接触面  
167 積を広げ、効率よく適度な湿り気と温もりを与えて、乾燥した冷たい外気が流れ込むのを防  
168 いでいる。鼻腔<sup>くう</sup>内に物理的又は化学的な刺激を受けると、反射的にくしゃみが起きて激しい  
169 呼気とともに刺激の原因物を排出しようとする。

170 鼻腔<sup>くう</sup>の内壁には粘液分泌腺が多く分布し、鼻汁を分泌する。鼻汁は、鼻から吸った空気に  
171 湿り気を与えたり、粘膜を保護するため、常に少しずつ分泌されている。鼻汁にはリゾチー  
172 ムが含まれ、気道の防御機構の一つとなっている。かぜやアレルギーのときなどには、防御  
173 反応として大量に鼻汁が分泌されるようになる。

174 (b) 咽頭<sup>くう</sup>

175 鼻腔<sup>くう</sup>と口腔<sup>くう</sup>につながっており、咽頭は消化管と気道の両方に属する。

176 咽頭の後壁には扁桃<sup>へんたう</sup>xxivがあり、粘膜表面が凸凹凹凸している。扁桃はリンパ組織（白血球  
177 の一種であるリンパ球が密集する組織）が集まってできていて、気道に侵入してくる細菌、  
178 ウイルス等に対する免疫反応が行われる。

## 179 (c) 喉頭、気管、気管支

180 喉頭は、咽頭と気管の間にある軟骨に囲まれた円筒状の器官で、軟骨の突起した部分（喉  
181 頭隆起）がいわゆる「のどぼとけ」である。喉頭は、発声器としての役割もあり、呼気で喉頭  
182 上部にある声帯を振動させて声が発せられる。声帯に過度の負担がかかると、声がかすれて  
183 くる。

184 喉頭から肺へ向かう気道が左右の肺へ分岐するまでの部分を気管といい、そこから肺の中  
185 で複数に枝分かれする部分を気管支という。喉頭の大部分と気管から気管支までの粘膜は線

xxiv 俗に「扁桃腺」と呼ばれるが分泌腺ではなく、扁桃が正しい名称である。

186 毛上皮で覆われており、吸い込まれた<sup>じん</sup>粉塵、細菌等の異物は、気道粘膜から分泌される粘液  
187 にかからめ取られ、線毛運動による粘液層の連続した流れによって気道内部から咽頭へ向けて  
188 排出され、唾液とともに<sup>えん</sup>嚥下される。

189 (d) 肺

190 胸部の左右両側に1対ある。肺自体には肺を動かす筋組織がないため、自力で膨らんだり  
191 縮んだりするのではなく、横隔膜や<sup>ろつ</sup>肋間筋によって拡張・収縮して呼吸運動が行われている。

192 肺の内部で気管支が細かく枝分かれし、末端はブドウの房のような構造となっており、そ  
193 の球状の袋部分を肺胞という。肺胞の壁は非常に薄くできていて、周囲を毛細血管が網のよ  
194 うに取り囲んでいる。肺胞と毛細血管を取り囲んで支持している組織を間質という。

195 肺胞の壁を介して、心臓から送られてくる血液から二酸化炭素が肺胞気中に拡散し、代わ  
196 りに酸素が血液中の赤血球に取り込まれるガス交換が行われる<sup>xxv</sup>。肺胞気中の二酸化炭素は、  
197 呼気に混じって排出される。

198

199 3) 循環器系

200 体液（血液やリンパ液）を体内に循環させ、酸素、栄養分等を全身の組織へ送り、老廃物を排  
201 泄<sup>せつ</sup>器官へ運ぶための器官系で、心臓、血管系、血液、脾臓、リンパ系からなる。

202 血管系が心臓を中心とする閉じた管（閉鎖循環系）であるのに対して、リンパ系は末端がリン  
203 パ毛細管となって組織の中に開いている開放循環系である。

204 (a) 心臓

205 心筋でできた握りこぶし大の袋状の臓器で、胸骨の後方に位置する。血液は心臓がポンプ  
206 の役目を果たすことによって循環している。

207 心臓の内部は上部左右の心房、下部左右の心室の4つの空洞に分かれている。心房で血液  
208 を集めて心室に送り、心室から血液を拍出する。このような心臓の動きを拍動という。その  
209 際に血液が確実に一方向に流れるよう、心室には血液を取り込む側と送り出す側にそれぞれ  
210 弁があり、拍動と協調して交互に開閉する。

211 心臓の右側部分（右心房、右心室）は、全身から集まってきた血液を肺へ送り出す。肺で  
212 のガス交換が行われた血液は、心臓の左側部分（左心房、左心室）に入り、そこから全身に  
213 送り出される。

214 (b) 血管系（動脈、静脈、毛細血管）

215 血液が血管中を流れる方向は一定しており、心臓から拍出された血液を送る血管を動脈、  
216 心臓へ戻る血液を送る血管を静脈という。いずれも血管壁が収縮すると血管は細くなり、弛

<sup>xxv</sup> ガス交換を行うため、肺胞は粘液層や線毛によって保護されておらず、肺胞まで異物や細菌が侵入してきたときには、肺胞表面を自在に移動できる肺胞マクロファージ（貪食細胞）がそれらを探しあてて取り込み、消化する防御機構が備わっている。

217 緩すると拡張し、心拍数と同様に自律神経系によって制御される。

218 動脈は弾力性があり、圧力がかかっても耐えられるようになっている<sup>xxvi</sup>。動脈の多くは体  
219 の深部を通っているが、頸部、手首、肘の内側等では皮膚表面近くを通るため、心拍に合わ  
220 せて脈がふれる。血管壁にかかる圧力（血圧）は、通常、上腕部の動脈で測定される<sup>xxvii</sup>。

221 静脈は皮膚表面近くを通っている部分が多く、皮膚の上から透けて見える。静脈にかかる  
222 圧力は比較的lowいため、血管壁は動脈よりも薄い。四肢を通る静脈では血流が重力の影響を  
223 受けやすいため、一定の間隔で存在するをおいて内腔<sup>くう</sup>に向かう薄い帆状のひだ（静脈弁）が  
224 発達しており、血液の逆流を防いでいる。

225 毛細血管は、動脈と静脈の間をつなぐように体中の組織に細かく張り巡らされている細い  
226 血管である。毛細血管の薄い血管壁を通して、酸素と栄養分が血液中から組織へ運び込まれ、  
227 それと交換に二酸化炭素や老廃物が組織から血液中へ取り込まれる。

228 消化管壁を通っている毛細血管の大部分は、門脈と呼ばれる血管に集まって肝臓に入る。  
229 消化管ではアルコール、毒素等のように生体に悪影響を及ぼす物質が取り込まれることがあ  
230 るため、消化管で吸収された物質が一度肝臓を通過して代謝や解毒を受けた後に、血流に乗っ  
231 て全身を循環する仕組みとなっている。

### 232 (c) 血液

233 血液は、血漿<sup>しょう</sup>と血球からなり、酸素や栄養分を全身の組織に供給し、二酸化炭素や老廃物  
234 を肺や腎臓排泄器官<sup>せつ</sup>へ運ぶほか、ホルモンの運搬によって体内各所の器官・組織相互の連絡  
235 を図る役割もある。また、血液の循環によって、体内で発生した温熱が体表、肺、四肢の末  
236 端等に分配され、全身の温度をある程度均等に保つのに役立っている。

#### 237 ① 血漿<sup>しょう</sup>

238 90%以上が水分からなり、アルブミン、グロブリン等のタンパク質のほか、微量の脂  
239 質、糖質、電解質を含む。

240 アルブミンは、血液の浸透圧を保持する（血漿成分が血管から組織中に漏れ出のを防  
241 ぐ）働きがあるほか、ホルモンや医薬品の成分等と複合体を形成して、それらが血液によ  
242 って運ばれるときに代謝や排泄を受けにくくする。

243 グロブリンは、その多くが、免疫反応において、体内に侵入した細菌やウイルス等の異  
244 物を特異的に認識する抗体としての役割を担うため、そういったものは免疫グロブリンと  
245 も呼ばれる。

246 脂質（中性脂肪、コレステロール等）は、血漿中のタンパク質と結合してリポタンパク  
247 質を形成し、血漿中に分散している。なお、血液の粘稠性は、主として血漿の水分量や

<sup>xxvi</sup> 血漿中の過剰なコレステロールが血管の内壁に蓄積すると、血液が流れにくくなるとともに、動脈ではその弾力性が損なわれてもろくなる。

<sup>xxvii</sup> 心臓が収縮したときの血圧を最大血圧、心臓が弛緩したときの血圧（心臓には圧がかからなくても、血管には血管壁の持つ弾力のためある程度の圧がある）を最小血圧という。

248 赤血球の量で決まり、血中脂質量はほとんど影響を与えない<sup>xxviii</sup>。

249 ② 血球（赤血球、白血球、血小板）

250 【赤血球】 中央部がくぼんだ円盤状の細胞で、血液全体の約40%を占め<sup>xxix</sup>、赤い血色  
251 素（ヘモグロビン）を含む。

252 ヘモグロビンは鉄分と結合したタンパク質で、酸素量の多いところ（肺胞の毛細血管）  
253 で酸素分子と結合し、酸素が少なく二酸化炭素が多いところ（末梢組織の毛細血管）で  
254 酸素分子を放出する性質がある。このようなヘモグロビンの性質によって、肺で取り込  
255 まれた酸素が、全身の組織へ供給される（二酸化炭素はヘモグロビンとほとんど結合せ  
256 ず、血漿中に溶け込んで末梢組織から肺へ運ばれる）。

257 赤血球は骨髄で産生されるが、赤血球の数が少なすぎたり、赤血球中のヘモグロビン  
258 量が欠乏すると、血液は酸素を十分に供給できず、疲労や血色不良などの貧血症<sup>xxx</sup>が  
259 現れる。その原因としては、食事の偏りや胃腸障害等のため赤血球の産生に必要なビタ  
260 ミンが不足することによる場合（ビタミン欠乏性貧血）や、月経過多や消化管出血等  
261 による血液損失等のためヘモグロビンの生合成に必要な鉄分が不足することによる場合  
262 （鉄欠乏性貧血）などがある。

263 【白血球】 体内に侵入した細菌やウイルス等の異物に対する防御を受け持つ細胞である。  
264 形態や機能等の違いにより、数種類に細分類される。

265 i) 好中球は、最も数が多く、白血球の約60%を占めている。血管壁を通り抜けて  
266 組織の中に入り込むことができ、感染が起きた組織に遊走して集まり、細菌やウイ  
267 ルス等を食作用によって取り込んで分解する。

268 ii) リンパ球は、白血球の約1/3を占め、血液のほかリンパ液にも分布して循環し  
269 ている。リンパ節、脾臓等のリンパ組織で増殖し、細菌、ウイルス等の異物を認識  
270 したり（T細胞リンパ球）、それらに対する抗体（免疫グロブリン）を産生する（B  
271 細胞リンパ球）。

272 iii) 単球は、白血球の約5%と少ないが最も大きく、強い食作用を持つ。血管壁を通  
273 り抜けて組織の中に入り込むことができ、組織の中ではマクロファージ（貪食細胞）  
274 と呼ばれる。

275 iv) これらのほか、アレルギーに関与する白血球もある。

276 これら種々の白血球が協働して、生体の免疫機能が発揮される。感染や炎症などが起  
277 きると全体の数が増加するとともに、種類ごとの割合も変化する。

278 【血小板】 血管が破れたり切れたりすると、血液が血管外に漏れ出す。血管だけでなく

<sup>xxviii</sup> 脂質異常症や動脈硬化症に伴う血行障害は、血管の病変によるものであり、血液自体の粘稠<sup>ちゆう</sup>性とは直接関係しない。

<sup>xxix</sup> 標高の高い土地での生活や重度の喫煙など、酸素が少ない環境で長期間過ごす、血液中の赤血球の割合が増加する。

<sup>xxx</sup> 心臓機能や自律神経系の障害による立ちくらみ（起立性低血圧）やめまいなどの症状が俗に貧血と呼ばれることがあり、誤って混同されやすい。

279 皮膚まで傷ついて血液が体の外に流れ出す出血（外出血）に対し、血液が組織の隙間や  
280 器官の内部に流れ込むことを内出血という。生体には損傷した血管からの血液の流出を  
281 抑える仕組みが備わっており、血小板がその仕組みにおいて重要な役割を担っている。

282 損傷した血管は、血管壁が収縮することで血流を減少させ、大量の血液が流出するの  
283 を防ぐ。同時に、損傷部位に血小板が粘着、凝集して傷口を覆う。このとき血小板から  
284 放出される酵素によって血液を凝固させる一連の反応が起こり、血漿タンパク質の一種  
285 であるフィブリノゲンが傷口で重合して線維状のフィブリンとなる。フィブリン線維に  
286 赤血球や血小板などが絡まり合い、血の凝固物（血餅<sup>xxxix</sup>）となって傷口をふさぎ、止血  
287 がなされる。

#### 288 (d) 脾臓

289 握りこぶし大のスポンジ状臓器で、胃の後方の左上腹部に位置する。主な働きは、脾臓内  
290 を流れる血液から古くなった赤血球を濾し取って処理することである。健康な赤血球には柔  
291 軟性があるので脾臓内の網目構造をすり抜けられるが、古くなって柔軟性が失われた赤血球  
292 は引っかかり、脾臓の組織に存在するマクロファージ（貪食細胞）によって壊される。

293 また、脾臓にはリンパ球が増殖、密集する組織（リンパ組織）があり、血流中の細菌やウ  
294 イルス等の異物に対する免疫応答に関与する。

#### 295 (e) リンパ系（リンパ液、リンパ管、リンパ節）

296 リンパ液が循環するリンパ系は、血管系とは半ば独立した循環系として存在する。リンパ  
297 系には心臓のようにポンプの働きをする器官がなく、リンパ液の流れは主に骨格筋の収縮に  
298 よるものであり、流速は血流に比べて緩やかである。

299 リンパ液は、血漿の一部が毛細血管から組織の中へ滲み出て組織液（組織中の細胞と細胞  
300 の間に存在する体液）となったもので、血漿とほとんど同じ成分からなるが、タンパク質が  
301 少なく、リンパ球を含む。組織液は、組織中の細胞に酸素や栄養分を供給して二酸化炭素や  
302 老廃物を回収したのち、そのほとんどは毛細血管で吸収されて血液に還元されるが、一部は  
303 リンパ管に入ってリンパ液となる。その際、組織中に侵入した細菌、ウイルス等の異物もリ  
304 ンパ管に取り込まれる。

305 リンパ管には逆流防止のための弁があって、リンパ液は一定の方向に流れている。リンパ  
306 管は互いに合流して次第に太くなり、最終的に鎖骨の下にある静脈につながるが、途中でリ  
307 ンパ節と呼ばれる結節がある<sup>xxxii</sup>。リンパ節の内部にはリンパ球やマクロファージ（貪食細胞）  
308 が密集していて、リンパ液で運ばれてきた細菌やウイルス等は、ここで免疫反応によって排  
309 除される。

310

<sup>xxxix</sup> 採血した血液が凝固して血餅が沈殿したときの上澄みを血清といい、血漿からフィブリノゲンが除かれたものである。

<sup>xxxii</sup> リンパ節は、首筋、脇の下、もものつけ根に多く集まっている。

## 311 4) 泌尿器系

312 血液中の老廃物を、尿として体外へ排泄<sup>せつ</sup>するための器官系である。

313 泌尿器のほかに、広義の排泄<sup>せつ</sup>器官としては、二酸化炭素を排出する呼吸器や、老廃物を汗とし  
314 て排出する外皮等も含まれるが、生命活動によって生じた老廃物の排出のほとんどは、泌尿器系  
315 によって行われている。

## 316 (a) 腎臓

317 横隔膜の下、背骨の左右両側に位置する一对の空豆状の臓器で、内側中央部のくびれた部  
318 分に尿管、動脈、静脈、リンパ管等がつながっている。

319 腎臓に入る動脈は細かく枝分かれして、毛細血管が小さな球状になった糸球体を形成する。  
320 糸球体の外側を袋状のボウマン嚢<sup>のう</sup>が包み込んでおり、これを腎小体という。ボウマン嚢<sup>のう</sup>から  
321 1本の尿細管が伸びて、腎小体と尿細管とで腎臓の基本的な機能単位（ネフロン）を構成し  
322 ている。

323 腎小体では、肝臓でアミノ酸が分解されて生成する尿素など、血液中の老廃物が濾過<sup>ろ</sup>され、  
324 原尿として尿細管へ入る。そのほか、血球やタンパク質以外の血漿<sup>しょう</sup>成分も、腎小体で濾過<sup>ろ</sup>  
325 される。尿細管では、原尿中のブドウ糖やアミノ酸等の栄養分及び血液の維持に必要な水分や  
326 電解質が再吸収される。その結果、老廃物が濃縮され、余分な水分、電解質とともに最終的  
327 に尿となる。

328 腎臓には、心臓から拍出される血液の1/5～1/4が流れている。血液中の老廃物の除  
329 去のほか、水分及び電解質（特にナトリウム）の排出調節が行われており、血液の量と組成  
330 を維持して、血圧を一定範囲内に保つ上でも重要な役割を担っている。

331 このほか腎臓には内分泌腺としての機能もあり、骨髄における赤血球の産生を促進するホ  
332 ルモンを分泌する。また、食品から摂取あるいは体内で生合成されたビタミンDは、腎臓で  
333 活性型ビタミンDに転換されて、骨の形成や維持の作用を発揮する。

334 【副腎】 左右の腎臓の上部にそれぞれ附属し、皮質と髄質の2層構造からなる。

335 副腎皮質では、副腎皮質ホルモン<sup>xxxiii</sup>が産生・分泌される。副腎皮質ホルモンの一つである  
336 アルドステロンは、体内に塩分と水を貯留し、カリウムの排泄<sup>せつ</sup>を促す作用があり、電解質と  
337 水分の排出調節の役割を担っている<sup>xxxiv</sup>。

338 一方、副腎髄質では、自律神経系に作用するアドレナリン（エピネフリン）とノルアドレ  
339 ナリン（ノルエピネフリン）が産生・分泌される。

340 (b) 尿路（膀胱<sup>ぼうこう</sup>、尿道）

341 左右の腎臓と膀胱<sup>ぼうこう</sup>は尿管でつながっており、腎臓から膀胱<sup>ぼうこう</sup>を経て尿道に至る尿の通り道を

<sup>xxxiii</sup> ステロイドという共通する化学構造を持つことから、ステロイドホルモンともいう。医薬品に用いられるステロイド性抗消炎成分は、化学的に合成された副腎皮質ホルモンの誘導体である。

<sup>xxxiv</sup> アルドステロンの分泌が過剰になると、高血圧、むくみ（浮腫）、カリウム喪失などを生じる（アルドステロン症）。



342 尿路という。尿のほとんどは水分で、尿素、尿酸等の老廃物、その他微量の電解質、ホルモ  
 343 ン等を含む。尿は血液が濾過されて作られるため、糞便とは異なり、健康な状態であれば細  
 344 菌等の微生物は存在しない。

345 【膀胱】 下腹部の中央に位置し、尿を一時的に溜める袋状の器官である。尿が膀胱に溜まっ  
 346 てくると刺激が脳に伝わって尿意が生じる。膀胱の出口にある膀胱括約筋が緩むと、同時に  
 347 膀胱壁の排尿筋が収縮し、尿が尿道へと押し出される。

348 【尿道】 膀胱に溜まった尿が体外に排泄されるときに通る管である。女性は尿道が短いため、  
 349 細菌などが侵入したとき膀胱まで感染を生じやすい。高齢者では、膀胱や尿道の括約筋の働  
 350 きによって排尿を制御する機能が低下し、また、膀胱の容量が小さくなるため、尿失禁を起  
 351 こしやすくなる。また、男性では、膀胱の真下に尿道を取り囲むように前立腺がある。加齢  
 352 とともに前立腺が肥大し、尿道を圧迫して排尿困難等を生じることがある。

353

## 354 2 目、鼻、耳などの感覚器官

355 外界における種々の現象を刺激として、脳に伝えるための器官である。可視光線<sup>xxxv</sup>を感じる視  
 356 覚器（目）、空気中を漂う物質の刺激を感じる嗅覚器（鼻）、音を感じる聴覚器（耳）等、それぞ  
 357 の感覚器は、その対象とする特定の感覚情報を捉えるため独自の機能を持っており、他の器官で  
 358 はそれらを感じとれない。また、各感覚器は外気と直接接触れる状態にあり、病原物質、アレルゲ  
 359 ン等の様々な異物に曝<sup>さら</sup>されている部分でもある。

### 360 1) 目

361 視覚情報の受容器官で、明暗、色及びそれらの位置、時間的な変化（動き）を感じとる眼球と、  
 362 眼瞼<sup>けん</sup>、結膜、涙器、眼筋等からなる。顔面の左右に1対あり、物体の遠近感を認識することがで  
 363 きる。

#### 364 (a) 眼球

365 頭蓋骨のくぼみ（眼窩<sup>か</sup>）に収まっている球形の器官で、外側は、正面前方付近（黒目の部  
 366 分）のみ透明な角膜が覆い、その他の部分は強膜という乳白色の比較的丈夫な結合組織が覆  
 367 っている。紫外線を含む光に長時間曝<sup>さら</sup>されると、角膜の上皮に損傷を生じることがある（雪  
 368 眼炎。雪目ともいう。）。

369 角膜と水晶体の間は、組織液（房水）で満たされ、眼内角膜に一定の圧（眼圧）を生じさせ  
 370 ている。透明な角膜や水晶体には血管が通っておらず、房水によって栄養分や酸素が供給さ  
 371 れる。水晶体の前には虹彩があり、瞳孔を散大・縮小させて眼球内に入る光の量を調節して  
 372 いる。水晶体から網膜までの眼球内は、硝子体という透明のゼリー状組織で満たされている。

373 角膜に射し込んだ光は、角膜、房水、水晶体、硝子体を透過しながら屈折して網膜に焦点

<sup>xxxv</sup> 電磁波のうち、ヒトの目で知覚される波長域にあるもの。太陽光は、可視光線よりも波長の短い紫外線、波長の長い赤外線なども含んでいるが、ヒトの目はそれらを知覚することができない。

374 を結ぶが、主に水晶体の厚みを変化させることによって、遠近の焦点調節が行われている。  
 375 水晶体は、その周りを囲んでいる毛様体の収縮・弛緩によって、近くのものを見るときには丸  
 376 く厚みが増し、遠くのものを見るときには扁平になる。

377 網膜には光を受容する細胞（視細胞）が密集していて、個々の視細胞が受容した光の情報は網膜内の神経細胞を介して神経線維に伝えられる。つながり、それが束なって網膜の神経  
 378 線維は眼球の後方で束になり、視神経となる。視細胞には、色を識別する細胞と、わずかな  
 379 光でも敏感に反応する細胞の二種類がある。後者が光を感じる反応にはビタミンAが不可欠  
 380 であるため、ビタミンAが不足すると夜間視力の低下（夜盲症）を生じる。

#### 382 (b) 眼瞼、結膜、涙器、眼筋

383 【眼瞼（まぶた）】 眼球の前面を覆う薄い皮膚のひだで、物理的・化学的刺激から目を防護す  
 384 るほか、まぶしいとき目に射し込む光の量を低減させたり、まばたきによって目の表面を涙  
 385 液で潤して清浄に保つなどの機能がある。

386 上下の眼瞼の縁には睫毛（まつげ）があり、ゴミや埃等の異物をはじいて目に入らないよ  
 387 うにするとともに、物が触れると反射的に目を閉じる触毛としての機能がある。

388 眼瞼は、素早くまばたき運動ができるよう、皮下組織が少なく薄くできているため、内出  
 389 血や裂傷を生じやすい。また、むくみ（浮腫）等、全身的な体調不良（薬の副作用を含む）の  
 390 症状が現れやすい部位である。

391 【結膜】 眼瞼の裏側と眼球前方の強膜（白目の部分）とを結ぶように覆って組織を保護して  
 392 いる。薄い透明な膜であるため、中を通っている血管が外部から容易に観察できる。

393 目の充血は血管が拡張して赤く見える状態<sup>xxxvi</sup>であるが、結膜の充血では白目の部分だけ  
 394 なく眼瞼の裏側も赤くなる。強膜が充血したときは、眼瞼の裏側は赤くならず、強膜自体が  
 395 乳白色であるため、白目の部分がピンク味を帯びる。

396 【涙器】 涙液を分泌する涙腺と、涙液を鼻腔に導出する涙道からなる。涙腺は上眼瞼の裏側  
 397 にある分泌腺で、血漿から涙液を産生する。

398 涙液の主な働きとしては、(1) ゴミや埃等の異物や刺激性の化学物質が目に入ったときに、  
 399 それらを洗い流す、(2) 角膜に酸素や栄養分を供給する、(3) 角膜や結膜で生じた老廃物を  
 400 洗い流す、(4) 目が鮮明な視覚情報を得られるよう角膜表面を滑らかに保つ、(5) リゾチー  
 401 ム、免疫グロブリン等を含み、角膜や結膜を感染から防御する、等がある。

402 涙液は起きている間は絶えず分泌されており、目頭の内側にある小さな孔（涙点）から涙  
 403 道に流れこんでいる。涙液分泌がほとんどない睡眠中や、涙液の働きが悪くなったときには、  
 404 滞留した老廃物に粘液や脂分が混じって眼脂（目やに）となる。

405 【眼筋】 眼球を上下左右斜めの各方向に向けるため、6本の眼筋が眼球側面の強膜につな

xxxvi 単に「目が赤い」というときは、充血と内出血（結膜下出血）がきちんと区別されることが重要である。

406 っている。眼球の動きが少なく、眼球を同じ位置に長時間支持していると眼筋が疲労する。  
407 目を使う作業を続けると、眼筋の疲労のほか、遠近の焦点調節を行っている毛様体の疲労  
408 や、周期的まばたきが少なくなって涙液の供給不足等を生じ、目のかすみや充血、痛み等の  
409 症状（疲れ目）が起こる。こうした生理的な目の疲れではなく、メガネやコンタクトレンズ  
410 が合っていなかったり、神経性の疲労（ストレス）、睡眠不足、栄養不良等が要因となって、  
411 慢性的な目の疲れに肩こり、頭痛等の全身症状を伴う場合を眼精疲労という。

412

## 413 2) 鼻

414 嗅覚情報の受容器官で、空気中を漂う物質を鼻腔内に吸い込み、その化学的刺激を感じとる。  
415 食品からの嗅覚情報は、舌が受容した味覚情報と脳において統合され、風味として認識される。

## 416 (a) 鼻腔

417 鼻腔上部の粘膜にある特殊な神経細胞（嗅細胞）を、においの元となる物質の分子（にお  
418 い分子）が刺激すると、その刺激が脳の嗅覚中枢へ伝えられる。においに対する感覚は非常  
419 に鋭敏であるが順応を起こしやすく、長時間同じにおいを継続して嗅いでいると次第にその  
420 においを感じなくなる。

421 鼻腔は、薄い板状の軟骨と骨でできた鼻中隔によって左右に仕切られている。鼻中隔の前  
422 部は、毛細血管が豊富に分布していることに加えて粘膜が薄いため、傷つきやすく鼻出血を  
423 起こしやすい。鼻腔の粘膜に炎症を起こして腫れた状態を鼻炎といい、鼻汁過多や鼻閉（鼻  
424 づまり）などの症状を生じる。

## 425 (b) 副鼻腔

426 鼻の周囲の骨内には、骨の強さや形を保ちつつ重量を軽くするため、鼻腔に隣接した目と  
427 目の間、額部分、頬の下、鼻腔の奥に空洞があり、それらを総称して副鼻腔という。いずれ  
428 も鼻腔と細い管でつながっている。

429 副鼻腔も、鼻腔と同様、線毛を有し粘液を分泌する細胞でできた粘膜で覆われている。副  
430 鼻腔に入った埃等の粒子は、粘液に捉えられて線毛の働きによって鼻腔内へ排出されるが、  
431 鼻腔と連絡する管は非常に狭いため、鼻腔粘膜が腫れると副鼻腔の開口部がふさがりやす  
432 くなり、副鼻腔に炎症を生じることがある。

433

## 434 3) 耳

435 聴覚情報と平衡感覚を感知する器官で、外耳、中耳、内耳からなる。側頭部の左右両側に1対  
436 あり、音の立体感を認識することができる。

## 437 (a) 外耳

438 側頭部から突出した耳介と、耳介で集められた音を鼓膜まで伝導する外耳道からなる。

439 耳介は軟骨組織が皮膚で覆われたもので、外耳道の軟骨部に連なっている。軟骨部には耳

440 毛が生えていて、空気中の埃<sup>ほこり</sup>等が入り込むのを防いでいる。外耳道にある耳垢腺（汗腺の一  
441 種）や皮脂腺からの分泌物に、埃<sup>ほこり</sup>や外耳道上皮の老廃物などが混じって耳垢（耳あか）とな  
442 る。

443 (b) 中耳

444 外耳と内耳をつなぐ部分で、鼓膜、鼓室、耳小骨、耳管からなる。

445 外耳道を伝わってきた音は、鼓膜を振動させる。鼓室の内部では、互いに連結した微細な  
446 3つの耳小骨が鼓膜の振動を増幅して、内耳へ伝導する。

447 鼓室は、耳管という管で鼻腔<sup>くわう</sup>や咽頭と通じている。急な気圧変化のため鼓膜の内外に気圧  
448 差が生じると、耳がつまったような不快感や痛みなどを感じるが、顎を動かす等の耳抜き動  
449 作によって意識的に耳管を開けると気圧の均衡が戻って回復する。また、小さな子供では、  
450 耳管が太く短くて、走行が水平に近いため、鼻腔<sup>くわう</sup>からウイルスや細菌が侵入し感染が起こり  
451 やすい。

452 (c) 内耳

453 聴覚器官である蝸牛<sup>か</sup>と、平衡器官である前庭の2つの部分からなる。

454 蝸牛<sup>か</sup>は渦巻き形をした器官で、内部はリンパ液で満たされ、中耳の耳小骨から伝わる振動  
455 がリンパ液を震わせ、その振動が聴細胞の小突起（感覚毛）を揺らして、聴神経が刺激され  
456 る。

457 前庭は、水平・垂直方向の加速度を感知する部分（耳石器官）と、体の回転や傾きを感知  
458 する部分（半規管）に分けられる。蝸牛<sup>か</sup>と同様、内部はリンパ液で満たされており、リンパ  
459 液の動きが平衡感覚として感知される。乗り物酔い（動揺病）は、乗り物に乗っているとき  
460 反復される加速度刺激や動揺によって、平衡感覚が混乱して生じる身体の変調である。

461

462 3 皮膚、骨・関節、筋肉などの運動器官

463 1) 外皮系

464 身体を覆う皮膚と、汗腺、皮脂腺、乳腺等の皮膚腺、爪や毛等の角質を総称して外皮系という。

465 皮膚には、主に次のような機能がある。

466 ○ 身体の維持と保護：体表面を包み、体の形を維持し、保護する（バリア機能）。また、細菌  
467 等の異物の体内への侵入を防ぐ。爪や毛等の角質は皮膚の一部が変化してできたもので、皮  
468 膚に強度を与えて体を保護している。

469 ○ 体水分の保持：体の水分が体外に蒸発しないよう、又は、逆に水分が体内に浸透しないよう  
470 遮断している。

471 ○ 熱交換：外界と体内の熱のやり取りをする機能で、体温を一定に保つため重要な役割を担っ  
472 ている。体温が上がり始めると、皮膚を通っている毛細血管に血液がより多く流れるように  
473 血管が開き、体外へより多くの熱を排出する。また、汗腺から汗を分泌し、その蒸発時の気

474 化熱を利用して体温を下げる。逆に、体温が下がり始めると血管は収縮して、放熱を抑える。  
475 ○ 外界情報の感知：触覚、圧覚、痛覚、温度感覚等の皮膚感覚を得る感覚器としての機能も有  
476 している。

477 ヒトの皮膚の表面には常に一定の微生物が付着しており、それら微生物の存在によって、皮膚  
478 の表面での病原菌の繁殖が抑えられ、また、病原菌の体内への侵入が妨げられている。皮膚の表  
479 面に存在する微生物のバランスが崩れたり、皮膚を構成する組織に損傷を生じると、病原菌の繁  
480 殖、侵入が起こりやすくなる。生体は、それらを排除する反応として免疫機能を活性化させ、そ  
481 の結果、皮膚に炎症を生じ、発疹<sup>しん</sup>や発赤<sup>かゆ</sup>、痒み等の症状が現れることがある。

482 皮膚は、表皮、真皮、皮下組織の3層構造からなる。表皮は最も外側にある角質層と生きた表  
483 皮細胞の層に分けられる。角質層は、細胞膜が丈夫な線維性のタンパク質（ケラチン）でできた  
484 板状の角質細胞と、セラミド（リン脂質の一種）を主成分とする細胞間脂質で構成されており、  
485 皮膚のバリア機能を担っている。皮膚に物理的な刺激が繰り返されると角質層が肥厚して、たこ  
486 やうおのめができる。

487 皮膚の色は、表皮や真皮に沈着したメラニン色素によるものである。メラニン色素は、表皮の  
488 最下層にあるメラニン産生細胞（メラノサイト）で産生され、太陽光に含まれる紫外線から皮膚  
489 組織を防護する役割がある。メラニン色素の防護能力を超える紫外線に曝<sup>さら</sup>されると、皮膚組織が  
490 損傷を受け、炎症を生じて発熱<sup>ほつ</sup>や水疱、痛み等の症状が起きる。また、メラノサイトが活性化さ  
491 れてメラニン色素の過剰な産生が起こり、シミやそばかすとして沈着する。

492 真皮は、線維芽細胞とその細胞で産生された線維性のタンパク質（コラーゲン、フィブリリン、  
493 エラスチン等）からなる結合組織の層で、皮膚の弾力と強さを与えている。また、真皮には、毛  
494 細血管や知覚神経の末端が通っている。

495 真皮の下には皮下組織があり、脂肪細胞が多く集まって皮下脂肪層となっている。皮下脂肪層  
496 は、外気の熱や寒さから体を守るとともに、衝撃から体を保護するほか、脂質としてエネルギー  
497 源を蓄える機能がある。

498 皮膚の付属器として毛がある。毛根の最も深い部分を毛球という。毛球の下端のへこんでいる  
499 部分を毛乳頭といい、毛乳頭には毛細血管が入り込んで、取り巻く毛母細胞に栄養分を運んでい  
500 る。毛母細胞では細胞分裂が盛んに行われ、次々に分裂してできる新しい細胞が押し上げられ、  
501 次第に角化して毛を形成していく。毛母細胞の間にはメラノサイトが分布し、産生されたメラニ  
502 ン色素が毛母細胞に渡される。このメラニン色素の量によって毛の色が決まる。

503 毛根を鞘<sup>まげ</sup>状に包んでいる毛包には、立毛筋と皮脂腺がつながっている。立毛筋は、気温や感情  
504 の変化などの刺激により収縮し、毛穴が隆起する立毛反射（いわゆる「鳥肌」）が生じる。

505 皮脂腺は腺細胞が集まってできており、脂分を蓄えて死んだ腺細胞自身が分泌物（皮脂）とな  
506 って毛穴から排出される。皮脂は、皮膚を潤いのある柔軟な状態に保つとともに、外部からの異  
507 物に対する保護膜としての働きがある。皮脂の分泌が低下すると皮膚が乾燥し、皮膚炎や湿疹<sup>しん</sup>を

508 起こすことがある。

509 汗腺には、腋窩（わきのした）などの毛根部に分布するアポクリン腺（体臭腺）と、手のひらな  
510 ど毛根がないところも含め全身に分布するエクリン腺の二種類がある。汗はエクリン腺から分泌  
511 され、体温調節のための発汗は全身の皮膚に生じるが、精神的緊張による発汗は手のひらや足底、  
512 脇の下の皮膚、顔面などの限られた皮膚に生じる限って起こる<sup>xxxvii</sup>。

513

## 514 2) 骨格系

515 骨格系は骨と関節からなり、骨と骨が関節で接合し、相連なって体を支えている。

516 骨は体の器官のうち最も硬い組織の一つで、その基本構造は、(1) 主部となる骨質、(2) 骨質  
517 表面を覆う骨膜、(3) 骨質内部の骨髓、(4) 骨の接合部にある関節軟骨、の四組織からなる。

518 骨には次のような機能がある。

519 ○ 身体各部の支持機能：頭部や内臓を支える身体の支柱となる。

520 ○ 臓器保護機能：骨格内に臓器を収め、保護する。

521 ○ 運動機能：骨格筋の収縮を効果的に体躯の運動に転換する。

522 ○ 造血機能：骨髓で産生される造血幹細胞<sup>xxxviii</sup>から赤血球、白血球、血小板が分化することに  
523 より、体内に供給する。

524 ○ 貯蔵機能：カルシウム<sup>xxxix</sup>やリン等の無機質を蓄える。

525 骨は生きた組織であり、成長が停止した後も一生を通じて破壊（骨吸収）と修復（骨形成）が  
526 行われている。骨吸収と骨形成とが互いに密接な連絡を保ちながら進行し、これが繰り返される  
527 ことで骨の新陳代謝が行われる。骨組織を構成する無機質は、炭酸カルシウムやリン酸カルシウ  
528 ム等の石灰質からなるが、それらのカルシウムが骨から溶け出し、ほぼ同量のカルシウムが骨に  
529 沈着する。吸収と形成のバランスが取られることにより、一定の骨密度が保たれる。無機質は骨  
530 に硬さを与え、有機質（タンパク質及び多糖体）は骨の強靱さを保つ。

531 関節とは、広義には骨と骨の接続全般を指すが、狭義には複数の骨が互いに運動できるように  
532 連結したもの（可動関節）をいう。骨の関節面は弾力性に富む柔らかな軟骨層（関節軟骨）に覆  
533 われ、これが衝撃を和らげ、関節の動きを滑らかにしている。関節周囲を包む膜（滑膜関節膜）  
534 は軟骨の働きを助け、の外側には靱帯はがあって骨を連結し、関節部を補強している。

535

## 536 3) 筋組織

537 筋組織は、筋細胞（筋線維）とそれらをつなぐ結合組織からなり、その機能や形態によって、

<sup>xxxvii</sup> 疲労や衰弱したときの睡眠中に生じる発汗（ねあせ寝汗。漢方では「盗汗」という）も、体温調節とは無関係に起こる。

<sup>xxxviii</sup> すべての骨の骨髓で造血が行われるわけではなく、主として胸骨、肋骨、脊椎、骨盤、大腿骨などが造血機能を担う。

<sup>xxxix</sup> カルシウムは、生体の生理機能に関与する重要な物質であり、細胞内において微量で筋組織の収縮、神経の伝達調節などに働いている。

538 骨格筋、平滑筋、心筋に分類される。

539 このうち運動器官とされるのは骨格筋であり、関節を動かす骨格筋は、関節を構成する骨に腱  
540 を介してつながっている。筋組織は筋細胞と結合組織からできているのに対して、腱は結合組織  
541 のみでできているため、伸縮性はあまりない。

542 骨格筋は、筋線維を顕微鏡で観察すると横縞模様（横紋）が見えるので横紋筋とも呼ばれる。  
543 収縮力が強く、自分の意識どおりに動かすことができる随意筋であるが、疲労しやすく、長時間  
544 の動作は難しい。骨格筋の疲労は、運動を続けることでエネルギー源として蓄えられているグリ  
545 コーゲンが減少し、酸素や栄養分の供給不足が起こるとともに、グリコーゲンの代謝に伴って生  
546 成する乳酸が蓄積して、筋組織の収縮性が低下する現象である。

547 随意筋に対して、意識的にコントロールできない筋組織を不随意筋という。平滑筋と心筋は不  
548 随意筋である。平滑筋は、筋線維に骨格筋のような横縞模様がなく、消化管壁、血管壁、膀胱等  
549 に分布し、比較的弱い力で持続的に収縮する特徴がある。心筋は、心臓壁にある筋層を構成する  
550 筋組織で、不随意筋であるが筋線維には骨格筋のような横縞模様があり、強い収縮力と持久力を  
551 兼ね備えている。

552 筋組織は神経からの指令によって収縮するが、随意筋（骨格筋）は体性神経系（運動神経）で  
553 支配されるのに対して、不随意筋（平滑筋及び心筋）は自律神経系に支配されている。

554

#### 555 4 脳や神経系の働き

556 体内の情報伝達の大半を担う組織として、神経細胞（~~神経線維ともいう。~~）が連なった神経系が  
557 ある。神経細胞の細胞体から伸びる細長い突起（軸索）を神経線維という。

558 身体の個々の組織は刺激によって反射的に動くことが出来るが、実際の人間の身体は個々の部  
559 位が単独で動いているものではなく総合的に制御されており、このような制御する部分を中枢と  
560 いい、一方、中枢によって制御される部分を末梢と呼ぶ。中枢は末梢からの刺激を受け取って統  
561 合し、それらに反応して興奮を起こし、末梢へ刺激を送り出すことで、末梢での動きを発生させ、  
562 人間の身体を制御している。したがって、神経系もその働きにより、中枢神経系と末梢神経系と  
563 に大別される。

##### 564 1) 中枢神経系

565 中枢神経系は脳と脊髄から構成される。

566 脳は、頭の上部から下後方部にあり、知覚、運動、記憶、情動、意思決定等の働きを行ってい  
567 る。脳の下部には、自律神経系、ホルモン分泌等の様々な調節機能を担っている部位（視床下部  
568 など）がある。

569 脳における細胞同士の複雑かつ活発な働きのため、脳において、血液の循環量は心拍出量の約  
570 15%、酸素の消費量は全身の約20%、ブドウ糖の消費量は全身の約25%と多い。

571 脳内には多くの血管が通っているが、脳の血管は末梢に比べて物質の透過に関する選択性が高

く、タンパク質などの大分子や小分子でもイオン化した物質は血液中から脳の組織へ移行しにくい。このように、脳の毛細血管が中枢神経の間質液環境を血液内の組成変動から保護するように働く機能を血液脳関門という。小児では、血液脳関門が未発達であるため、循環血液中に移行した医薬品の成分が脳の組織に達しやすい。

脳は脊髄と、延髄（後頭部と頸部の境目あたりに位置する）でつながっている。延髄には、心拍数を調節する心臓中枢、呼吸を調節する呼吸中枢等がある。延髄は多くの生体の機能を制御する部位であるが、複雑な機能の場合はさらに上位の脳の働きによって制御されている。

脊髄は脊椎の中にあり、脳と末梢の間で刺激を伝えるほか、末梢からの刺激の一部に対して脳を介さずに刺激を返す場合があり、これを脊髄反射と呼ぶ。

581

## 582 2) 末梢神経系

脳や脊髄から体の各部へと伸びている末梢神経系は、その機能に着目して、随意運動、知覚等を担う体性神経系と、消化管の運動呼吸や血液の循環等のように生命や身体機能の維持のため無意識に働いている機能を担う自律神経系に分類される。

【自律神経系の働き】 自律神経系は、交感神経系と副交感神経系からなる。概ね、交感神経系は体が闘争や恐怖等の緊張状態に対応した態勢をとるように働き、副交感神経系は体が食事や休憩等の安息状態となるように働く。

効果を及ぼす各臓器・器官（効果器）に対して、交感神経系と副交感神経系の二つの神経線維が支配している（自律神経系の二重支配）。通常、交感神経系と副交感神経系は、互いに拮抗して働き、一方が活発になっているときには他方は活動を抑制して、効果器を制御している。

効果器に伸びる自律神経は、節前線維と節後線維からできている。交感神経と副交感神経は、効果器でそれぞれの神経線維の末端から神経伝達物質と呼ばれる生体物質を放出し、効果器を作動させている。交感神経の節後線維の末端から放出される神経伝達物質はノルアドレナリンであり、副交感神経の節後線維の末端から放出される神経伝達物質はアセチルコリンである。ただし、汗腺を支配する交感神経線維の末端では、例外的にアセチルコリンが伝達物質として放出される<sup>x1</sup>。

医薬品の成分が体内で薬効又は副作用をもたらす際も、自律神経系への作用や影響が重要である。効果器に対してアドレナリン様の作用を有する成分をアドレナリン作動成分、アセチルコリン様の作用を有する成分をコリン作動成分という。それらと逆に、神経伝達物質であるアドレナリンの働きを抑える作用（抗アドレナリン作用）を有する成分を抗アドレナリン成分、アセチルコリンの働きを抑える作用（抗コリン作用）を有する成分を抗コリン成分という。

<sup>x1</sup> 全身に広く分布するエクリン腺を支配する交感神経線維の末端ではアセチルコリンが神経伝達物質として放出されるが、局所（腋窩等）に分布するアポクリン腺を支配する交感神経線維の末端ではノルアドレナリンが神経伝達物質として放出される。



603

効果器	交感神経系	副交感神経系
目	瞳孔散大	瞳孔収縮
唾液腺	少量の粘性の高い唾液を分泌	唾液分泌亢進 <sup>こうしん</sup>
心臓	心拍数増加	心拍数減少
末梢血管 <sup>xli</sup>	収縮（→血圧上昇）	拡張（→血圧降下）
気管、気管支	拡張	収縮
胃	血管の収縮	胃液分泌亢進 <sup>こうしん</sup>
腸	運動低下	運動亢進 <sup>こうしん</sup>
肝臓	グリコーゲンの分解 （ブドウ糖の放出）	グリコーゲンの合成
皮膚	立毛筋収縮	－
汗腺	発汗亢進 <sup>こうしん</sup>	－
ぼうこう膀胱	排尿筋の弛緩（→排尿抑制）	排尿筋の収縮（→排尿促進）

604

## 605 II 薬が働く仕組み

606 医薬品の作用には、有効成分が消化管などから吸収されて循環血液中に移行し、全身を巡って  
607 薬効をもたらす全身作用と、特定の狭い身体部位において薬効をもたらす局所作用とがある。内  
608 服した医薬品が全身作用を現わすまでには、消化管からの吸収、代謝と作用部位への分布という  
609 過程を経るため、ある程度の時間が必要であるのに対し、局所作用は医薬品の適用部位が作用部  
610 位である場合が多いため、反応は比較的速やかに現れる。

611 内服薬は全身作用を示すものが多いが、膨潤性下剤や生菌製剤等のように、有効成分が消化管  
612 内で作用するものもあり、その場合に現れる作用は局所作用である。また、胃腸に作用する薬で  
613 あっても、有効成分が循環血液中に入ってから薬効をもたらす場合には、その作用は全身作用の  
614 一部であることに注意が必要である。

615 外用薬の場合、適用部位に対する局所的な効果を目的としていることが多い。また、坐剤、経  
616 皮吸収製剤等では、適用部位から吸収された有効成分が、循環血液中に移行して全身作用を示す  
617 ことを目的として設計されたものも存在する。

618 副作用にも、全身作用によるものと局所作用によるものがある。局所作用を目的とする医薬  
619 品によって全身性の副作用が生じたり、逆に、全身作用を目的とする医薬品で局所的な副作用が  
620 生じることもある。

621 医薬品が体内で引き起こす作用（薬効と副作用）を理解するには、使用された医薬品が体内で  
622 どのような挙動を示し、どのように体内から消失していくのか（薬物動態）に関する知識が不可  
623 欠である。

624

### 625 1) 薬の生体内運命

#### 626 (a) 有効成分の吸収

<sup>xli</sup> 骨格筋の血管平滑筋など、交感神経系への刺激で拡張するものもある。

627 全身作用を目的とする医薬品では、その有効成分が消化管等から吸収されて、循環血液中に  
628 移行することが不可欠である。なお、循環血液中に移行せずに薬効を発揮する医薬品であって  
629 も、その成分が体内から消失する過程では、吸収されて循環血液中に移行する場合がある。

630 局所作用を目的とする医薬品の場合は、目的とする局所の組織に有効成分が浸透して作用す  
631 るものが多い。

#### 632 ① 消化管吸収

633 内服薬のほとんどは、その有効成分が消化管から吸収されて循環血液中に移行し、全身  
634 作用を現す。錠剤、カプセル剤等の固形剤の場合、消化管で吸収される前に、錠剤等が消  
635 化管内で崩壊して、有効成分が溶け出さなければならないが、腸溶性製剤のような特殊な  
636 ものを除き、胃で有効成分が溶出するものが大部分である。内服薬の中には、服用後の作  
637 用を持続させるため、有効成分がゆっくりと溶出するように作られているもの（徐放性製  
638 剤）もある。

639 有効成分は主に小腸で吸収される。一般に、消化管からの吸収は、~~消化管が積極的に医~~  
640 ~~薬品成分を取り込むのではなく、~~濃度の高い方から低い方へ受動的に拡散していく現象で  
641 ある。有効成分の吸収量や吸収速度は、消化管内容物や他の医薬品の作用によって影響を  
642 受ける。また、有効成分によっては消化管の粘膜に障害を起こすものもあるため、食事の  
643 時間と服用時期との関係が、各医薬品の用法に定められている。

644 全身作用を目的としない内服薬は、本来、有効成分が消化管から吸収されることによっ  
645 て薬効を発揮するわけではなく、有効成分はそのまま糞便中に排泄せつされることとなるが、  
646 中には消化管内を通過する間に結果的に吸収されてしまうものがある。その場合、循環血  
647 液中に移行した有効成分によって、好ましくない作用（副作用）を生じることがある。

#### 648 ② 内服以外の用法における粘膜からの吸収

649 内服以外の用法で使用される医薬品には、適用部位から有効成分を吸収させて、全身作  
650 用を発揮させることを目的とするものがある。

651 坐剤はその代表的な例である。肛門こうもんから医薬品を挿入することにより、直腸内で溶解さ  
652 せ、薄い直腸内壁の粘膜から有効成分を吸収させるものである。直腸の粘膜下には静脈が  
653 豊富に分布して通っており、有効成分は容易に循環血液中に入るため、内服の場合よりも  
654 全身作用が速やかに現れる。また、口に含むため内服と混同されやすいが、抗狭心症薬の  
655 ニトログリセリン（舌下錠、スプレー）や禁煙補助薬のニコチン（咀嚼剤そしゃく）のように、有効  
656 成分が口腔粘膜くわうから吸収されて全身作用を現すものもある。

657 これらの部位を通過している静脈血は肝臓を経由せずに心臓に至るため、吸収されて循  
658 環血液中に入った成分は、初めに肝臓で代謝を受けることなく全身に分布する。ただ、医  
659 薬品によっては、適用部位の粘膜に刺激等の局所的な副作用を生じることがある。したが  
660 って、そのような副作用を回避するため、また、その有効成分の急激な吸収による全身性

661 の副作用を回避するため、粘膜に障害があるときは使用を避けるべきである。

662 鼻腔の粘膜に医薬品を適用する場合も、その成分は循環血液中に入るが、一般用医薬品  
663 には全身作用を目的とした点鼻薬はなく、いずれの医薬品も、鼻腔粘膜への局所作用を目的  
664 として用いられている。しかし、鼻腔粘膜の下には毛細血管が豊富なため、点鼻薬の成分  
665 は循環血液中に移行しやすく、また、坐剤等の場合と同様に、初めに肝臓で代謝を受ける  
666 ことなく全身に分布するため、全身性の副作用を生じることがある<sup>xlii</sup>。

667 眼の粘膜に適用する点眼薬は、鼻涙管を通して鼻粘膜から吸収されることがある。従っ  
668 て、眼以外の部位に到達して副作用を起こすことがあるため、場合によっては点眼する際  
669 には目頭の鼻涙管の部分を押さえること<sup>によって</sup>、有効成分が鼻に流れるのを防ぐ必要がある。  
670

671 咽頭の粘膜に適用する含嗽薬（うがい薬）等の場合は、その多くが唾液や粘液によって  
672 食道へ流れてしまうため、咽頭粘膜からの吸収が原因で全身的な副作用が起こることは少  
673 ない。ただし、アレルギー反応は微量の抗原でも生じるため、点眼薬や含嗽薬（うがい薬）  
674 等でもショック（アナフィラキシー）等のアレルギー性副作用を生じることがある。

### 675 ③ 皮膚吸収

676 皮膚に適用する医薬品（塗り薬、貼り薬等）は、適用部位に対する局所的な効果を目的  
677 とするものがほとんどである。殺菌消毒薬等のように、有効成分が皮膚の表面で作用する  
678 ものもあるが、有効成分が皮膚から浸透して体内の組織で作用する医薬品の場合は、浸透  
679 する量は皮膚の状態<sup>xliii</sup>、傷の有無やその程度などによって影響を受ける。

680 通常は、皮膚表面から循環血液中へ移行する量は比較的少ないが、粘膜吸収の場合と同  
681 様に、血液中に移行した有効成分は、肝臓で代謝を受ける前に血流に乗って全身に分布す  
682 るため、適用部位の面積（使用量）や使用回数、その頻度などによっては、全身作用が現  
683 れることがある。また、アレルギー性の副作用は、適用部位以外にも現れることがある。

#### 684 (b) 薬の代謝、排泄

685 代謝とは、物質が体内で化学的に変化することであるが、有効成分も循環血液中へ移行して  
686 体内を循環するうちに徐々に代謝を受けて、分解されたり、体内の他の物質が結合するなどし  
687 て構造が変化する。その結果、作用を失ったり（不活性化）、作用が現れたり（代謝的活性化）、  
688 あるいは体外へ排泄<sup>せつ</sup>されやすい水溶性の物質に変化したりする。

689 排泄<sup>せつ</sup>とは、代謝によって生じた物質（代謝物）が尿等で体外へ排出されることであり、有効  
690 成分は未変化体のままで、あるいは代謝物として、腎臓から尿中へ、肝臓から胆汁中へ、又は  
691 肺から呼気中へ排出される。体外への排出経路としては、その他に汗中や母乳中などがあるが、

<sup>xlii</sup> 坐剤であっても、直腸上部から有効成分が吸収されると、肝臓で代謝を受け、全身へ分布する有効成分の量が少なくなってしまう。

<sup>xliii</sup> 加齢等により皮膚のみずみずしさが低下すると、有効成分が浸潤・拡散しにくくなる。

692 体内からの消失経路としての意義は小さい。ただし、有効成分の母乳中への移行は、乳児に対  
693 する副作用の発現という点で、軽視することはできない。

694 ① 消化管で吸収されてから循環血液中に入るまでの間に起こる代謝

695 経口投与後、消化管で吸収された有効成分は、消化管の毛細血管から血液中へ移行する。  
696 その血液は全身循環に入る前に門脈という血管を経由して肝臓を通過するため、吸収され  
697 た有効成分は、まず肝臓に存在する酵素の働きにより代謝を受けることになる。したがっ  
698 て、全身循環に移行する有効成分の量は、消化管で吸収された量よりも、肝臓で代謝を受  
699 けた分だけ少なくなる（これを肝初回通過効果（first-pass effect）という）。肝機能が低下  
700 した人では医薬品を代謝する能力が低いと、正常な人に比べて全身循環に到達する有効  
701 成分の量がより多くなり、効き目が過剰に現れたり、副作用を生じやすくなったりする。  
702 なお、薬物代謝酵素の遺伝子型には個人差がある。<sup>xliv</sup>また、最近の研究により、小腸など  
703 の消化管粘膜や腎臓にも、かなり強い代謝活性があることが明らかにされている。

704 ② 循環血液中に移行した有効成分の代謝と排泄<sup>せつ</sup>

705 循環血液中に移行した有効成分は、主として肝細胞の薬物代謝酵素によって代謝を受け  
706 る。多くの有効成分は血液中で血漿タンパク質と結合して複合体を形成しており<sup>xlv</sup>、複合  
707 体を形成している有効成分の分子には薬物代謝酵素の作用で代謝されず、またトランスポ  
708 ーター<sup>xlvi</sup>によって輸送されることもない。したがって、代謝や分布が制限されるため、血  
709 中濃度の低下は徐々に起こる。

710 循環血液中に存在する有効成分の多くは、未変化体又は代謝物の形で腎臓から尿中に排  
711 泄<sup>せつ</sup>される。従って腎機能が低下した人では、正常の人よりも有効成分の尿中への排泄<sup>せつ</sup>が遅  
712 れ、血中濃度が下がりにくい。そのため、医薬品の効き目が過剰に現れたり、副作用を生  
713 じやすくなったりする。また、排泄<sup>せつ</sup>の過程においても血漿タンパク質との複合体形成は重  
714 要な意味を持つ。複合体は腎臓で濾過<sup>ろ</sup>されないため、有効成分が長く循環血液中に留ま  
715 ることとなり、作用が持続する原因となる。

716

717 2) 薬の体内での働き

718 循環血液中に移行した有効成分は、血流によって全身の組織・器官へ運ばれて作用するが、多  
719 数の場合、標的となる細胞に存在する受容体、酵素、トランスporterなどのタンパク質と結合  
720 し、その機能を変化させることで薬効や副作用を現す。そのため、医薬品が効果を発揮するため  
721 には、有効成分がその作用の対象である器官や組織の細胞外液中あるいは細胞内液（細胞質とい

<sup>xliv</sup> 小腸などの消化管粘膜や腎臓にも、代謝活性があることが明らかにされている。

<sup>xlv</sup> 血漿タンパク質との結合は速やかかつ可逆的で、一つ一つの分子はそれぞれ結合と解離を繰り返している。

<sup>xlvi</sup> 細胞膜の脂質二重層を貫き、埋め込まれて存在する膜貫通タンパク質で、細胞膜の外側から内側へ極性物質、イオンを選  
択的に運ぶ。

722 う)中に、一定以上の濃度で分布する必要がある。これらの濃度に強く関連するのが血中濃度<sup>xlvi</sup>  
723 である。医薬品が摂取された後、成分が吸収されるにつれてその血中濃度は上昇し、ある最小有  
724 効濃度(閾値)を超えたときに生体の反応としての薬効が現れる。血中濃度はある時点でピーク  
725 (最高血中濃度)に達し、その後は低下していくが、これは代謝・排泄<sup>せつ</sup>の速度が吸収・分布の速  
726 度を上回るためである。やがて、血中濃度が最小有効濃度を下回ると、薬効は消失する。

727 一度に大量の医薬品を摂取したり、十分な間隔をあげずに追加摂取したりして血中濃度を高く  
728 しても、ある濃度以上になるとより強い薬効は得られなくなり、薬効は頭打ちとなるが、一方、  
729 有害な作用(副作用や毒性)は現れやすくなる。

730 全身作用を目的とする医薬品の多くは、使用後の一定期間、その有効成分の血中濃度が、最小  
731 有効濃度未達の濃度域(無効域)と、毒性が現れる濃度域(危険域、中毒域ともいう)の間の範囲  
732 (有効域、治療域ともいう)に維持されるよう、使用量及び使用間隔が定められている<sup>xlvii</sup>。

733

### 734 3) 剤形ごとの違い、適切な使用方法

735 医薬品の作用には、全身作用と局所作用とがあることは前に述べたが、有効成分の性状はさま  
736 ざまであり、それぞれに特徴がある。医薬品がどのような形状で使用されるかは、その医薬品の  
737 使用目的と有効成分の性状とに合わせて決められる。そうした医薬品の形状のことを剤形という。

738 有効成分を消化管から吸収させ、全身に分布させることにより薬効をもたらすための剤形とし  
739 ては、錠剤(内服)、口腔用錠剤、カプセル剤、散剤・顆粒剤、経口液剤・シロップ剤等がある。  
740 これらの剤形の違いは、使用する人の利便性を高めたり、有効成分が溶け出す部位を限定したり、  
741 副作用を軽減したりすることに関連する。そのため、医薬品を使用する人の年齢や身体の状態等  
742 の違いに応じて、最適な剤形が選択されるよう、それぞれの剤形の特徴を理解する必要がある。

743 有効成分を患部局所に直接適用する剤形としては、軟膏剤、クリーム剤、外用液剤、貼付剤、  
744 スプレー剤等がある。これらの多くは、有効成分が同じであっても、配合されている添加剤等に  
745 違いがあり、剤形によっては症状を悪化させてしまう場合もあるため、患部の状態に応じて適切  
746 な剤形が選択されなければならない。

747 主な剤形に関する一般的な特徴は以下の通りであるが、特定の部位に使用される剤形や、剤形  
748 の違いが薬効や副作用に大きく影響する重要な医薬品については、第3章(主な医薬品とその作  
749 用)を参照して問題作成のこと。

#### 750 (a) 錠剤(内服)

751 錠剤は、内服用医薬品の剤形として最も広く用いられている。一定の形状に成型された固  
752 形製剤であるため、飛散させずに服用できる点や、有効成分の苦味や刺激性を口中で感じる

<sup>xlvi</sup> 器官や組織中に存在する医薬品成分の量を直接調べることは容易でないため、通常、血液中の濃度(血中濃度)を目安としている。

<sup>xlviii</sup> 年齢や体格等による個人差も考慮されている。

753 ことなく服用できる点が主な特徴となっている。一方、一定の大きさがある固形製剤である  
754 ため、高齢者、乳幼児等の場合、飲み込みにくいことがある。

755 錠剤（内服）を服用するときは、適切な量の水（又はぬるま湯）とともに飲み込まなければ  
756 ならない。水が少なかったり、水なしで服用したりすると、錠剤が喉や食道に張り付いて  
757 しまうことがあり、薬効が現れないのみならず、喉や食道の粘膜を傷めるおそれがある。

758 錠剤（内服）は、胃や腸で崩壊し、有効成分が溶出することが薬効発現の前提となる。し  
759 たがって例外的な場合を除いて、口中で噛み砕いて服用してはならない。特に腸内での溶解  
760 を目的として錠剤表面をコーティングしているもの（腸溶錠）の場合等は、厳に慎まなけれ  
761 ばならない。

762 (b) 口腔用錠剤

763 ① 口腔内崩壊錠

764 口の中の唾液で速やかに溶ける工夫がなされているため、水なしで服用することができる。  
765 固形物を飲み込むことが困難な高齢者や乳幼児、水分摂取が制限されている場合でも、  
766 口の中で溶かした後に、唾液と一緒に容易に飲み込むことができる。

767 ② チュアブル錠

768 口の中で舐めたり噛み砕いたりして服用する剤形であり、水なしでも服用できる。

769 ③ トローチ、ドロップ

770 薬効を期待する部位が口の中や喉であるものが多い。飲み込まずに口の中で舐めて、徐々  
771 に溶かして使用する。

772 (c) 散剤、顆粒剤

773 錠剤のように固形状に固めず、粉末状にしたものを散剤、小さな粒状にしたものを顆粒剤  
774 という。錠剤を飲み込むことが困難な人にとっては錠剤よりも服用しやすいが、口の中に広  
775 がって歯（入れ歯を含む。）の間に挟まったり、また、苦味や渋味を強く感じる場合がある。

776 散剤等を服用するときは、飛散を防ぐため、あらかじめ少量の水（又はぬるま湯）を口に  
777 含んだ上で服用したり、何回かに分けて少しずつ服用するなどの工夫をするとよい。口中に  
778 散剤等が残ったときには、さらに水などを口に含み、口腔内をすすぐようにして飲み込む。  
779 また、顆粒剤は粒の表面がコーティングされているものもあるので、噛み砕かずに水などで  
780 [飲み込む食道に流し込む](#)。

781 (d) 経口服液剤、シロップ剤

782 経口服液剤は、液状の剤形のうち、内服用の剤形である。固形製剤よりも飲み込みやすく、  
783 また、既に有効成分が液中に溶けたり分散したりしているため、服用後、比較的速やかに消  
784 化管から吸収されるという特徴がある。有効成分の血中濃度が上昇しやすいため、習慣性や  
785 依存性がある成分が配合されているもの場合、本来の目的と異なる不適正な使用がなされ  
786 ることがある。

787 経口液剤では苦味やにおいが強く感じられることがあるので、小児に用いる医薬品の場合、  
788 白糖等の糖類を混ぜたシロップ剤とすることが多い。~~シロップ剤は粘りがあるため容器に残り~~  
789 ~~やすいので、残った部分を水ですすいで、すすぎ液も飲むなどの工夫が必要である。~~

790 (e) カプセル剤

791 カプセル剤は、カプセル内に散剤や顆粒剤、液剤等を充填した剤形であり、内服用の医薬  
792 品として広く用いられている。固形の製剤であるため、その特徴は錠剤とほぼ同様であるが、  
793 カプセルの原材料として広く用いられているゼラチンはブタなどのタンパク質を主成分とし  
794 ているため、ゼラチンに対してアレルギーを持つ人は使用を避けるなどの注意が必要である。  
795 また、水なしで服用するとゼラチンが喉や食道に貼り付くことがあるため、必ず適切な量の  
796 水（又はぬるま湯）とともに服用する。

797 (f) 外用局所に適用する剤形

798 軟膏剤、クリーム剤、外用液剤、貼付剤、スプレー剤等があるが、それぞれの剤形の特性  
799 が適用局所における薬効や副作用に影響する。

800 ① 軟膏剤、クリーム剤

801 基剤の違いにより、軟膏剤とクリーム剤に大別される。有効成分が適用部位に留まりや  
802 すいという特徴がある。一般的には、適用する部位の状態に応じて、軟膏剤は、油性の基  
803 剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等には軟膏剤を用い、患部が  
804 乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる。また、クリーム剤は、  
805 油性基剤に水分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等にはクリーム剤を用られ  
806 いるが、ことが多い皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある。

807 ② 外用液剤

808 外用の液状製剤である。軟膏剤やクリーム剤に比べて、患部が乾きやすいという特徴が  
809 ある。また、適用部位に直接的な刺激感等を与える場合がある。

810 ③ 貼付剤

811 皮膚に貼り付けて用いる剤形であり、テープ剤及びパップ剤がある。適用部位に有効成  
812 分が一定時間留まるため、薬効の持続が期待できる反面、適用部位にかぶれなどを起こす  
813 場合もある。

814 ④ スプレー剤

815 有効成分を霧状にする等して局所に吹き付ける剤形である。手指等では塗りにくい部位  
816 や、広範囲に適用する場合に適している。

817  
818 **Ⅲ 症状からみた主な副作用**

819 医薬品は、十分注意して適正に使用された場合でも、副作用を生じることがある。一般に、重  
820 篤な副作用は発生頻度が低く、多くの患者はもちろん、医薬品の販売等に従事する専門家にとっ

821 ても遭遇する機会は極めてまれである。しかし、副作用の早期発見・早期対応のためには、医薬  
822 品の販売等に従事する専門家が副作用の症状に関する十分な知識を身に付けることが重要である。

823 厚生労働省では「重篤副作用総合対策事業」の一環として、関係学会の専門家等の協力を得て、  
824 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を作成し、公表している。本マニュアルが対象とする重篤  
825 副作用疾患の中には、一般用医薬品によって発生する副作用も含まれており、医薬品の販売等に  
826 従事する専門家は、購入者等への積極的な情報提供や相談対応に、本マニュアルを積極的に活用  
827 することが望ましい。

828 また、医薬品の販売等に従事する専門家は、購入者等に対して、一般用医薬品による副作用と  
829 疑われる症状について医療機関を受診を勧奨する際に、当該一般用医薬品の添付文書等を見せて  
830 説明するなどの対応をすることが望ましい。

831 一般用医薬品による副作用は、長期連用のほか、不適切な医薬品の併用や医薬品服用時のアル  
832 コール飲用等が原因で起きる場合があり、医薬品を使用する時の状況に応じて適切な指導を行う  
833 ことが重要である。

834

## 835 1 全身的に現れる副作用

### 836 1) ショック（アナフィラキシー）

837 ショック（アナフィラキシー）は、生体異物に対する即時型のアレルギー反応の一種である。  
838 原因物質によって発生頻度は異なり、医薬品の場合、以前にその医薬品によって蕁麻疹等のアレ  
839 ルギーを起こしたことがある人で起きる可能性が高い。

840 一般に、顔や上半身の紅潮・熱感、皮膚の痒み、蕁麻疹、口唇や舌・手足のしびれ感、むくみ  
841 （浮腫）、吐きけ、顔面蒼白、手足の冷感、冷や汗、息苦しさ・胸苦しきなど、複数の症状が現れ  
842 る。一旦発症すると病態は急速に悪化することが多く、適切な対応が遅れるとチアノーゼや呼吸  
843 困難等を生じ、**致命的な転帰をたどる死に至る**ことがある。

844 発症後の進行が非常に速やかな（通常、2時間以内に急変する。）ことが特徴であり、直ちに  
845 救急救命処置が可能な医療機関を受診する必要があるが、何よりも医薬品の使用者本人及びその  
846 家族等の冷静沈着な対応が非常に重要である。

847

### 848 2) 重篤な皮膚粘膜障害

#### 849 (a) 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）

850 皮膚粘膜眼症候群は、38℃以上の高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水疱等の激しい症  
851 状が比較的短時間のうちに全身の皮膚、口、眼等の粘膜に現れる病態で、最初に報告をした  
852 二人の医師の名前にちなんでスティーブンス・ジョンソン症候群（SJS）とも呼ばれる。

853 発生頻度は、人口100万人当たり年間1～6人と報告されている。発症機序の詳細は不  
854 明であり、また、発症の可能性のある医薬品の種類も多いため、発症の予測は極めて困難で



855 ある。

856 (b) 中毒性表皮壊死融解症（TEN）

857 中毒性表皮壊死融解症は、38℃以上の高熱を伴って広範囲の皮膚に発赤が生じ、全身の  
858 10%以上に火傷様の水疱、皮膚の剥離、びらん等が認められ、かつ、口唇の発赤・びらん、  
859 眼の充血等の症状を伴う病態で、最初に報告をした医師の名前にちなんでライエル症候群と  
860 も呼ばれる。

861 皮膚粘膜眼症候群と関連のある病態と考えられており、中毒性表皮壊死融解症の症例の多  
862 くが皮膚粘膜眼症候群の進展型とみられる。発生頻度は、人口100万人当たり年間0.4  
863 ～1.2人と報告されている。皮膚粘膜眼症候群と同様に、発症機序の詳細は不明であり、  
864 発症の予測は困難である。

865 皮膚粘膜眼症候群及び中毒性表皮壊死融解症のいずれもが発生は非常にまれであるとはい  
866 え、一旦発症すると多臓器障害の合併症等により致命的な転帰をたどることがあり、また、  
867 皮膚症状が軽快した後も眼や呼吸器等に障害が残ったりする重篤な疾患である。従って、

- 868 ○ 38℃以上の高熱
- 869 ○ 目の充血、目やに（眼分泌物）、まぶたの腫れ、目が開けづらい
- 870 ○ 口唇の違和感、口唇や陰部のただれ
- 871 ○ 排尿・排便時の痛み
- 872 ○ 喉の痛み
- 873 ○ 広範囲の皮膚の発赤

874 等の症状が持続したり、又は急激に悪化したりする場合には、原因と考えられる医薬品の使  
875 用を中止して、直ちに皮膚科の専門医を受診する必要がある。特に、両眼に現れる急性結膜  
876 炎（結膜が炎症を起こし、充血、目やに、流涙、<sup>かゆ</sup>痒み、腫れ等を生じる病態）は、皮膚や粘膜  
877 の変化とほぼ同時期又は半日～1日程度先行して生じることが知られているので、そのよう  
878 な症状が現れたときは、皮膚粘膜眼症候群又は中毒性表皮壊死融解症の前兆である可能性を  
879 疑うことが重要である。

880 皮膚粘膜眼症候群と中毒性表皮壊死融解症は、いずれも原因医薬品の使用開始後2週間以  
881 内に発症することが多いが、1ヶ月以上経ってから起こることもある。

882

883 3) 肝機能障害

884 医薬品により生じる肝機能障害<sup>xlix</sup>は、有効成分又はその代謝物の直接的肝毒性が原因で起きる  
885 中毒性のものと、有効成分に対する抗原抗体反応が原因で起きるアレルギー性のものに大別され  
886 る。

<sup>xlix</sup> いわゆる健康食品、ダイエット食品として購入された無承認無許可医薬品の使用による重篤な肝機能障害も知られてい  
る。

887 軽度の肝機能障害の場合、自覚症状がなく、健康診断等の血液検査（肝機能検査値の悪化）で  
888 初めて判明することが多い。主な症状に、全身の倦怠感、黄疸のほか、発熱、発疹、皮膚の掻痒  
889 感、吐きけ等がある。黄疸とは、ビリルビン（黄色色素）が胆汁中へ排出されず血液中に滞留す  
890 ることにより生じる、皮膚や白眼が黄色くなる病態である。また、過剰となった血液中のビリル  
891 ビンが尿中に排出されることにより、尿の色が濃くなることもある。

892 肝機能障害が疑われた時点で、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、医師の診療を受ける  
893 ことが重要である。漫然と原因と考えられる医薬品を使用し続けると、不可逆的な病変（肝不全）  
894 を生じ、死に至ることもある。

895

#### 896 4) 偽アルドステロン症

897 体内に塩分（ナトリウム）と水が貯留し、体からカリウムが失われることによって生じる病態  
898 である。副腎皮質からのアルドステロン分泌が増加していないにもかかわらずこのような状態と  
899 なることから、偽アルドステロン症<sup>1</sup>と呼ばれている。

900 主な症状に、手足の脱力、血圧上昇、筋肉痛、こむら返り、倦怠感、手足のしびれ、頭痛、むく  
901 み（浮腫）、喉の渇き、吐きけ・嘔吐等があり、病態が進行すると、筋力低下、起立不能、歩行困  
902 難、痙攣等を生じる。

903 低身長、低体重など体表面積が小さい者小柄な人や高齢者で生じやすく、原因医薬品の長期服  
904 用後に初めて発症する場合もある。また、複数の医薬品や、医薬品と食品との間の相互作用によ  
905 って起きることがある。初期症状に不審を感じつつも重症化させてしまう例が多く、偽アルドス  
906 テロン症が疑われる症状に気付いたら、直ちに原因と考えられる医薬品の使用を中止し、速やか  
907 に医師の診療を受けることが重要である。

908

#### 909 5) 病気等に対する抵抗力の低下等

910 医薬品の使用が原因で血液中の白血球（好中球）が減少し、細菌やウイルスの感染に対する抵  
911 抗力が弱くなって、突然の高熱、悪寒、喉の痛み、口内炎、倦怠感等の症状を呈することがある。  
912 進行すると重症の細菌感染を繰り返し、致命的となることもある。ステロイド性抗炎症薬や抗がん  
913 薬などが、そのような易感染性をもたらすことが知られている。初期においては、かぜ等の症状  
914 と見分けることが難しいため、原因医薬品の使用を漫然と継続して悪化させる場合がある。医薬  
915 品を一定回数又は一定期間使用した後に症状が出現したのであれば、医薬品の副作用の可能性を  
916 考慮して、その医薬品の使用を中止して、血液検査ができる医師の診断を受ける必要がある。

917 このほか、医薬品の使用が原因で血液中の血小板が減少し、鼻血、歯ぐきからの出血、手足の  
918 青あざ（紫斑）や口腔粘膜の血腫等の内出血、経血が止まりにくい（月経過多）等の症状が現れ

<sup>1</sup> 低カリウム血症を伴う高血圧症を示すことから、低カリウム血性ミオパチーによると思われる四肢の脱力と、血圧上昇に伴う頭重感などが主な症状となる。

919 ることがある。脳内出血等の重篤な病態への進行を予防するため、何らかの症状に気付いたとき  
920 は、原因と考えられる医薬品の使用を直ちに中止して、早期に医師の診療を受ける必要がある。

921

## 922 2 精神神経系に現れる副作用

### 923 1) 精神神経障害

924 医薬品の副作用によって中枢神経系が影響を受け、物事に集中できない、落ち着きがなくなる  
925 等のほか、不眠、不安、震え（振戦）、興奮、眠気、うつ等の精神神経症状を生じることがある。  
926 これらのうち、眠気は比較的軽視されがちであるが、乗物や危険な機械類の運転操作中に眠気を  
927 生じると重大な事故につながる可能性が高いので、眠気を催すことが知られている医薬品を使用  
928 した後は、そのような作業に従事しないよう十分注意することが必要である。

929 精神神経症状は、医薬品の大量服用や長期連用、乳幼児への適用外の使用等の不適正な使用が  
930 なされた場合に限らず、通常の用法・用量でも発生することがある。これらの症状が現れた場合  
931 は、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、症状によっては医師の診療を受けるなどの対応が  
932 必要である。

933

### 934 2) 無菌性髄膜炎

935 髄膜炎のうち、髄液に細菌・~~真菌~~が検出されないものをいう。大部分はウイルスが原因と考え  
936 られているが、マイコプラズマ感染症やライム病、医薬品の副作用等によって生じることもある。  
937 医薬品の副作用が原因の場合、全身性エリテマトーデス<sup>li</sup>、混合性結合組織病<sup>lii</sup>、関節リウマチ等  
938 の基礎疾患がある人で発症リスクが高い。

939 多くの場合、発症は急性で、首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐きけ・嘔吐<sup>おう</sup>、意識混  
940 濁等の症状が現れる。これらの症状が現れた場合は、原因と考えられる医薬品の使用を直ちに中  
941 止し、医師の診療を受ける必要がある。早期に原因医薬品の使用を中止すれば、速やかに回復し、  
942 予後は比較的良好であることがほとんどであるが、重篤な中枢神経系の後遺症が残った例も報告  
943 されている。また、過去に軽度の症状を経験した人の場合、再度、同じ医薬品を使用することに  
944 より再発し、急激に症状が進行する場合がある。

945

### 946 3) その他

947 心臓や血管に作用する医薬品により、頭痛やめまい、浮動感（体がふわふわと宙に浮いたよう  
948 な感じ）、不安定感（体がぐらぐらする感じ）等が生じることがある。これらの症状が現れた場合  
949 は、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、症状によっては医師の診療を受けるなどの対応が

<sup>li</sup> 膠原病の一種で、発熱や全身の倦怠感、頬に赤い発疹、手指の腫れと関節炎、口内炎、光線過敏等の症状が現れる。

<sup>lii</sup> 膠原病の重複症候群の中のひとつの病型で、寒冷刺激や精神的緊張によって起こる手指の蒼白化（レイノー現象）、手の甲から指にかけての腫れ、多発関節炎、皮膚の硬化等の症状が現れる。

950 必要である。

951 このほか、医薬品を長期連用したり、過量服用するなどの不適正な使用によって、倦怠感や虚  
952 脱感等を生じることがある。医薬品の販売等に従事する専門家は、販売する医薬品の使用状況に  
953 も留意する必要がある。

954

### 955 3 体の局所に現れる副作用

#### 956 1) 消化器系に現れる副作用

##### 957 (a) 消化性潰瘍

958 医薬品の副作用により消化性潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜組織が傷害されて、粘膜組織の  
959 その一部が粘膜筋板を超えて欠損する状態であり、医薬品の副作用により生じることが多い。  
960 る。消化性潰瘍になると、胃のもたれ、食欲低下、胸やけ、吐きけ、胃痛、空腹時にみぞおち  
961 が痛くなる、消化管出血に伴って糞便が黒くなるなどの症状が現れる。自覚症状が乏しい場  
962 合もあり、貧血症状（動悸や息切れ等）の検査時や突然の吐血・下血によって発見されるこ  
963 ともある。重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、  
964 医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

##### 965 (b) イレウス様症状（腸閉塞様症状）

966 イレウスとは腸内容物の通過が阻害された状態をいう。腸管自体は閉塞していなくても、  
967 医薬品の作用によって腸管運動が麻痺して腸内容物の通過が妨げられると、激しい腹痛やガ  
968 ス排出（おなら）の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘が現れる。腹痛などの症状の  
969 ために水分や食物の摂取が抑制され、嘔吐がない場合でも脱水状態となることがある。悪化  
970 すると、腸内容物の逆流による嘔吐が原因で脱水症状を呈したり、腸内細菌の異常増殖によ  
971 って全身状態の衰弱が急激に進行する可能性がある。

972 小児や高齢者のほか、普段から便秘傾向のある人は、発症のリスクが高い。また、下痢治  
973 癒後の便秘を放置して、症状を悪化させてしまうことがある。いずれにしても初期症状に気  
974 付いたら、原因と考えられる医薬品の使用を中止して、早期に医師の診療を受けるなどの対  
975 応が必要である。

##### 976 (c) その他

977 消化器に対する医薬品の副作用によって、吐きけ・嘔吐、食欲不振、腹部（胃部）不快感、  
978 腹部（胃部）膨満感、腹痛、口内炎、口腔内の荒れや刺激感などを生じることがある。これら  
979 の症状が現れたときには、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、症状によっては医師の  
980 診療を受けるなどの対応が必要である。

981 医薬品によっては、一過性の軽い副作用として、口渇、便秘、軟便、下痢等が現れること  
982 がある。また、浣腸剤や坐剤の使用によって現れる一過性の症状に、肛門部の熱感等の刺激、  
983 異物の注入による不快感、排便直後の立ちくらみなどがある。添付文書等には、それらの症

984 状が継続したり、症状に増強が見られた場合には、その医薬品の使用を中止して、専門家に  
985 相談するよう記載されている。

986

## 987 2) 呼吸器系に現れる副作用

### 988 (a) 間質性肺炎

989 通常の肺炎が気管支又は肺胞が細菌に感染して炎症を生じたものであるのに対し、間質性  
990 肺炎は肺の中で肺胞と毛細血管を取り囲んで支持している組織（間質）が炎症を起こしたも  
991 のである。間質性肺炎を発症すると、肺胞と毛細血管の間のガス交換効率が低下して血液に  
992 酸素を十分取り込むことができず、体内は低酸素状態となる。そのため、息切れ・息苦しさ  
993 等の呼吸困難、空咳（痰<sup>せき</sup>の出ない咳<sup>たん</sup>）、発熱等の症状を呈する。

994 一般的に、医薬品の使用開始から1～2週間程度で起きることが多い。息切れは、初期に  
995 は登坂等の運動時に感じられるが、病態が進行すると平地歩行や家事等の軽労作時にも意識  
996 されるようになる。必ずしも発熱は伴わない。

997 これらの症状は、かぜや気管支炎の症状と区別が難しいこともあり、細心の注意を払って  
998 それらとの鑑別が行われている。症状が一過性に現れ、自然と回復することもあるが、悪化  
999 すると肺線維症（肺が線維化を起こして硬くなる状態）に移行することがある。重篤な病態  
1000 への進行を防止するため、直ちに原因と考えられる医薬品の使用を中止して、速やかに医師  
1001 の診療を受ける必要がある。

### 1002 (b) 喘息<sup>ぜん</sup>

1003 原因となる医薬品（アスピリンなどの非ステロイド性抗炎症成分を含む解熱鎮痛薬など）  
1004 の使用後、短時間（1時間以内）のうちに鼻水・鼻づまりが現れ、続いて咳<sup>せき</sup>、喘鳴<sup>ぜん</sup>（息をする  
1005 とき喉がゼーゼー又はヒューヒュー鳴る）及び呼吸困難を生じる。これらの症状は時間とと  
1006 もに悪化し、顔面の紅潮や目の充血、吐きけ、腹痛、下痢等を伴うこともある。内服薬のほ  
1007 か、坐薬や外用薬でも誘発されることがある。

1008 合併症を起こさない限り、原因となった医薬品の有効成分が体内から消失すれば症状は寛  
1009 解する。軽症例は半日程度で回復するが、重症例は24時間以上持続し、窒息による意識消  
1010 失から死に至る危険もある。そのような場合には、直ちに救命救急処置が可能な医療機関を  
1011 受診しなければならない。

1012 通年性（非アレルギー性）の鼻炎や慢性副鼻腔炎<sup>くう</sup>（蓄膿症<sup>のう</sup>）、鼻茸<sup>たげ</sup>（鼻ポリープ）、嗅覚異常  
1013 等、鼻の疾患を合併している人や、成人になってから喘息<sup>ぜん</sup>を発症した人、季節に関係なく喘  
1014 息発作が起こる人等で発症しやすい。特に、これまでに医薬品（内服薬に限らない）で喘息<sup>ぜん</sup>  
1015 発作を起こしたことがある人は重症化しやすいので、同種の医薬品の使用を避ける必要があ  
1016 る。

1017

## 1018 3) 循環器系に現れる副作用

## 1019 (a) うっ血鬱血性心不全、不整脈

1020 うっ血鬱血性心不全とは、全身が必要とする量の血液を心臓から送り出すことができなく  
1021 なり、肺に血液が貯留して、種々の症状を示す疾患である。息切れ、疲れやすい、足のむく  
1022 み、急な体重の増加、咳とピンク色の痰などを認めた場合は、うっ血鬱血性心不全の可能性  
1023 を疑い、早期に医師の診療を受ける必要がある。心不全の既往がある人は、薬剤による心不  
1024 全を起こしやすい。

1025 一方、不整脈とは、心筋の自動性や興奮伝導の異常が原因で心臓の拍動リズムが乱れる病  
1026 態で、めまい、立ちくらみ、全身のだるさ（疲労感）、動悸、息切れ、胸部の不快感、脈の欠  
1027 落等の症状が現れる。これらの症状が現れたときは、直ちに原因と考えられる医薬品の使用  
1028 を中止して、速やかに医師の診療を受ける必要がある。不整脈の種類によっては失神（意識  
1029 消失）することもある。そのような場合は、生死に関わる危険な不整脈を起こしている可能  
1030 性があるので、自動体外式除細動器（AED）の使用を考慮するとともに、直ちに救急救命  
1031 処置が可能な医療機関を受診する必要がある。代謝機能の低下によって発症リスクが高まる  
1032 ことがあるので、腎機能や肝機能の低下、併用薬との相互作用等に留意するべきである。特  
1033 に、高齢者において、そのような配慮が重要である。医薬品の販売等に従事する専門家にお  
1034 いては、医薬品を使用する本人だけでなく、その家族等にもあらかじめ注意を促しておく必  
1035 要がある。

## 1036 (b) その他

1037 高血圧や心臓病等、循環器系疾患の診断を受けている人は、心臓や血管に悪影響を及ぼす  
1038 可能性が高い医薬品を使用してはならない。また、使用禁忌となっていなくても、使用しよ  
1039 うとする人の状態等に応じて使用の可否を慎重に判断すべき医薬品は、使用上の注意の「相  
1040 談すること」の項で注意喚起がなされている。

1041 これらの点に留意して医薬品を適正に使用した場合であっても、動悸（心悸亢進）や一過  
1042 性の血圧上昇、顔のほてり等を生じることがある。これらの症状が現れたときには、重篤な  
1043 病状への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、症状によっては医  
1044 師の診療を受けるなどの対応が必要である。

1045

## 1046 4) 泌尿器系に現れる副作用

## 1047 (a) 腎障害

1048 医薬品の使用が原因となって、腎障害<sup>liii</sup>を生じることがある。尿量の減少、ほとんど尿が出  
1049 ない、逆に一時的に尿が増える、むくみ（浮腫）、倦怠感、発疹、吐きけ・嘔吐、発熱、尿が

<sup>liii</sup> 外国から個人的に購入した医薬品（生薬・漢方薬）又はそれらと類似する健康食品（健康茶等）の摂取によって重篤な腎障害を生じた事例も報告されている。

1050 濁る・赤みを帯びる（血尿）等の症状が現れたときは、原因と考えられる医薬品の使用を中  
 1051 止して、速やかに医師の診療を受ける必要がある。

1052 (b) 排尿困難、尿閉

1053 副交感神経系の機能を抑制する作用がある成分<sup>liv</sup>が配合された医薬品を使用すると、膀胱<sup>ぼうこう</sup>  
 1054 の排尿筋の収縮が抑制され、尿が出にくい、尿が少ししか出ない、残尿感がある等の症状を  
 1055 生じることがある。これが進行すると、尿意があるのに尿が全く出なくなったり（尿閉）、下  
 1056 腹部が膨満して激しい痛みを感じるようになる。これらの症状は前立腺肥大等の基礎疾患が  
 1057 ない人でも現れることが知られており、男性に限らず女性においても報告されている。初期  
 1058 段階で適切な対応が図られるよう、尿勢の低下等の兆候に留意することが重要である。

1059 上記のような症状が現れたときには、原因と考えられる医薬品の使用を中止する。多くの  
 1060 場合、原因となる医薬品の使用を中止することにより症状は速やかに改善するが、医療機関  
 1061 における処置を必要とする場合もある。

1062 (c) 膀胱炎様症状<sup>ぼうこう</sup>

1063 尿の回数増加（頻尿）、排尿時の疼痛<sup>とう</sup>、残尿感等の症状が現れる。これらの症状が現れたと  
 1064 きは、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、症状によっては医師の診療を受けるなどの  
 1065 対応が必要である。

1066

1067 5) 感覚器系に現れる副作用

1068 (a) 眼圧上昇

1069 眼球内の角膜と水晶体の間を満たしている眼房水が排出されにくくなると、眼圧が上昇し  
 1070 て視覚障害を生じることがある。

1071 例えば、抗コリン作用がある成分<sup>lv</sup>が配合された医薬品によって眼圧が上昇し（急性緑内障  
 1072 発作）、眼痛や眼の充血に加え、急激な視力低下を来すことがある。特に眼房水の出口である  
 1073 隅角が狭くなっている閉塞隅角緑内障がある人では嚴重な注意が必要である。眼圧の上昇に  
 1074 伴って、頭痛や吐きけ・嘔吐<sup>おう</sup>等の症状が現れることもある。高眼圧を長時間放置すると、視  
 1075 神経が損傷して不可逆的な視覚障害（視野欠損や失明）に至るおそれがあり、速やかに眼科  
 1076 専門医の診療を受ける必要がある。

1077 (b) その他

1078 医薬品によっては、瞳の拡大（散瞳）による異常な眩しさや目のかすみ等の副作用が現れ  
 1079 ることがある。眠気と同様に、そのような症状が乗物や機械類の運転操作中に現れると重大  
 1080 な事故につながるおそれがあるので、散瞳を生じる可能性のある成分が配合された医薬品を  
 1081 使用した後は、そうした作業は避けなければならない。

<sup>liv</sup>具体的な個別の成分については、第3章を参照して問題作成のこと。

<sup>lv</sup>具体的な個別の成分については、第3章を参照して問題作成のこと。

1082

## 1083 6) 皮膚に現れる副作用

## 1084 (a) 接触皮膚炎、光線過敏症

1085 化学物質や金属等に皮膚が反応して、強い痒みを伴う発疹・発赤、腫れ、刺激感、水疱・た  
1086 だれ等の激しい炎症症状（接触皮膚炎）や、色素沈着、白斑等を生じることがある。一般に  
1087 「かぶれ」と呼ばれる日常的に経験する症状であるが、外用薬の副作用で生じることもある。

1088 接触皮膚炎は、いわゆる「肌に合わない」という状態であり、外来性の物質が皮膚に接触  
1089 することで現れる炎症である。同じ医薬品が触れても発症するか否かはその人の体質によっ  
1090 て異なる。原因となる医薬品と接触してから発症するまでの時間は様々であるが、接触皮膚  
1091 炎は医薬品が触れた皮膚の部分にのみ生じ、正常な皮膚との境界がはっきりしているのが特  
1092 徴である。アレルギー性皮膚炎の場合は、発症部位は医薬品の接触部位に限定されない。

1093 症状が現れたときは、重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使  
1094 用を中止する。通常は1週間程度で症状は治まるが、再びその医薬品に触れると再発する。

1095 かぶれ症状は、太陽光線（紫外線）に曝されて初めて起こることもある。これを光線過敏  
1096 症という。その症状は医薬品が触れた部分だけでなく、全身へ広がって重篤化する場合があ  
1097 る。貼付剤の場合は剥がした後でも発症することがある。光線過敏症が現れた場合は、原因  
1098 と考えられる医薬品の使用を中止して、皮膚に医薬品が残らないよう十分に患部を洗浄し、  
1099 遮光（白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので不可）して速やかに医師の  
1100 診療を受ける必要がある。

## 1101 (b) 薬疹

1102 医薬品によって引き起こされるアレルギー反応の一種で、発疹・発赤等の皮膚症状を呈す  
1103 る場合をいう。

1104 あらゆる医薬品で起きる可能性があり、同じ医薬品でも生じる発疹の型は人によって様々  
1105 である。赤い大小の斑点（紅斑）、小さく盛り上がった湿疹（丘疹）のほか、水疱を生じるこ  
1106 ともある。蕁麻疹は強い痒みを伴うが、それ以外の場合は痒みがないか、たとえあったとし  
1107 てもわずかなことが多い。皮膚以外に、眼の充血や口唇・口腔粘膜に異常が見られることも  
1108 ある。特に、発熱を伴って眼や口腔粘膜に異常が現れた場合は、急速に皮膚粘膜眼症候群や、  
1109 中毒性表皮壊死融解症等の重篤な病態へ進行することがあるので、厳重な注意が必要である。

1110 薬疹は医薬品の使用後1～2週間で起きることが多いが、長期使用後に現れることもある。  
1111 アレルギー体質の人や以前に薬疹を起こしたことがある人で生じやすいが、それまで薬疹を  
1112 経験したことがない人であっても、暴飲暴食や肉体疲労が誘因となって現れることがある。

1113 医薬品を使用した後に発疹・発赤等が現れた場合は、薬疹の可能性を考慮すべきである。  
1114 重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を直ちに中止する。痒  
1115 み等の症状に対して、一般の生活者が自己判断で対症療法を行うことは、原因の特定を困難



1116 にするおそれがあるため、避けるべきである。

1117 多くの場合、原因となる医薬品の使用を中止すれば、症状は次第に寛解する。ただし、以  
1118 前、薬疹を経験したことがある人が再度同種の医薬品を使用すると、ショック（アナフィラ  
1119 キシー）、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症等のより重篤なアレルギー反応を生じる  
1120 おそれがあるので、同種の医薬品の使用を避けなければならない。

1121 (c) その他

1122 外用薬の適用部位（患部）に生じる副作用として、そのほかに含有される刺激性成分によ  
1123 る痛み、焼灼感（ヒリヒリする感じ）、熱感、乾燥感等の刺激感、腫れ等がある。

1124 また外用薬には、感染を起こしている患部には使用を避けることとされているものがある  
1125 が、感染の初期段階に気付かずに使用して、みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症  
1126 状、持続的な刺激感等を起こす場合があるので注意が必要である。

1127 いずれの場合も、重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を  
1128 中止し、症状によっては医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

1129

#### 1130 7) 副作用情報等の収集と報告

1131 法第68条の10第2項の規定に基づき、登録販売者は、医薬品の副作用等を知った場合  
1132 において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、そ  
1133 の旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされており、実務上は決められた形式に従  
1134 い報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとなる。一般用医薬品にお  
1135 いても毎年多くの副作用が報告されており、市販後も医薬品の安全性を継続的に確保するた  
1136 めに、専門家により多くの情報が収集され医薬品の安全性をより高める活動が続けられてい  
1137 る。

1138

1139



## 1 第3章 主な医薬品とその作用

### 問題作成のポイント

- 一般用医薬品において用いられる主な有効成分に関して、
    - 基本的な効能効果及びその特徴\*
    - 飲み方や飲み合わせ、年齢、基礎疾患等、効き目や安全性に影響を与える要因
    - 起こり得る副作用\*
- 等につき理解し、購入者等への情報提供や相談対応に活用できること
- \* 各有効成分が作用する器官や組織の仕組み、副作用の初期症状、早期対応に関する出題については、第2章-I（人体の構造と働き）、III（症状からみた主な副作用）を参照して作成のこと。
- 各薬効群の医薬品に関する情報提供、相談対応における実践的な知識、理解を問う出題として、事例問題<sup>lvi</sup>を含めることが望ましい。

2

### 3 I 精神神経に作用する薬

#### 4 1 かぜ薬

##### 5 1) かぜの諸症状、かぜ薬の働き

6 「かぜ」（感冒）の症状は、くしゃみ、鼻汁・鼻閉（鼻づまり）、咽喉頭痛、咳、痰等の呼吸器症  
 7 状と、発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感等、様々な全身症状が組み合わさって現れる。「かぜ」は  
 8 単一の疾患ではなく、医学的にはかぜ症候群といい、主にウイルスが鼻や喉などに感染して起こ  
 9 る上気道の急性炎症の総称で、通常は数日～1週間程度で自然寛解し、予後は良好である。

10 かぜの約8割はウイルス（ライノウイルス、コロナウイルス、アデノウイルスなど）の感染が  
 11 原因であるが、それ以外に細菌の感染や、まれに冷氣や乾燥、アレルギーのような非感染性の要  
 12 因による場合もある。原因となるウイルスは、200種類を超えるといわれており、それぞれ活  
 13 動に適した環境があるため、季節や時期などによって原因となるウイルスや細菌の種類は異なる。

14 かぜとよく似た症状が現れる疾患に、喘息、アレルギー性鼻炎、リウマチ熱、関節リウマチ、  
 15 肺炎、肺結核、髄膜炎、急性肝炎、尿路感染症等多数がある。急激な発熱を伴う場合や、症状が4  
 16 日以上続くとき、又は症状が重篤なときは、かぜではない可能性が高い。発熱や頭痛を伴って悪  
 17 心・嘔吐や、下痢等の消化器症状が現れることもあり、俗に「お腹にくるかぜ」などと呼ばれる  
 18 が、冬場にこれらの症状が現れた場合はかぜではなく、ウイルスが消化器に感染したことによる  
 19 ウイルス性胃腸炎である場合が多い。

20 インフルエンザ（流行性感冒）は、かぜと同様、ウイルスの呼吸器感染によるものであるが、  
 21 感染力が強く、また、重症化しやすいため、かぜとは区別して扱われる。

22 かぜ薬とは、かぜの諸症状の緩和を目的として使用される医薬品の総称であり、総合感冒薬と

<sup>lvi</sup> 本文中ではD-, L-, L-等の光学異性体の区別は省略して記載しているが、事例問題において添付文書や製品表示の成分記載を示す場合には、実際の添付文書や製品表示の記載に倣って、D-, L-, L-等を付して問題作成のこと。

23 も呼ばれる。かぜは、生体に備わっている免疫機構によってウイルスが消滅すれば自然に治癒す  
 24 る。したがって、安静にして休養し、栄養・水分を十分に摂ることが基本である。かぜ薬は、ウイ  
 25 ルスの増殖を抑えたり、ウイルスを体内から除去するものではなく、咳<sup>せき</sup>で眠れなかつたり、発熱  
 26 で体力を消耗しそうなときなどに、それら諸症状の緩和を図る対症療法薬である。

27 なお、かぜであるからといって必ずしもかぜ薬（総合感冒薬）を選択するのが最適とは限らな  
 28 い。発熱、咳<sup>せき</sup>、鼻水など症状がはっきりしている場合には、症状を効果的に緩和させるため、解  
 29 熱鎮痛薬、鎮咳<sup>がいがい</sup>去痰<sup>たん</sup>薬、鼻炎を緩和させる薬などを選択することが望ましい。存在しない症状  
 30 に対する不要な成分が配合されていると、無意味に副作用のリスクを高めることとなる。

31

## 32 2) 主な配合成分等

### 33 (a) 発熱を鎮め、痛みを和らげる成分（解熱鎮痛成分）

34 かぜ薬に配合される主な解熱鎮痛成分としては、アスピリン、サリチルアミド、エテンザ  
 35 ミド、アセトアミノフェン、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン等がある。解熱作  
 36 用がある生薬成分としてジリュウが配合されている場合もある。また、ショウキョウ、ケイ  
 37 ヒ等が、他の解熱鎮痛成分と組み合わせて配合されている場合もある。これら成分に関する  
 38 出題については、I-2（解熱鎮痛薬）を参照して作成のこと。

39 このほか、解熱作用を期待してゴオウ、カッコン、サイコ、ボウフウ、ショウマ等、鎮痛作  
 40 用を期待してセンキュウ、コウブシ等の生薬成分が配合されている場合もある。ゴオウに関  
 41 する出題については、IV-1（強心薬）、センキュウ、コウブシに関する出題については、VI  
 42 （婦人薬）を参照して作成のこと。カッコン、サイコ、ボウフウ、ショウマに関する出題に  
 43 ついては、XIV-2（その他の生薬製剤）を参照して作成のこと。

44 なお、サリチルアミド、エテンザミドについては、15歳未満の小児で水痘<sup>とう</sup>（水疱瘡<sup>ぼうそう</sup>）又  
 45 はインフルエンザにかかっているときは使用を避ける必要がある<sup>lvii</sup>が、一般の生活者にとっ  
 46 ては、かぜとインフルエンザとの識別は必ずしも容易でない。医薬品の販売等に従事する専  
 47 門家においては、インフルエンザ流行期等、必要に応じて購入者等に対して積極的に注意を  
 48 促したり、解熱鎮痛成分がアセトアミノフェンや生薬成分のみからなる製品の選択を提案し  
 49 たりする等の対応を図ることが重要である。

### 50 (b) くしゃみや鼻汁を抑える成分（抗ヒスタミン成分、抗コリン成分）

51 かぜ薬に配合される主な抗ヒスタミン成分に、クロルフェニラミンマレイン酸塩<sup>lviii</sup>、カル  
 52 ビノキサミンマレイン酸塩、メキタジン、クレマスチンフマル酸塩、ジフェンヒドラミン塩  
 53 酸塩等がある。また、抗コリン作用によって鼻汁分泌やくしゃみを抑えることを目的として

<sup>lvii</sup> アスピリン、サザピリン、イブプロフェンについては、一般用医薬品では、小児に対してはいかなる場合も使用しないこ  
 ととなっている。I-2（解熱鎮痛薬）を参照。

<sup>lviii</sup> 「クロルフェニラミンマレイン酸塩」と「マレイン酸クロルフェニラミン」は、いずれもクロルフェニラミンとマレイン  
 酸から成る同じ物質である。以下「塩酸塩」、「リン酸塩」等その他の物質についても同様である。

54 ベラドンナ総アルカロイドやヨウ化イソプロパミドが配合されている場合もある。これら成  
55 分に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこと。

56 (c) 鼻粘膜の充血を和らげ、気管・気管支を拓げる成分（アドレナリン作動成分）

57 かぜ薬に配合される主なアドレナリン作動成分に、メチルエフェドリン塩酸塩、メチルエ  
58 フェドリンサッカリン塩、プソイドエフェドリン塩酸塩等がある。これらと同様の作用を示  
59 す生薬成分として、マオウが配合されている場合もある。いずれの成分も依存性があること  
60 に留意する必要がある。

61 メチルエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリンサッカリン塩及びマオウに関する出題に  
62 ついては、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）、プソイドエフェドリン塩酸塩に関する  
63 出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこと。

64 (d) 咳を抑える成分（鎮咳成分）

65 かぜ薬に配合される主な鎮咳成分に、コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸  
66 塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、ノスカピン、チペピジンヒベンズ酸塩、  
67 クロペラスチン塩酸塩等がある。鎮咳作用を目的として、ナンテンジツ等の生薬成分が配合  
68 されている場合もある。これら成分に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しや  
69 すくする薬）を参照して作成のこと。

70 なお、これらのうちコデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩は、依存性が  
71 ある成分であることに留意する必要がある。また、これらの咳止め成分は12才未満の小児  
72 には使用禁忌となっている。

73 (e) 痰の切れを良くする成分（去痰成分）

74 かぜ薬に配合される主な去痰成分に、グアイフェネシン、グアヤコールスルホン酸カリウ  
75 ム、ブロムヘキシン塩酸塩、エチルシステイン塩酸塩等がある。去痰作用を目的として、シ  
76 ャゼンソウ、セネガ、キキョウ、セキサン、オウヒ等の生薬成分が配合されている場合もあ  
77 る。これら成分に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照  
78 して作成のこと。

79 (f) 炎症による腫れを和らげる成分（抗炎症成分）

80 鼻粘膜や喉の炎症による腫れを和らげることを目的として、セミアルカリプロティナーゼ、  
81 ブロメライントラネキサム酸、グリチルリチン酸二カリウム等が配合されている場合がある。

82

83 ①—セミアルカリプロティナーゼ、ブロメライン

84 いずれもタンパク質分解酵素で、体内で産生される炎症物質（起炎性ポリペプチド）  
85 を分解する作用がある。また、炎症を生じた組織では、毛細血管やリンパ管にフィブリン  
86 ン類似の物質が沈着して炎症浸出物が貯留しやすくなるが、それら沈着物質を分解して  
87 浸出物の排出を促し、炎症による腫れを和らげる。

88 セミアルカリプロテイナーゼには、~~痰~~粘液の粘り気を弱めて~~痰~~痰を切れやすくする働き  
89 もある。

90 セミアルカリプロテイナーゼ、ブロメラインとも、フィブリノゲンやフィブリンを分  
91 解する作用もあり、血液凝固異常のある人では出血傾向を悪化させるおそれがあるので、  
92 治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するなどの対応が必要で  
93 ある。なお、血液凝固異常がない場合でも、まれに~~痰~~血痰や鼻血などの出血性の副作用を  
94 生じることがある。また、肝機能障害があると代謝や排泄が~~遅延~~遅延して、それらの副作用  
95 が現れやすくなるため、肝臓病の診断を受けている人の場合は、治療を行っている医師  
96 又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するなどの対応が必要である。

#### 97 ②①トラネキサム酸

98 体内での起炎物質の産生を抑制することで炎症の発生を抑え、腫れを和らげる。ただ  
99 し、凝固した血液を溶解されにくくする働きもあるため、血栓のある人（脳血栓、心筋  
100 梗塞、血栓性静脈炎等）や血栓を起こすおそれのある人に使用する場合は、治療を行っ  
101 ている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するなどの対応が必要である。

#### 102 ③②グリチルリチン酸二カリウム

103 グリチルリチン酸二カリウムの作用本体であるグリチルリチン酸は、化学構造がステ  
104 ロイド性抗炎症成分（X（皮膚に用いる薬）参照。）に類似していることから、抗炎症作  
105 用を示すと考えられている。

106 グリチルリチン酸を大量に摂取すると、偽アルドステロン症を生じるおそれがある。  
107 むくみ、心臓病、腎臓病又は高血圧のある人や高齢者では偽アルドステロン症を生じる  
108 リスクが高いため、それらの人に1日最大服用量がグリチルリチン酸として40mg以上  
109 の製品を使用する場合は、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相  
110 談する等、事前にその適否を十分考慮するとともに、偽アルドステロン症の初期症状に  
111 常に留意する等、慎重に使用する必要がある。また、どのような人が対象であっても、  
112 1日最大服用量がグリチルリチン酸として40mg以上となる製品は長期連用を避ける<sup>lix</sup>。

113 なお、医薬品ではグリチルリチン酸としての1日摂取量が200mgを超えないよう用量  
114 が定められているが、グリチルリチン酸はかぜ薬以外の医薬品にも配合されていること  
115 が少なくなく、また、グリチルリチン酸二カリウムは甘味料として一般食品や医薬部外  
116 品などにも広く用いられている<sup>lx</sup>ため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購  
117 入者等に対して、グリチルリチン酸の総摂取量が継続して過剰にならないよう注意を促  
118 す必要がある。

<sup>lix</sup> かぜ薬、解熱鎮痛薬、アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）等では、グリチルリチン酸二カリウム等のグリチルリチン酸を含む成分が配合されているか否かによらず、長期連用は避けることとされている。

<sup>lx</sup> 医薬品においても、添加物（甘味料）として配合されている場合がある（ただしその場合、薬効は期待できない）。

119 グリチルリチン酸を含む生薬成分として、カンゾウが配合されている場合もある。カ  
 120 ンゾウに関する出題、カンゾウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題につい  
 121 ては、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

122 ④③その他

123 発汗、抗炎症等の作用を目的として、カミツレ<sup>lxi</sup>（XⅠ－1（歯痛・歯槽膿漏薬）参照。）  
 124 等の生薬成分が配合されている場合がある。

125 (g) 漢方処方成分等

126 かぜ薬に配合される漢方処方成分、又は単独でかぜの症状緩和に用いられる漢方処方製剤  
 127 の主なものに、葛根湯、麻黄湯、小柴胡湯、柴胡桂枝湯、小青竜湯、桂枝湯、香蘇散、半  
 128 夏厚朴湯、麦門冬湯がある。

129 これらのうち半夏厚朴湯を除くいずれも、構成生薬としてカンゾウを含む。また、これら  
 130 のうち、麻黄湯のほか、葛根湯と小青竜湯には、構成生薬としてマオウを含む。カンゾウを  
 131 含有する医薬品に共通する留意点、マオウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題  
 132 については、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

133 かぜの症状の緩和以外にも用いられる漢方処方製剤（小柴胡湯、柴胡桂枝湯、小青竜湯、  
 134 麦門冬湯）では、比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあるが、その場合に共通する留  
 135 意点に関する出題については、XⅣ－1（漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

136 ① 葛根湯

137 体力中等度以上のものの感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩  
 138 こり、筋肉痛、手や肩の痛みに適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体  
 139 の弱い人）、胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心、胃部不快感等の副作用が現れ  
 140 やすい等、不向きとされる。

141 まれに重篤な副作用として肝機能障害、偽アルドステロン症を生じることが知られてい  
 142 る。

143 ② 麻黄湯

144 体力充実して、かぜのひきはじめて、寒気がして発熱、頭痛があり、咳が出て身体のだ  
 145 しぶしが痛く汗が出ていないものの感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまりに適すとされるが、  
 146 胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心、胃部不快感、発汗過多、全身脱力感等の  
 147 副作用が現れやすい等、不向きとされる。

148 漢方処方製剤としての麻黄湯では、マオウの含有量が多くなるため、体の虚弱な人（体  
 149 力の衰えている人、体の弱い人）は使用を避ける必要がある。

150 ③ 小柴胡湯、柴胡桂枝湯

<sup>lxi</sup> カミツレの成分であるアズレンを水溶性にしたアズレンスルホン酸ナトリウム（アズレン）が用いられる場合もある。

151 小柴胡湯<sup>しょうさいことう</sup>は、体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や  
 152 口の苦味があり、舌に白苔がつくものの食欲不振、吐きけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、か  
 153 ぜの後期の諸症状に適すとされ、また、胃腸虚弱、胃炎のような消化器症状にも用いられる  
 154 が、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）には不向きとされる。

155 柴胡桂枝湯<sup>さいこけいしとう</sup>は、体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・吐き  
 156 けなどのあるものの胃腸炎、かぜの中期から後期の症状に適すとされる。

157 小柴胡湯<sup>しょうさいことう</sup>、柴胡桂枝湯<sup>さいこけいしとう</sup>とも、まれに重篤な副作用として間質性肺炎、肝機能障害を生じ  
 158 ることが知られており、その他の副作用として、膀胱炎様症状（頻尿、排尿痛、血尿、残尿  
 159 感）が現れることもある。

160 小柴胡湯<sup>しょうさいことう</sup>については、インターフェロン製剤<sup>lxii</sup>で治療を受けている人では、間質性肺炎  
 161 の副作用が現れるおそれが高まるため、使用を避ける必要がある。また、肝臓病自体が、  
 162 間質性肺炎を起こす要因のひとつとされており、肝臓病の診断を受けた人では、治療を行  
 163 っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するなどの対応が必要である。

164 ④ 小青竜湯<sup>しょうせいりゅうとう</sup>

165 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様の痰<sup>たん</sup>を伴う咳<sup>せき</sup>や鼻水が出るものの気管支炎、気管支  
 166 喘息<sup>ぜん</sup>、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の  
 167 衰えている人、体の弱い人）、胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心、胃部不快感  
 168 等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

169 まれに重篤な副作用として、肝機能障害、間質性肺炎、偽アルドステロン症を生じるこ  
 170 とが知られている。

171 ⑤ 桂枝湯<sup>けいしとう</sup>、香蘇散<sup>こうそさん</sup>

172 桂枝湯<sup>けいしとう</sup>は、体力虚弱で、汗が出るもののかぜの初期に適すとされる。

173 香蘇散<sup>こうそさん</sup>は、体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いもののかぜの初期、血の道症  
 174 <sup>lxiii</sup>に適すとされる。

175 ⑥ 半夏厚朴湯<sup>はんげこうぼくとう</sup>、麦門冬湯<sup>ばくもんどうとう</sup>

176 これら漢方処方に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰<sup>せき</sup>を出やすくする薬）を参  
 177 照して作成のこと。

178 (h) 鎮静成分

179 解熱鎮痛成分の鎮痛作用を補助する目的で、プロモバレリル尿素、アリルイソプロピルア  
 180 セチル尿素等の鎮静成分が配合されている場合がある。

181 これらの鎮静成分には、いずれも依存性があることに留意する必要がある。（Ⅰ－3（眠気

<sup>lxii</sup> ウイルス性肝炎の治療などのため、医療機関で施用される注射薬（医療用医薬品）

<sup>lxiii</sup> 月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモン変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状。



182 を促す薬）を参照。）

183 (i) 胃酸を中和する成分（制酸成分）

184 解熱鎮痛成分（生薬成分の場合を除く。）による胃腸障害の軽減を目的として、ケイ酸アル  
185 ミニウム、酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムゲル等の制酸成分が配合されていること  
186 がある。なお、この場合、胃腸薬のように、胃腸症状に対する薬効を標榜<sup>ほう</sup>することは認めら  
187 れていない。これら成分に関する出題については、Ⅲ－1（胃の薬）を参照して作成のこと。

188 (j) カフェイン類

189 解熱鎮痛成分（生薬成分の場合を除く。）の配合に伴い、その鎮痛作用を補助する目的で、  
190 カフェイン、無水カフェイン、安息香酸ナトリウムカフェイン等が配合されている場合があ  
191 る。これら成分に関する出題については、Ⅰ－2（解熱鎮痛薬）を参照して問題作成のこと。  
192 なお、カフェイン類が配合されているからといって、必ずしも抗ヒスタミン成分や鎮静成分  
193 の作用による眠気が解消されるわけではない。

194 (k) その他：ビタミン成分等

195 かぜの時に消耗しやすいビタミン又はビタミン様物質を補給することを目的として、粘膜  
196 の健康維持・回復に重要なビタミンC（アスコルビン酸、アスコルビン酸カルシウム等）、ビ  
197 タミンB<sub>2</sub>（リボフラビン、リン酸リボフラビンナトリウム等）、ヘスペリジンや、疲労回  
198 復の作用のあるビタミンB<sub>12</sub>（チアミン硝化物、フルスルチアミン塩酸塩、ビスイブチアミ  
199 ン、チアミンジスルフィド、ベンフォチアミン、ビスベンチアミン等）、アミノエチルスルホ  
200 ン酸（タウリン）等が配合されている場合がある。また、強壮作用等を期待してニンジンや  
201 チクセツニンジン等の生薬成分等が配合されている場合もある。これら成分に関する出題に  
202 ついては、XⅢ（滋養強壮保健薬）を参照して作成のこと。

203

204 3) 主な副作用、相互作用、受診勧奨

205 【主な副作用】 かぜ薬の重篤な副作用は、配合されている解熱鎮痛成分（生薬成分を除く。）に  
206 よるものが多い。まれに、ショック（アナフィラキシー）、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死  
207 融解症、喘息、間質性肺炎が起きることがあるが、これらはかぜ薬（漢方処方成分、生薬成分  
208 のみから成る場合を除く。）の使用上の注意では、配合成分によらず共通に記載されている。こ  
209 のほか配合成分によっては、まれに重篤な副作用として、肝機能障害<sup>lxiv</sup>、偽アルドステロン症  
210 <sup>lxv</sup>、腎障害、無菌性髄膜炎<sup>lxvi</sup>を生じることがある。

211 また、その他の副作用として、皮膚症状（発疹・発赤、<sup>しん</sup>搔痒感）、<sup>そつよう</sup>消化器症状（<sup>おう</sup>悪心・嘔吐、

<sup>lxiv</sup> 肝機能障害を生じることがある主な成分：アスピリン、アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、イブプロフェン、葛根湯、小柴胡湯、柴胡桂枝湯、小青竜湯、麦門冬湯

<sup>lxv</sup> 偽アルドステロン症を生じることがある主な成分：グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレチン酸、カンゾウ

<sup>lxvi</sup> 腎障害、無菌性髄膜炎を生じることがある主な成分：イブプロフェン

212 食欲不振)、めまい等のほか、配合成分によっては、眠気や口渇<sup>lxvii</sup>、便秘<sup>lxviii</sup>、排尿困難<sup>lxix</sup>等が  
213 現れることがある。

214

215 【相互作用】 かぜ薬には、通常、複数の有効成分が配合されているため、他のかぜ薬や解熱鎮  
216 痛薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用薬、アレルギー用薬、鎮静薬、睡眠改善薬などが併用されると、同じ  
217 成分又は同種の作用を持つ成分が重複して、効き目が強くなりすぎたり、副作用が起こりやす  
218 くなるおそれがある。

219 かぜに対する民間療法として、しばしば酒類（アルコール）が用いられるが、アルコールは  
220 医薬品の成分の吸収や代謝に影響を与えるため、肝機能障害等の副作用が起こりやすくなる。  
221 したがって、かぜ薬の服用期間中は、飲酒を控える必要がある。

222 カフェイン類が配合されている場合の留意点については、I-4（眠気を防ぐ薬）を参照し  
223 て作成のこと。

224

225 【受診勧奨】 かぜ薬の使用は、発熱や頭痛・関節痛、くしゃみ、鼻汁・鼻閉（鼻づまり）、咽喉  
226 頭痛、咳、痰等の症状を緩和する対症療法である。一定期間又は一定回数使用して症状の改善  
227 がみられない場合は、かぜとよく似た症状を呈する別の疾患や細菌感染の合併等が疑われるた  
228 め、一般用医薬品で対処することは適当でない可能性がある。このような場合には、医薬品の  
229 販売等に従事する専門家は、購入者等に対して、漫然とかぜ薬の使用を継続せずに、医療機関  
230 を受診するよう促すべきである。特に、かぜ薬の使用後に症状が悪化した場合には、間質性肺  
231 炎やアスピリン喘息等、かぜ薬自体の副作用による症状が現れた<sup>である</sup>可能性もある。

232 なお、高熱、黄色や緑色に濁った<sup>のう</sup>膿性の鼻汁・痰、喉（扁桃）の激しい痛みや腫れ、呼吸困難  
233 を伴う激しい咳といった症状がみられる場合は、一般用医薬品によって自己治療を図るのでは  
234 なく、初めから医療機関での診療を受けることが望ましい。また、慢性の呼吸器疾患、心臓病、  
235 糖尿病等の基礎疾患がある人の場合も、基礎疾患の悪化や合併症の発症を避けるため、初めか  
236 ら医療機関を受診することが望ましい。

237 小児のかぜでは、急性中耳炎<sup>lxx</sup>を併発しやすい。また、症状が長引くような場合は、医療機関  
238 で診療を受けるなどの対応が必要である。また、2歳未満の乳幼児には、医師の診断を受けさ  
239 せることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させることとされている。

240

<sup>lxvii</sup> 眠気や口渇が現れることがある主な成分：抗ヒスタミン成分（眠気については、鎮静成分でも現れることがある。）

<sup>lxviii</sup> 便秘が現れることがある主な成分：コデインリン酸塩<sup>水和物</sup>、ジヒドロコデインリン酸塩

<sup>lxix</sup> 排尿困難が現れることがある主な成分：抗コリン成分（ペラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド）、抗ヒスタミン成分、マオウ

<sup>lxx</sup> ウイルス（呼吸器に感染してかぜを引き起こすものと同じ）や細菌が、耳管に入り込んで増殖して起こる病気

## 241 2 解熱鎮痛薬

## 242 1) 痛みや発熱が起こる仕組み、解熱鎮痛薬の働き

243 痛みは病気や外傷などに対する警告信号として、また、発熱は細菌やウイルス等の感染等に対  
244 する生体防御機能の一つとして引き起こされる症状である。ただし、月経痛（生理痛）などのよ  
245 うに、必ずしも病気が原因とは言えない痛みもある。

246 プロスタグランジンはホルモンに似た働きをする物質で、病気や外傷があるときに活発に産生  
247 されるようになり、体の各部位で発生した痛みが脳へ伝わる際に、そのシグナルを増幅すること  
248 で痛みの感覚を強めている。また、脳の下部にある体温を調節する部位（温熱中枢）に作用して、  
249 体温を通常よりも高く維持するように調節する<sup>lxxi</sup>ほか、炎症の発生にも関与する。頭痛や関節痛  
250 も、プロスタグランジンによって増強される。

251 解熱鎮痛薬とは、発熱や痛みの原因となっている病気や外傷を根本的に治すものではなく、病  
252 気や外傷が原因で生じている発熱や痛みを緩和するために使用される医薬品（内服薬）の総称で  
253 ある<sup>lxxii</sup>。痛みのシグナルの増幅を防いで痛みを鎮める（鎮痛）、異常となった体温調節メカニズム  
254 を正常状態に戻して熱を下げる（解熱）、又は炎症が発生している部位に作用して腫れなどの症状  
255 を軽減する（抗炎症）ことを目的として使用される。多くの解熱鎮痛薬には、体内におけるプロ  
256 スタグランジンの産生を抑える成分が配合されている。

257 月経痛（生理痛）は、月経そのものが起こる過程にプロスタグランジンが関わっていることか  
258 ら、解熱鎮痛薬の効能・効果に含まれているが、腹痛を含む痙攣<sup>けいれん</sup>性の内臓痛は発生の仕組みが異  
259 なるため、一部の漢方処方製剤を除き、解熱鎮痛薬の効果は期待できない。

260 解熱鎮痛成分によって、解熱、鎮痛、抗炎症のいずれの作用が中心的となるかなどの性質が異  
261 なる。なお、専ら外用剤として局所的な鎮痛や抗炎症を目的として使用される成分もあり、それ  
262 らに関する出題については、X（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。

263

## 264 2) 代表的な配合成分等、主な副作用

## 265 (a) 解熱鎮痛成分

266 解熱鎮痛成分は、化学的に合成された成分と生薬成分とに大別される。

267 【化学的に合成された成分】 悪寒・発熱時の解熱のほか、頭痛、歯痛、抜歯後の疼痛<sup>とう</sup>、咽喉痛  
268 （喉の痛み）、耳痛、関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、骨折痛、捻挫痛<sup>ねんざ</sup>、  
269 月経痛（生理痛）、外傷痛の鎮痛に用いられる。

270 解熱に関しては、中枢神経系におけるプロスタグランジンの産生抑制作用のほか、腎臓に  
271 おける水分の再吸収を促して循環血流量を増し、発汗を促進する作用も寄与している。体の

<sup>lxxi</sup> 高体温は、ウイルスの増殖を抑えたり、免疫機構の働きを高める体内環境となる。

<sup>lxxii</sup> 局所の痛みや腫れを鎮めることを目的とする外用薬（外用消炎鎮痛薬）については、X（皮膚に用いる薬）を参照のこと。

272 各部（末梢）での痛みや炎症反応に対しては、局所のプロスタグランジン産生を抑制する作用により、それらを鎮める効果を発揮する（アセトアミノフェンの場合を除く。）。

274 循環血流量の増加は心臓の負担を増大させるため、心臓に障害がある場合は、その症状を悪化させるおそれがある。また、末梢におけるプロスタグランジンの産生抑制は、腎血流量を減少させるため、腎機能に障害があると、その症状を悪化させる可能性がある。肝臓においては、解熱鎮痛成分が代謝されて生じる物質がアレルギー性となってアレルギー性の肝機能障害を誘発することがある。また、肝臓ではプロスタグランジンの産生抑制が逆に炎症を起こしやすくする可能性もあり、肝機能障害がある場合は、その症状を悪化させるおそれがある。また、成分によっては、まれに重篤な副作用として肝機能障害や腎障害を生じることがある。

282 プロスタグランジンには胃酸分泌調節作用や胃腸粘膜保護作用もあるが、これらの作用が解熱鎮痛成分によって妨げられると、胃酸分泌が増加するとともに胃壁の血流量が低下して、胃粘膜障害を起こしやすくなる。そうした胃への悪影響を軽減するため、なるべく空腹時を避けて服用することとなっている場合が多い。胃・十二指腸潰瘍があると、その症状を悪化させるおそれがある。

287 以上のことより、心臓病、腎臓病、肝臓病又は胃・十二指腸潰瘍のある人の場合は、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談することが望ましい。なお、これらの基礎疾患がない場合でも、長期間にわたって解熱鎮痛薬を使用すると、自覚症状がないまま徐々に臓器の障害が進行するおそれがあるため、長期連用は避けるべきである。また、アルコールが解熱鎮痛成分の吸収や代謝に影響を与え、肝機能障害等の副作用を起こしやすくするおそれがあるため、解熱鎮痛薬の服用期間中は、飲酒は避けることとされている。

294 化学的に合成された解熱鎮痛成分に共通して、まれに重篤な副作用としてショック（アナフィラキシー）、皮膚粘膜眼症候群や中毒性表皮壊死融解症、喘息を生じることがある。喘息については「アスピリン喘息」としてよく知られているが、これはアスピリン特有の副作用ではなく、他の解熱鎮痛成分でも生じる可能性がある。

298 このほか、胎児への影響<sup>lxxiii</sup>を考慮して、妊婦又は妊娠していると思われる女性に関して、使用上の注意「相談すること」の項で注意喚起がなされている。

#### 300 ① サリチル酸系解熱鎮痛成分

301 アスピリン（別名アセチルサリチル酸）、サザピリン、サリチル酸ナトリウム、エテンザ

<sup>lxxiii</sup> アスピリン、サザピリン、サリチルアミド、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン等を、妊娠末期のラットに投与した実験において、胎児に弱い動脈管の収縮が見られたとの報告がある。

なお、アスピリンについては、動物実験（ラット）で催奇形性が現れたとの報告がある。また、イソプロピルアンチピリンについては、化学構造が類似した他のピリン系解熱鎮痛成分において、動物実験（マウス）で催奇形性が報告されている。

302 ミド、サリチルアミド等を総称してサリチル酸系解熱鎮痛成分という。アスピリンは、他  
 303 の解熱鎮痛成分に比較して胃腸障害を起こしやすく、アスピリンアルミニウム等として胃  
 304 粘膜への悪影響の軽減を図っている製品もある。

305 サリチル酸系解熱鎮痛成分において特に留意されるべき点は、ライ症候群<sup>lxxiv</sup>の発生が示  
 306 唆されていることである。アスピリン（アスピリンアルミニウムを含む。）、及びサザピリ  
 307 ン及びサリチル酸ナトリウムは、15歳未満の小児に対しては、いかなる場合も一般用医  
 308 薬品として使用してはならない。また、エテンザミド及びサリチルアミドについては、水  
 309 痘（水疱瘡）又はインフルエンザにかかっている15歳未満の小児に対しては使用を避け  
 310 る必要がある。

311 アスピリン（アスピリンアルミニウムを含む。）には血液を凝固しにくくさせる作用もあ  
 312 るため、胎児や出産時の母体への影響<sup>lxxv</sup>を考慮して、出産予定日12週間以内の使用を避  
 313 ける。なお、医療用医薬品のアスピリンは、血栓ができやすい人に対する血栓予防薬の成  
 314 分としても用いられている。既にアスピリン製剤が処方されている場合は、一般用医薬品  
 315 の解熱鎮痛薬を自己判断で使用することは避け、処方した医師又は調剤を行った薬剤師に  
 316 相談するなどの対応が必要である。

317 アスピリン（アスピリンアルミニウムを含む。）は、まれに重篤な副作用として肝機能障  
 318 害を生じることがある。

319 エテンザミドは、痛みの発生を抑える働きが作用の中心となっている他の解熱鎮痛成分  
 320 に比べ、痛みが神経を伝わっていくのを抑える働きが強いため、作用の仕組みの違いによ  
 321 る相乗効果を期待して、他の解熱鎮痛成分と組み合わせて配合されることが多い。例えば、  
 322 アセトアミノフェン、カフェイン、エテンザミドの組合せは、それぞれの頭文字から「A  
 323 CE処方」と呼ばれる。

## 324 ② アセトアミノフェン

325 主として中枢作用によって解熱・鎮痛をもたらすため、末梢における抗炎症作用は期待  
 326 できない。その分、他の解熱鎮痛成分のような胃腸障害は少なく、空腹時に服用できる製  
 327 品もあるが、食後の服用が推奨されている。

328 まれに重篤な副作用として皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹  
 329 性膿疱症、間質性肺炎、腎障害、肝機能障害を生じることがあり、特に定められた用量を  
 330 超えて使用した場合や、日頃から酒類（アルコール）をよく摂取する人で起こりやすい。

331 内服薬のほか、専ら小児の解熱に用いる製品としてアセトアミノフェンが配合された坐  
 332 薬もある。一般の生活者の中には、坐薬と内服薬とは影響し合わないとの誤った認識を持

<sup>lxxiv</sup> 主として小児が水痘（水疱瘡）やインフルエンザ等のウイルス性疾患に罹っているときに、激しい嘔吐や意識障害、痙攣等の急性脳症の症状を呈する症候群で、その発生はまれであるが死亡率が高く、生存の場合も脳に重い障害を残す等、予後は不良である。

<sup>lxxv</sup> 妊娠期間の延長、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加

333 っている人がいるので、解熱鎮痛薬やかぜ薬を併用することがないように注意を喚起する必  
334 要がある。また、誤って坐薬を服用することがないように注意する必要もある。

335 ③ イブプロフェン

336 アスピリン等に比べて胃腸への悪影響が少なく、抗炎症作用も示すことから、頭痛、咽  
337 頭痛、月経痛（生理痛）、腰痛等に使用されることが多い。一般用医薬品においては、15  
338 歳未満の小児に対しては、いかなる場合も使用してはならない。

339 イブプロフェンはプロスタグランジンの産生を抑制することで消化管粘膜の防御機能を  
340 低下させるため、消化管に広範に炎症を生じる疾患である胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸  
341 炎<sup>lxxvi</sup>又はクローン氏病<sup>lxxvii</sup>の既往歴がある人では、それら疾患の再発を招くおそれがある。  
342 出産予定日12週以内の妊婦については、服用しないこととされている。

343 まれに重篤な副作用として、肝機能障害、腎障害、無菌性髄膜炎を生じることがある。  
344 イブプロフェンは、全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病のある人において無菌  
345 性髄膜炎を生じやすいため、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処  
346 方薬の調剤を行った薬剤師に相談するなどの対応が必要である。

347 ④ イソプロピルアンチピリン

348 解熱及び鎮痛の作用は比較的強いが、抗炎症作用は弱いため、他の解熱鎮痛成分と組み  
349 合わせて配合される。

350 ピリン系<sup>lxxviii</sup>と呼ばれる解熱鎮痛成分である。1960年代半ばまでは、イソプロピル  
351 アンチピリン以外のピリン系解熱鎮痛成分も、一般用医薬品のかぜ薬や解熱鎮痛薬に配合  
352 されていたが、ショック等の重篤な副作用が頻発したため用いられなくなり（第5章Ⅳ（一  
353 般用医薬品に関する主な安全対策）参照。）、現在では、イソプロピルアンチピリンが一般  
354 用医薬品で唯一のピリン系解熱鎮痛成分となっている。

355 なお、医療用医薬品においては、現在でもイソプロピルアンチピリン以外のピリン系解  
356 熱鎮痛成分を有効成分とするものがある。ピリン系解熱鎮痛成分によって薬疹（ピリン疹<sup>しん</sup>  
357 と呼ばれる。）等のアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しない<sup>lxxix</sup>。

359 【生薬成分】 生薬成分が解熱又は鎮痛をもたらす仕組みは、化学的に合成された成分（プロ  
360 スタグランジンの産生を抑える作用）と異なるものと考えられており、アスピリン等の解熱  
361 鎮痛成分の使用を避けなければならない場合にも使用できる。

<sup>lxxvi</sup> 免疫抗体の異常などが原因とされる、大腸に潰瘍や糜爛を生じる病気。

<sup>lxxvii</sup> 口腔から肛門までの消化管全域に亘って不連続に炎症や潰瘍を生じる疾患。クローン氏病ともいう。

<sup>lxxviii</sup> これに対して他の解熱鎮痛成分を「非ピリン系」と呼ぶことがある。アスピリンやサザピリンは、成分名が「～ピリン」であっても非ピリン系の解熱鎮痛成分であるが、一般の生活者では誤ってピリン系として認識していることも多い。

<sup>lxxix</sup> ただし、イソプロピルアンチピリン以外の解熱鎮痛成分でも薬疹等のアレルギー症状が生じることはある。一般の生活者では、「非ピリン系解熱鎮痛成分では薬疹のおそれがない」等と誤って認識している場合がある。

362 ① ジリュウ

363 フトミミズ科の *Pheretima aspergillum* Perrier 又はその近縁動物の内部を除いたもの  
364 を基原とする生薬で、古くから「熱さまし」として用いられてきた。ジリュウのエキスを  
365 製剤化した製品は、「感冒時の解熱」が効能・効果となっている。

366 ② シャクヤク

367 ボタン科のシャクヤクの根を基原とする生薬で、鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>作用、鎮静作用を示し、内臓  
368 の痛みにも用いられる。同様な作用を期待して、ボタンピ<sup>°</sup>（ボタン科のボタンの根皮を基  
369 原とする生薬）が配合されている場合もある。

370 ③ ボウイ

371 ツツラフジ科のオオツツラフジの蔓<sup>つる</sup>性の茎及び根茎を、通例、横切したものを基原とす  
372 る生薬で、鎮痛、尿量増加（利尿）等の作用を期待して用いられる。

373 日本薬局方収載のボウイは、煎薬として筋肉痛、神経痛、関節痛に用いられる。

374 ④ その他

375 抗炎症作用を示す生薬として、カンゾウが配合されている場合がある。カンゾウに関す  
376 る出題、カンゾウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題については、Ⅱ－1（咳  
377 止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

378 発汗を促して解熱を助ける作用を期待してショウキョウ、ケイヒ等が、関節痛や肩こり  
379 痛等の改善を促す作用を期待してコンドロイチン硫酸ナトリウムが、他の解熱鎮痛成分と  
380 組み合わせて配合されている場合がある。ショウキョウ、ケイヒについてはⅢ－1（胃の  
381 薬）、コンドロイチン硫酸ナトリウムについてはⅩⅢ（滋養強壮保健薬）を参照のこと。

382 (b) 鎮静成分

383 解熱鎮痛成分の鎮痛作用を助ける目的で、ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセ  
384 チル尿素のような鎮静成分が配合されている場合がある。いずれも依存性がある成分である  
385 ことに留意する必要がある。鎮静作用がある生薬成分として、カノコソウ等が配合されてい  
386 る場合もある。

387 これら成分に関する出題については、Ⅰ－3（眠気を促す薬）を参照して作成のこと。

388 (c) 胃酸を中和する成分（制酸成分）

389 解熱鎮痛成分（生薬成分を除く。）による胃腸障害の軽減を目的として、ケイ酸アルミニウ  
390 ム、酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムゲル、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム等の  
391 制酸成分が配合されている場合がある。なお、この場合、胃腸薬のように、胃腸症状に対す  
392 る薬効を標榜<sup>ほう</sup>することは認められていない。これら成分に関する出題については、Ⅲ－1（胃  
393 の薬）を参照して作成のこと。

394 (d) 骨格筋の緊張を鎮める成分

395 メトカルバモールには骨格筋の緊張をもたらす脊髄反射を抑制する作用があり、いわゆる

396 「筋肉のこり」を和らげることを目的として、骨格筋の異常緊張、痙攣・疼痛を伴う腰痛、  
 397 肩こり、筋肉痛、関節痛、神経痛、打撲、捻挫等に用いられる。

398 鎮静作用があるため、副作用として眠気、めまい、ふらつきが現れることがある。したが  
 399 って、服用後は乗物又は機械類の運転操作はしない。また、鎮静成分が配合された他の医薬  
 400 品の併用は避ける。

401 このほか、消化器系の副作用として悪心（吐きけ）・嘔吐、食欲不振、胃部不快感が現れる  
 402 ことがある。

403 (e) カフェイン類

404 解熱鎮痛成分の鎮痛作用を増強する効果を期待して、また、中枢神経系を刺激して頭をす  
 405 っきりさせたり、疲労感・倦怠感を和らげることを目的として、カフェイン、無水カフ  
 406 エイン、安息香酸ナトリウムカフェイン等が配合されている場合がある。なお、カフェイン  
 407 類が配合されていても、必ずしも鎮静成分の作用による眠気が解消されるわけではない。

408 カフェインの働き、主な副作用等に関する出題については、I-4（眠気を防ぐ薬）を参  
 409 照して作成のこと。

410 (f) ビタミン成分

411 発熱等によって消耗されやすいビタミンの補給を目的として、ビタミンB1（チアミン塩  
 412 化物塩酸塩、チアミン硝化物、ジベンゾイルチアミン、チアミンジスルフィド、ビスベンチ  
 413 アミン、ジセチアミン塩酸塩等）、ビタミンB2（リボフラビン、リボフラビンリン酸エステ  
 414 ルナトリウム等）、ビタミンC（アスコルビン酸、アスコルビン酸カルシウム等）等が配合さ  
 415 れている場合がある。これらの成分に関する出題については、XⅢ（滋養強壮保健薬）を参  
 416 照して作成のこと。

417

418 ● 漢方処方製剤

419 鎮痛の目的で用いられる漢方処方製剤としては、芍薬甘草湯、桂枝加朮附湯、桂枝加苓朮附  
 420 湯、薏苡仁湯、麻杏薏甘湯、疎経活血湯、当帰四逆加呉茱萸生姜湯、呉茱萸湯、釣藤散等が  
 421 ある。

422 これらのうち、呉茱萸湯以外はいずれも構成生薬としてカンゾウを含んでいる。カンゾウ含有  
 423 医薬品に共通する留意点に関する出題については、Ⅱ-1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を  
 424 参照して作成のこと。また、これらのうち芍薬甘草湯以外は、比較的長期間（1ヶ月位）服用さ  
 425 れることがあり、その場合に共通する留意点に関する出題については、XⅣ-1（漢方処方製剤）  
 426 を参照して作成のこと。

427 (a) 芍薬甘草湯

428 体力に関わらず使用でき、筋肉の急激な痙攣を伴う痛みのあるもののこむらえり、筋肉  
 429 の痙攣、腹痛、腰痛に適すとされる。ただし、症状があるときのみ服用にとどめ、連用は



430 避ける。

431 まれに重篤な副作用として、肝機能障害のほか、間質性肺炎、うつ血鬱血性心不全や心室  
432 頻拍を生じることが知られており、心臓病の診断を受けた人では使用を避ける必要がある。

433 (b) 桂枝加朮附湯、桂枝加苓朮附湯

434 いずれも体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの桂枝加  
435 朮附湯は体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの関節痛、  
436 神経痛に、桂枝加苓朮附湯は体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動  
437 悸、めまい、筋肉のぴくつきがあるものの関節痛、神経痛に適すとされるが、どちらも動悸、  
438 のぼせ、ほてり等の副作用が現れやすい等の理由で、のぼせが強く赤ら顔で体力が充実して  
439 いる人には不向きとされる。

440 (c) 薏苡仁湯、麻杏薏甘湯

441 薏苡仁湯は体力中等度で、なものの関節や筋肉のはれや痛みがあるものの関節痛、筋肉痛、  
442 神経痛に適すとされ、麻杏薏甘湯は体力中等度なもので、関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、  
443 手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）に適すとされるが、どちらも悪心・嘔吐、胃部不快感等の  
444 副作用が現れやすい等の理由で、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸の  
445 弱い人、発汗傾向の著しい人には不向きとされる。

446 どちらの処方も構成生薬としてマオウを含む。マオウに関する出題、マオウを含有する医  
447 薬品に共通する留意点に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）  
448 を参照して作成のこと。

449 (d) 疎経活血湯

450 体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛に  
451 適すとされるが、消化器系の副作用（食欲不振、胃部不快感等）が現れやすい等の理由で、  
452 胃腸が弱く下痢しやすい人には不向きとされる。

453 (e) 当帰四逆加呉茱萸生姜湯

454 体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりや  
455 すいものの冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛腰痛、下腹部痛、頭痛、しもやけ、下  
456 痢、月経痛に適すとされるが、胃腸の弱い人には不向きとされる。

457 (f) 釣藤散

458 体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの慢性頭痛、神経症、  
459 高血圧の傾向のあるものに適すとされるが、消化器系の副作用（食欲不振、胃部不快感等）  
460 が現れやすい等の理由で、胃腸虚弱で冷え症の人には不向きとされる。

461 (g) 呉茱萸湯

462 体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの頭痛、頭痛に伴う  
463 吐きけ・嘔吐、しゃっくりに適すとされる。

464

## 465 3) 相互作用、受診勧奨

466 【相互作用】 一般用医薬品の解熱鎮痛薬は、複数の有効成分が配合されている製品が多く、他  
467 の解熱鎮痛薬やかぜ薬、鎮静薬、外用消炎鎮痛薬（一般用医薬品に限らない。）等が併用される  
468 と、同じ成分又は同種の作用を持つ成分が重複して、効き目が強く現れすぎたり、副作用が起  
469 こりやすくなったりするおそれがある。一般の生活者においては、「痛み止め」と「熱さまし」  
470 は影響し合わないと誤って認識している場合もあり、医薬品の販売等に従事する専門家は、適  
471 宜注意を促すことが重要である。

472 解熱鎮痛成分と酒類（アルコール）との相互作用については、アルコールの作用による胃粘  
473 膜の荒れがアスピリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン等  
474 による胃腸障害を増強するという事実が報告されている。また、アルコールにより、アセトア  
475 ミノフェンによる肝機能障害も起こりやすくなる。

476 ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素のような鎮静成分が配合されている  
477 処方における留意点についてはI-3（眠気を促す薬）、カフェイン類が配合されている処方  
478 における留意点についてはI-4（眠気を防ぐ薬）を参照して問題作成のこと。

479

480 【受診勧奨等】 解熱鎮痛薬の使用は、発熱や痛みを一時的に抑える対症療法であって、疾病の  
481 原因を根本的に解消するものではない。以下のような場合は、一般用医薬品によって自己治療  
482 を図るのではなく、医療機関を受診するなどの対応が必要である。なお、筋肉痛、肩こり痛、  
483 打撲痛、骨折痛、捻挫痛、外傷痛等に関する受診勧奨についてはX（皮膚に用いる薬）、歯痛に  
484 関する受診勧奨についてはX I-1（歯痛・歯槽膿漏用薬）も参照して問題作成のこと。

485 発熱している患者で、激しい腹痛や下痢などの消化器症状、息苦しいなどの呼吸器症状、排  
486 尿時の不快感等の泌尿器症状、又は発疹や痒みなどの皮膚症状等を伴っている場合や、発熱が  
487 1週間以上続いているような場合は、単なるかぜが原因ではなく、かぜ以外の感染症やその他  
488 の重大な病気が原因となっている可能性がある。自己判断で安易に熱を下げることは、かえっ  
489 て発熱の原因である病気の診断を困難にさせ、また、病態を悪化させるおそれがある。なお、  
490 通常、体温が38℃以下であればひきつけや著しい体力消耗等のおそれはなく、平熱になるま  
491 で解熱鎮痛薬を用いる必要はない。ただ、発汗に伴って体から水分や電解質が失われるので、  
492 吸収の良いスポーツドリンク等でそれらを補給することが重要である。

493 関節痛については、歩くときや歩いたあとに膝関節が痛む場合、関節が腫れて強い熱感があ  
494 るという場合、又は、起床したときに関節にこわばりがあるような場合は、関節リウマチ、痛  
495 風、変形性関節炎等の可能性が考えられる。

496 月経痛（生理痛）については、年月の経過に伴って次第に増悪していくような場合には、子

497 宮内膜症<sup>lxxx</sup>等の可能性が考えられる。

498 頭痛については、頭痛が頻繁に出現して24時間以上続く場合や、一般用医薬品を使用して  
499 も痛みを抑えられない場合は、自己治療で対処できる範囲を超えていると判断される。特に、  
500 頭痛の頻度と程度が次第に増してきて耐え難くなった場合や、これまで経験したことがないよ  
501 うな突然の激しい頭痛、手足のしびれや意識障害などの精神神経系の異常を伴う頭痛が現れた  
502 ときには、くも膜下出血等の生命に関わる重大な病気である可能性が疑われる。

503 なお、頭痛の発症とその程度には、頭痛が起こるのでないかという不安感も含め、心理的な  
504 影響が大きい。解熱鎮痛薬は、頭痛の症状が軽いうちに服用すると効果的であるが、症状が現  
505 れないうちに予防的に使用することは適切でない。解熱鎮痛薬の連用により頭痛が常態化する  
506 ことがあるので注意を要する。また、解熱鎮痛薬を使用したときは症状が治まるものの、しば  
507 らくすると頭痛が再発し、解熱鎮痛薬が常時手放せないような場合には、薬物依存が形成され  
508 ている可能性も考えられる。医薬品の販売に従事する専門家は、家族や周囲の人の理解や協力  
509 も含め、医薬品の適正使用、安全使用の観点からの配慮することが重要である。

510

### 511 3 眠気を促す薬

512 はっきりした原因がなくても、日常生活における人間関係のストレスや生活環境の変化等の  
513 様々な要因によって自律神経系のバランスが崩れ、寝つきが悪い、眠りが浅い、いらいら感、緊  
514 張感、精神興奮、精神不安といった精神神経症状を生じることがある。また、それらの症状のた  
515 めに十分な休息が取れず、疲労倦怠感、寝不足感、頭重等の身体症状を伴う場合もある。

516 催眠鎮静薬とは、そのような症状が生じたときに睡眠を促したり、精神の<sup>たか</sup>昂ぶりを鎮めたりす  
517 ることを目的に使用される医薬品である。

#### 518 1) 代表的な配合成分等、主な副作用

##### 519 (a) 抗ヒスタミン成分

520 生体内情報伝達物質であるヒスタミンは、脳の下部にある睡眠・覚醒<sup>せい</sup>に関与する部位で神  
521 経細胞の刺激を介して、覚醒<sup>せい</sup>の維持や調節を行う働きを担っている。脳内におけるヒスタミ  
522 ン刺激が低下すると、眠気を促す。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、抗ヒスタミン成分の中で  
523 も特にそのような中枢作用が強い。

524 抗ヒスタミン成分を主薬とする催眠鎮静薬は、睡眠改善薬<sup>lxxxi</sup>として一時的な睡眠障害（寝  
525 つきが悪い、眠りが浅い）の緩和に用いられるものであり、慢性的に不眠症状がある人や、  
526 医療機関において不眠症の診断を受けている人を対象とするものではない。

527 妊娠中にしばしば生じる睡眠障害は、ホルモンのバランスや体型の変化等が原因であり、

<sup>lxxx</sup> 子宮内膜やそれに類似した組織が、子宮内膜層以外の骨盤内の組織・臓器で増殖する病気

<sup>lxxxi</sup> 医療機関において不眠症の治療のため処方される睡眠薬（医療用医薬品）と区別するため、一般用医薬品では、睡眠改善薬又は睡眠補助薬と呼ばれる。

528 睡眠改善薬の適用対象ではない。妊婦又は妊娠していると思われる女性には、睡眠改善薬の  
529 使用は避ける。

530 小児及び若年者では、抗ヒスタミン成分により眠気とは反対の神経過敏や中枢興奮などが  
531 現れることがある。特に15歳未満の小児ではそうした副作用が起きやすいため、抗ヒスタ  
532 ミン成分を含有する睡眠改善薬の使用は避ける。

533 他の医薬品の場合も、抗ヒスタミン成分を含有するもの（抗アレルギー薬など）は、眠気  
534 の副作用に注意する。

535 抗ヒスタミン成分を含有する医薬品を服用後は、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作  
536 に従事させてはならないが、睡眠改善薬の場合、目が覚めたあとも、注意力の低下や寝ぼけ  
537 様症状、判断力の低下等の一時的な意識障害、めまい、倦怠感<sup>けん</sup>を起こすことがあるので注意  
538 が必要である。翌日まで眠気やだるさを感じる際には、それらの症状が消失するまで自動  
539 車の運転等、危険を伴う機械の操作は避ける。

540 その他、抗ヒスタミン成分に共通する副作用等に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこと。

542 (b) プロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素

543 いずれも脳の興奮を抑え、痛覚を鈍くする作用がある。

544 少量でも眠気を催しやすく、それにより重大な事故を招くおそれがあるため、これらの成  
545 分が配合された医薬品を使用した後は、乗物や危険を伴う機械類の運転操作は避ける必要が  
546 ある。

547 また、反復して摂取すると依存を生じることが知られており、そのため、これらの成分が  
548 配合された医薬品は、本来の目的から逸脱した使用（乱用）がなされることがあることに留  
549 意が必要である。

550 不眠や不安の症状はうつ鬱病に起因して生じる場合があり、また、うつ鬱病患者はときに  
551 自殺行動を起こすことがある。かつては不眠症や不安緊張状態の鎮静を目的にプロモバレリ  
552 ル尿素が頻繁に用いられていたが、プロモバレリル尿素の大量摂取による自殺が日本我が国  
553 で社会問題になったことや、ベンゾジアゼピン系成分<sup>lxxxii</sup>にその役割が取って代わられたこ  
554 とから、近年は使用量が減少している。

555 なお、プロモバレリル尿素は胎児に障害を引き起こす可能性があるため、妊婦又は妊娠し  
556 ていると思われる女性は使用を避けるべきである。

557 (c) 生薬成分

558 神経の興奮・緊張緩和を期待してチョウトウコウ、サンソウニン、カノコソウ、チャボト  
559 ケイソウ、ホップ等の生薬成分が複数配合されている製品がある。生薬成分のみからなる鎮

<sup>lxxxii</sup> 抗不安薬、催眠薬、抗けいれん薬、筋弛緩薬として用いられる。

560 静薬であっても、複数の鎮静薬の併用や、長期連用は避けるべきである。

561 ① チョウトウコウ：アカネ科のカギカズラ、*Uncaria sinensis* Haviland 又は *Uncaria*  
562 *macrophylla* Wallich ウンカリア・シネンシス又はウンカリア・マクロフィラの通例とげ  
563 を基原とする生薬

564 ② サンソウニン：クロウメモドキ科のサネブトナツメの種子を基原とする生薬

565 ③ カノコソウ（別名キツソウコン）：オミナエシ科のカノコソウの根<sup>茎</sup>及び根<sup>茎</sup>を基原とす  
566 る生薬

567 ④ チャボトケイソウ（別名パッシフローラ）：南米原産のトケイソウ科の植物で、その開  
568 花における茎及び葉が薬用部位となる。

569 ⑤ ホップ：ヨーロッパ南部から西アジアを原産とするアサ科のホップ *Humulus lupulus* L.  
570 の成熟した球果状の果穂が薬用部位となる。

571

572 ● 漢方処方製剤

573 神経質、精神不安、不眠等の症状の改善を目的とした漢方処方製剤には、<sup>さんそうにんとう</sup>酸棗仁湯、<sup>かみきひ</sup>加味帰脾  
574 湯、<sup>よくかんさん</sup>抑肝散、<sup>よくかんさん かちんびはんげ</sup>抑肝散加陳皮半夏、<sup>さいこ かりゅうこつほれいとう</sup>柴胡加竜骨牡蛎湯、<sup>けいし かりゅうこつほれいとう</sup>桂枝加竜骨牡蛎湯等がある。

575 これらの漢方処方製剤は症状の原因となる体質の改善を主眼としているため、いずれの処方も  
576 比較的長期間（1ヶ月位）服用されることが多い。その場合に共通する留意点に関する出題につ  
577 いては、XIV-1（漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

578 これらの処方のほとんどが構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含有する医薬品に共通  
579 する留意点に関する出題については、II-1（<sup>せき</sup>咳止め・<sup>たん</sup>痰を出しやすくする薬）を参照して作成  
580 のこと。

581 <sup>よくかんさん</sup>抑肝散、<sup>よくかんさん かちんびはんげ</sup>抑肝散加陳皮半夏、<sup>さいこ かりゅうこつほれいとう</sup>柴胡加竜骨牡蛎湯、<sup>けいし かりゅうこつほれいとう</sup>桂枝加竜骨牡蛎湯については、小児の<sup>かん</sup>疳や夜  
582 泣きにも用いられるが、その場合の留意点等については、I-6（小児の<sup>かん</sup>疳を適応症とする生薬  
583 製剤・漢方処方製剤）を参照して問題作成のこと。

584 (a) <sup>さんそうにんとう</sup>酸棗仁湯

585 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの不眠症、神経症に適す  
586 とされるが、胃腸が弱い人、下痢又は下痢傾向のある人では、消化器系の副作用（悪心、食  
587 欲不振、胃部不快感等）が現れやすい等、不向きとされる。

588 1週間位服用して症状の改善がみられない場合には、漫然と服用を継続せず、医療機関を  
589 受診するなどの対応が必要である。

590 (b) <sup>かみきひ</sup>加味帰脾湯

591 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの貧血、不眠症、精  
592 神不安、神経症に適すとされる。

593 (c) <sup>よくかんさん</sup>抑肝散、<sup>よくかんさん かちんびはんげ</sup>抑肝散加陳皮半夏

594 抑肝散<sup>よくかんさん</sup>は体力中等度をめやすとして、幅広く用いることができる。神経がたかぶり、怒り  
 595 やすい、イライラなどがあるものの神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症<sup>かん</sup>（神経過敏）、歯  
 596 ぎしり、更年期障害、血の道症に適すとされる。心不全を引き起こす可能性があるため、動  
 597 く息が苦しい、疲れやすい、足がむくむ、急に体重が増えた場合は直ちに医師の診療を受  
 598 けるべきである。

599 抑肝散加陳皮半夏<sup>よくかんさんかちんぴはんげ</sup>は体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、いものに幅広く用い  
 600 ることができる。神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの神経症、不眠症、  
 601 小児夜なき、小児疳症<sup>かん</sup>（神経過敏）、更年期障害、血の道症、歯ぎしりに適すとされる。

602 (d) 柴胡加竜骨牡蛎湯<sup>さいこかりゅうこつぼれいとう</sup>

603 体力中等度以上で、精神不安があつて、動悸<sup>き</sup>、不眠、便秘などを伴う高血圧の随伴症状（動  
 604 悸<sup>き</sup>、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜なき、便秘に適すとされるが、体の虚弱な  
 605 人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱く下痢しやすい人、瀉下薬<sup>しよ</sup>（下剤）を服用  
 606 している人では、腹痛、激しい腹痛を伴う下痢の副作用が現れやすい等、不向きとされてい  
 607 る。

608 構成生薬としてダイオウを含む。構成生薬としてダイオウを含む漢方処方に共通する留意  
 609 点に関する出題については、Ⅲ－2（腸の薬）を参照して作成のこと。

610 重篤な副作用として、まれに肝機能障害、間質性肺炎を生じることが知られている。

611 (e) 桂枝加竜骨牡蛎湯<sup>けいしかりゅうこつぼれいとう</sup>

612 体力中等度以下で疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの神経質、不眠症、小児夜  
 613 なき、夜尿症、眼精疲労、神経症に適すとされる。

614  
 615 2) 相互作用、受診勧奨等

616 【相互作用】 ジフェンヒドラミン塩酸塩、プロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル  
 617 尿素は、催眠鎮静薬以外の一般用医薬品や医療用医薬品にも配合されていることがある。これ  
 618 らの成分を含有する医薬品と他の催眠鎮静薬が併用されると、効き目や副作用が増強されるお  
 619 それがある。また、医療機関で不眠症（睡眠障害）、不安症、神経症等の診断がなされ、治療（薬  
 620 物治療以外の治療を含む）を受けている患者が、一般用医薬品の催眠鎮静薬を自己判断で使用  
 621 すると、医師による治療を妨げるおそれがあるため、使用を避ける必要がある。

622 寝つきが悪いときの処置としてアルコールが摂取される（いわゆる「寝酒」）ことがあるが、  
 623 飲酒とともにジフェンヒドラミン塩酸塩、プロモバレリル尿素又はアリルイソプロピルアセチ  
 624 ル尿素を含む催眠鎮静薬を服用すると、その薬効や副作用が増強されるおそれがあるため、服  
 625 用時には飲酒を避ける必要がある。なお、生薬成分のみからなる鎮静薬や漢方処方製剤の場合  
 626 は、飲酒を避けることとはなっていないが、アルコールが睡眠の質を低下させ、医薬品の効果  
 627 を妨げることがある。

628 カノコソウ、サンソウニン、チャボトケイソウ、ホップ等を含む製品は、医薬品的な効能効  
629 果が標榜又は暗示されていなければ食品（ハーブ等）として流通可能であるが、それら成分又  
630 は他の鎮静作用があるとされるハーブ（セントジョーンズワート等）を含む食品を併せて摂取  
631 すると、医薬品の薬効が増強、減弱したり、副作用のリスクが高まったりすることがある。

632

633 【受診勧奨等】 基本的に、不眠に対して一般用医薬品で対処することが可能なのは、特段の基  
634 礎疾患がない人における、ストレス、疲労、時差ぼけ等の睡眠リズムの乱れが原因の一時的な  
635 不眠や寝つきが悪い場合である。寝ようとして床に入ってもなかなか寝つけない（入眠障害）、  
636 睡眠時間を十分取ったつもりでもぐっすり眠った感じがしない（熟眠障害）、睡眠時間中に何度  
637 も目が覚めてしまい再び寝つのが難しい（中途覚醒）、まだ眠りたいのに早く目が覚めてしま  
638 って寝つけない（早朝覚醒）等の症状が慢性的に続いている場合は、うつ鬱病等の精神神経疾  
639 患や、何らかの身体疾患に起因する不眠、又は催眠鎮静薬の使いすぎによる不眠等の可能性も  
640 考えられるため、医療機関を受診させるなどの対応が必要である。

641 なお、ブロモバレリル尿素等の鎮静成分を大量摂取したときの応急処置等は、通常の使用状  
642 況における場合とは異なり、高度な専門的判断を必要とする。関係機関の専門家に相談する、  
643 昏睡や呼吸抑制が起きているようであれば直ちに救命救急が可能な医療機関に連れて行く等の  
644 対応を取ることができるよう、十分な説明がなされるべきである。

645 また、ブロモバレリル尿素等の反復摂取によって薬物依存の状態になっている場合は、自己  
646 の努力のみで依存からの離脱を図ることは困難であり、医療機関での診療が必要である。医薬  
647 品を本来の目的以外の意図で使用する不適正な使用（乱用）、又はその疑いがある場合における  
648 対応に関する出題については、第1章 II-2）（不適正な使用と副作用有害事象）を参照して  
649 作成のこと。

650

#### 651 4 眠気を防ぐ薬

652 睡眠は健康維持に欠かせないものである。しかし、ある程度の睡眠を取っていても、食事のあ  
653 とや単調な作業が続くときなど、脳の緊張が低下して眠気や倦怠感（だるさ）を生じることがあ  
654 る。眠気防止薬は、眠気や倦怠感を除去することを目的とした医薬品であり、主な有効成分とし  
655 てカフェイン（無水カフェイン、安息香酸ナトリウムカフェイン等を含む。）が配合されている。

##### 656 1) カフェインの働き、主な副作用

657 カフェインは、脳に軽い興奮状態を引き起こし、一時的に眠気や倦怠感を抑える効果がある。  
658 脳が過剰に興奮すると、副作用として振戦（震え）、めまい、不安、不眠、頭痛等を生じることが  
659 ある。

660 カフェインの眠気防止に関連しない作用として、腎臓におけるナトリウムイオン（同時に水分）  
661 の再吸収抑制があり、尿量の増加（利尿）をもたらす。

662 安全使用の観点から留意すべき作用に、胃液分泌亢進作用があり、その結果、副作用として胃  
 663 腸障害（食欲不振、悪心・嘔吐）が現れることがある。胃酸過多の人や胃潰瘍のある人は、服用を  
 664 避ける。また、心筋を興奮させる作用もあり、副作用として動悸が現れることがある。心臓病の  
 665 ある人は、服用を避ける。

666 さらに、カフェインには、作用は弱いながら反復摂取により依存を形成するという性質がある  
 667 ため、「短期間の服用にとどめ、連用しないこと」という注意喚起がなされている。

668 妊娠中の眠気防止薬の使用が胎児に影響を及ぼすか否かは明らかにされていないが、吸収され  
 669 て循環血液中に移行したカフェインの一部は、血液-胎盤関門を通過して胎児に到達することが知  
 670 られており、胎児の発達に影響を及ぼす可能性がある。また、摂取されたカフェインの一部は乳  
 671 汁中に移行する。乳児は肝臓が未発達なため、カフェインの代謝にはより多くの時間を要する<sup>lxxxiii</sup>。  
 672 したがって、授乳中の女性がカフェインを大量に摂取したり、カフェインを連用したりした場合  
 673 には、乳児の体内にカフェインが蓄積して、頻脈や不眠等を引き起こす可能性がある。そのため、  
 674 授乳期間中はカフェインの総摂取量が継続して多くならないよう留意する。

675 なお、眠気を抑える成分ではないが、眠気による倦怠感を和らげる補助成分としてビタミンB  
 676 11（チアミン硝化物、チアミン塩化物塩酸塩等）、ビタミンB 22（リボフラビンリン酸エステル  
 677 ナトリウム等）、パントテン酸カルシウム等、ビタミンB 66（ピリドキシン塩酸塩等）、ビタミン  
 678 B 1 212（シアノコバラミン等）、ニコチン酸アミド、アミノエチルスルホン酸（タウリン）等が  
 679 配合されている場合がある。これら成分に関する出題については、XⅢ（滋養強壮保健薬）を参  
 680 照して作成のこと。

681

## 682 2) 相互作用、休養の勧奨等

683 【相互作用】 眠気防止薬におけるカフェインの1回摂取量はカフェインとして200mg、1日  
 684 摂取量はカフェインとして500mgが上限とされている。カフェインは、他の医薬品（かぜ薬、  
 685 解熱鎮痛薬、乗物酔い防止薬、滋養強壮保健薬等）や医薬部外品（ビタミン含有保健剤等）、食  
 686 品（お茶、コーヒー等<sup>lxxxiv</sup>）にも含まれているため、それらが眠気防止薬と同時に摂取されると  
 687 カフェインが過量となり、中枢神経系や循環器系等への作用が強く現れるおそれがある。

688 なお、かぜ薬やアレルギー用薬などを使用したことによる眠気を抑えるために眠気防止薬を  
 689 使用するのとは適切ではない。眠気が生じると不都合なときには、眠気を催す成分を含まない医  
 690 薬品が選択されるべきであり、また、それらの医薬品には配合成分としてカフェインが含まれ  
 691 ている場合が多いため、重複摂取を避ける観点からも併用を避ける必要がある。

692

<sup>lxxxiii</sup> カフェインの血中濃度が最高血中濃度の半分に低減するのに要する時間は、通常の成人が約3.5時間であるのに対し  
 て、乳児では約80時間と非常に長い。

<sup>lxxxiv</sup> 100g中に含まれるカフェイン量の目安（五訂増補日本食品標準成分表による）  
 玉露：160mg、煎茶：20mg、ウーロン茶：20mg、紅茶：30mg、コーヒー：60mg



693 【休養の勧奨等】 眠気防止薬は、一時的に精神的な集中を必要とするときに、眠気や倦怠感を  
694 除去する目的で使用されるものであり、疲労を解消したり、睡眠が不要になるというものでは  
695 ない。睡眠不足による疲労には、早めに十分な睡眠をとることが望ましい。特に内服液剤の場合、  
696 その製剤上の特徴（第2章Ⅱ-3）（剤形ごとの違い、適切な使用方法）参照。）から、本来  
697 の目的以外の意図に基づく不適正な使用（乱用）がなされることがある。

698 細菌やウイルスなどに感染したときに生じる眠気は、発熱と同様、生体防御の重要な一端を  
699 担っている病態生理的反応であり（睡眠により免疫機能が高まる。）、そのようなときに眠気防  
700 止薬で睡眠を妨げると、病気の治癒を遅らせるおそれがある。

701 十分な睡眠をとっていても、眠気防止薬の使用では抑えられない眠気や倦怠感（だるさ）が  
702 続くような場合には、神経、心臓、肺、肝臓等の重大な病気が原因となっている可能性がある。  
703 また、睡眠時無呼吸症候群<sup>lxxxv</sup>、重度の不安症やうつ鬱病、ナルコレプシー<sup>lxxxvi</sup>等の症状として  
704 の眠気も考えられるため、医療機関を受診するなどの対応が必要である。

705 成長ホルモンは生体を構築したり修復したりする上で重要な働きをしているホルモンである  
706 が、成長ホルモンの分泌を促す脳ホルモンはある種の睡眠物質と同時に分泌され、それにより  
707 睡眠が促されることが知られている。すなわち、定期的な睡眠によって、生体は正常な状態に  
708 維持され、また、成長することができる。したがって、特に成長期の小児の発育には睡眠が重  
709 要であることから、小児用の眠気防止薬はない。眠気防止薬が小・中学生の試験勉強に効果が  
710 あると誤解されて誤用事故を起こした事例も知られており、15歳未満の小児に使用されるこ  
711 とがないよう注意が必要である。

712

## 713 5 鎮暈薬（乗物酔い防止薬）

714 めまい（眩暈）は、体の平衡を感知して、保持する機能（平衡機能）に異常が生じて起こる症状  
715 であり、内耳にある平衡器官の障害や、中枢神経系の障害など、様々な要因により引き起こされ  
716 る。乗物酔い防止薬は、乗物酔い（動揺病）によるめまい、吐きけ、頭痛を防止し、緩和すること  
717 を目的とする医薬品である。

### 718 1) 代表的な配合成分、主な副作用

719 抗めまい成分、抗ヒスタミン成分、抗コリン成分及び鎮静成分には、いずれも眠気を促す作用  
720 がある。抗コリン成分では、眠気を促すほかに、散瞳による目のかすみや異常なまぶしさを引き  
721 起こすことがある。乗物の運転操作をするときは、乗物酔い防止薬の使用を控える必要がある。

722 なお、乗物酔い防止薬には、主として吐きけを抑えることを目的とした成分も配合されるが、  
723 つわりに伴う吐きけへの対処として使用することは適当でない。

#### 724 (a) 抗めまい成分

<sup>lxxxv</sup> 睡眠中に一時的な呼吸停止又は低呼吸を生じる病気

<sup>lxxxvi</sup> 十分な睡眠をとっていてもなお、突然に耐え難い眠気の発作が起こる病気

725 ジフェニドール塩酸塩は、内耳にある前庭と脳を結ぶ神経（前庭神経）の調節作用のほか、  
726 内耳への血流を改善する作用を示す。抗ヒスタミン成分と共通する類似の薬理作用を示し、  
727 海外では制吐薬やめまいの治療薬として使われてきた。日本においては専ら抗めまい成分と  
728 して用いられている。副作用として、抗ヒスタミン成分や抗コリン成分と同様な頭痛、排尿  
729 困難、眠気、散瞳による異常な眩<sup>まぶ</sup>しさ、口渇のほか、浮動感や不安定感が現れることがある。  
730 排尿困難の症状がある人や緑内障の診断を受けた人では、その症状を悪化させるおそれがあり、  
731 使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師  
732 に相談がなされることが望ましい。

#### 733 (b) 抗ヒスタミン成分

734 抗ヒスタミン成分は、延髄にある嘔吐中枢<sup>おう</sup>への刺激や内耳の前庭における自律神経反射を  
735 抑える作用を示す。また、抗ヒスタミン成分は抗コリン作用を示すものが多いが、抗コリン  
736 作用も乗物酔いによるめまい、吐きけ等の防止・緩和に寄与すると考えられている。

737 ジメンヒドリナートは、ジフェンヒドラミンテオクル酸塩の一般名で、専ら乗物酔い防止  
738 薬に配合される抗ヒスタミン成分である。

739 メクリジン塩酸塩は、他の抗ヒスタミン成分と比べて作用が現れるのが遅く持続時間が長  
740 く、これも専ら乗物酔い防止薬に配合されている。

741 プロメタジン塩~~テオタル~~酸塩等のプロメタジンを含む成分については、外国において、乳  
742 児突然死症候群や乳児睡眠時無呼吸発作のような致命的な呼吸抑制を生じたとの報告がある  
743 ため、15歳未満の小児では使用を避ける必要がある。

744 このほか、乗物酔い防止薬に配合される抗ヒスタミン成分としては、クロルフェニラミン  
745 マレイン酸塩、ジフェンヒドラミンサリチル酸塩等がある。抗ヒスタミン成分に共通する副  
746 作用等に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこと。

#### 747 (c) 抗コリン成分

748 抗コリン作用を有する成分は、中枢に作用して自律神経系の混乱を軽減させるとともに、  
749 末梢では消化管の緊張を低下させる作用を示す。抗コリン成分に共通する副作用等に関する  
750 出題については、Ⅲ-3（胃腸鎮痛鎮<sup>けい</sup>痙薬）を参照して作成のこと。

751 スコポラミン臭化水素酸塩水和物は、乗物酔い防止に古くから用いられている抗コリン成  
752 分で、消化管からよく吸収され、他の抗コリン成分と比べて脳内に移行しやすいとされるが、  
753 肝臓で速やかに代謝されてしまうため、抗ヒスタミン成分等と比べて作用の持続時間は短い。  
754 スコポラミンを含む成分としてロートエキス（ロートコン（ナス科のハシリドコロ、*Scopolia*  
755 *carniolica* Jacquin 又は *Scopolia parviflora* Nakai 又はチヨウセンハシリドコロの根茎及  
756 び根を基原とする生薬）の抽出物の軟エキス）が配合されている場合もある。

#### 757 (d) 鎮静成分

758 乗物酔いの発現には不安や緊張などの心理的な要因による影響も大きく、それらを和らげ

759 ることを目的として、ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素のような鎮静  
760 成分が配合されている場合がある。鎮静成分に共通する副作用等に関する出題については、  
761 I－3（眠気を促す薬）を参照して作成のこと。

762 (e) 中枢神経系を興奮させる成分（キサンチン系成分）

763 脳に軽い興奮を起こさせて平衡感覚の混乱によるめまいを軽減させることを目的として、  
764 カフェイン（無水カフェイン、クエン酸カフェイン等を含む。）やジプロフィリンなどのキサ  
765 ンチン系と呼ばれる成分が配合されている場合がある。カフェインには、乗物酔いに伴う頭  
766 痛を和らげる作用も期待される。

767 なお、カフェインが配合されているからといって、抗めまい成分、抗ヒスタミン成分、抗  
768 コリン成分又は鎮静成分の作用による眠気が解消されるわけではない。カフェインに関する  
769 出題については、I－4（眠気を防ぐ薬）を参照して作成のこと。

770 カフェイン以外のキサンチン系成分に関する出題については、II－1（咳止め・痰を出し  
771 やすくする薬）を参照して作成のこと。

772 (f) 局所麻酔成分

773 胃粘膜への麻酔作用によって嘔吐刺激を和らげ、乗物酔いに伴う吐きけを抑えることを目  
774 的として、アミノ安息香酸エチルのような局所麻酔成分が配合されている場合がある。

775 アミノ安息香酸エチルに関する出題については、III－3（胃腸鎮痛鎮痙薬）を参照して作  
776 成のこと。乗物酔い防止薬においても、アミノ安息香酸エチルが配合されている場合には、  
777 6歳未満への使用は避ける必要がある。

778 (g) その他

779 吐きけの防止に働くことを期待して、ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド、リボフラ  
780 ビン等のビタミン成分が補助的に配合されている場合がある。これら成分に関する出題につ  
781 いては、XIII（滋養強壮保健薬）を参照して作成のこと。

782

783 2) 相互作用、受診勧奨等

784 【相互作用】 抗ヒスタミン成分、抗コリン成分、鎮静成分、カフェイン類等の配合成分が重複  
785 して、鎮静作用や副作用が強く現れるおそれがあるので、かぜ薬、解熱鎮痛薬、催眠鎮静薬、  
786 鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）等との併用は避ける必  
787 要がある。

788 カフェイン類が配合されている場合の留意点についてはI－4（眠気を防ぐ薬）を参照して  
789 問題作成のこと。

790

791 【受診勧奨等】 3歳未満では自律神経系が未発達であるため、乗物酔いが起こることはほとん  
792 どないとされている。乗物酔い防止薬に3歳未満の乳幼児向けの製品はなく、そうした乳幼児

793 が乗物で移動中に機嫌が悪くなるむずがるような場合には、気圧変化による耳の痛みなどの他  
794 の要因が考慮されるべきであり、乗物酔い防止薬を安易に使用することのないよう注意される  
795 必要がある。

796 乗物酔いに伴う一時的な症状としてでなく、日常においてめまいが度々生じる場合には、基  
797 本的に医療機関を受診するなどの対応が必要である。その場合、動悸や立ちくらみ、低血圧な  
798 だによるふらつきは、平衡機能の障害によるめまいとは区別される必要がある。高齢者は、平  
799 衡機能の衰えによってめまいを起こしやすく、聴覚障害（難聴、耳鳴り等）に伴って現れるこ  
800 とも多い。

801

## 802 6 小児の瘡<sup>かん</sup>を適応症とする生薬製剤・漢方処方製剤（小児鎮静薬）

803 小児では、特段身体的な問題がなく、基本的な欲求が満たされていても、夜泣き、ひきつけ、  
804 瘡<sup>かん</sup>の虫等の症状が現れることがあり、他者との関わり等への不安や興奮から生じる情緒不安定・  
805 神経過敏が要因のひとつといわれ、また、睡眠のリズムが形成されるまでの発達の一過程とも考  
806 えられている。授乳後にげっぷが出なかったり、泣く際に空気を飲み込んでしまうなどして、消  
807 化管に過剰な空気が入ることと関連づけられることもある。乳児は食道と胃を隔てている括約筋  
808 が未発達で、胃の内容物をしっかり保っておくことができず、胃食道逆流に起因するむずがり、  
809 夜泣き、乳吐きなどを起こすことがある。

810 小児鎮静薬は、それらの症状を鎮めるほか、小児における虚弱体質、消化不良などの改善を目  
811 的とする医薬品（生薬製剤・漢方処方製剤）である。症状の原因となる体質の改善を主眼として  
812 いるものが多く、比較的長期間（1ヶ月位）継続して服用されることがある。その場合に共通す  
813 る留意点に関する出題については、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して作成のこと。

814 なお、身体的な問題がなく生じる夜泣き、ひきつけ、瘡<sup>かん</sup>の虫等の症状については、成長に伴っ  
815 て自然に治まるのが通常である。発達段階の一時的な症状と保護者が達観することも重要であり、  
816 小児鎮静薬を保護者側の安眠等を図ることを優先して使用することは適当でない。小児（特に乳  
817 幼児）への医薬品の使用に関する留意点については、第1章 II-4）（小児、高齢者などへの配  
818 慮）を参照して問題作成のこと。

### 819 1) 代表的な配合生薬等、主な副作用

820 小児の瘡<sup>かん</sup>は、乾という意味もあるとも言われ、痩せて血が少ないことから生じると考えられて  
821 おり、鎮静作用のほか、血液の循環を促す作用があるとされる生薬成分を中心に配合されている。  
822 鎮静と中枢刺激のように相反する作用を期待する生薬成分が配合されている場合もあるが、身体  
823 の状態によってそれらに対する反応が異なり、総じて効果もたらされると考えられている。

824 いずれも古くから伝統的に用いられているものであるが、購入者等が、「作用が穏やかで小さな  
825 子供に使っても副作用が無い」などといった安易な考えでを使用することを避け、適切な医薬品を  
826 選択することができるよう、積極的な情報提供を行うことに努める必要がある。

827 (a) ゴオウ、ジャコウ

828 緊張や興奮を鎮め、また、血液の循環を促す作用等を期待して用いられる。これら生薬成  
829 分に関する出題については、IV-1（強心薬）を参照して作成のこと。

830 (b) レイヨウカク

831 ウシ科のサイカレイヨウ（高鼻レイヨウ）等の角を基原とする生薬で、緊張や興奮を鎮め  
832 る作用等を期待して用いられる。

833 (c) ジンコウ

834 ジンチョウゲ科のジンコウ、その他同属植物の材、特にその辺材の材質中に黒色の樹脂が  
835 沈着した部分を採取したものを基原とする生薬で、鎮静、健胃、強壮などの作用を期待して  
836 用いられる。

837 (d) その他

838 リュウノウ（ボルネオールを含む。）、動物胆（ユウタンを含む。）、チョウジ、サフラン、ニ  
839 ンジン、カンゾウ等が配合されている場合がある。

840 リュウノウ、ボルネオールについてはIV-1（強心薬）、動物胆、ユウタン、チョウジにつ  
841 いてはⅢ-1（胃の薬）、サフランについてはVI（婦人薬）、ニンジンについてはXⅢ（滋養  
842 強壮保健薬）を、それぞれ参照して問題作成のこと。

843 カンゾウについては、小児の疳を適応症とする生薬製剤では主として健胃作用を期待して  
844 用いられ、配合量は比較的少ないことが多いが、他の医薬品等から摂取されるグリチルリチ  
845 ン酸も含め、その総量が継続して多くなならないよう注意されるべきである。カンゾウを含有  
846 する医薬品に共通する留意点については、II-1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照  
847 して問題作成のこと。

848

849 ● 漢方処方製剤

850 漢方処方製剤は、用法用量において適用年齢の下限が設けられていない場合にあっては、生  
851 後3ヶ月未満の乳児には使用しないこととなっている。

852 小児の疳を適応症とする主な漢方処方製剤としては、柴胡加竜骨牡蛎湯、桂枝加竜骨牡蛎  
853 湯、抑肝散、抑肝散加陳皮半夏のほか、小建中湯がある。

854 これらの処方のほとんどが、構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含有する医薬品に  
855 共通する留意点に関する出題については、II-1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照し  
856 て作成のこと。なお、乳幼児に使用する場合、体格の個人差から体重当たりのグリチルリチ  
857 ン酸の摂取量が多くなることがあるので留意される必要がある。

858 柴胡加竜骨牡蛎湯、桂枝加竜骨牡蛎湯、抑肝散、抑肝散加陳皮半夏を小児の夜泣きに用いる  
859 場合、1週間位服用しても症状の改善がみられないときには、いったん服用を中止して、専門  
860 家に相談する等、その漢方処方製剤の使用が適しているかどうか見直すなどの対応が必要であ

861 る。

862

863 【小建中湯】<sup>しょうけんちゅうとう</sup> 体力虚弱で疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸<sup>き</sup>、手足のほて  
864 り、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿及び多尿などを伴うものの小児虚弱体質、疲労倦怠<sup>けん</sup>、慢性胃腸  
865 炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜なきに適すとされる。

866 構成生薬としてカンゾウを含むが、乳幼児に使用される場合は体格の個人差から体重当たり  
867 のグリチルリチン酸の摂取量が多くなることがあることに加え、小建中湯<sup>しょうけんちゅうとう</sup>は比較的長期間（1  
868 ヶ月位）服用することがあるので、特に留意される必要がある。

869

870 2) 相互作用、受診勧奨

871 【相互作用】 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な  
872 事項について、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

873

874 【受診勧奨】 乳幼児は状態が急変しやすく、容態が変化した場合に、自分の体調を適切に伝え  
875 ることが難しいため、保護者等が状態をよく観察し、医薬品の使用の可否を見極めることが重  
876 要である。小児鎮静薬を一定期間又は一定回数服用させても症状の改善がみられない場合は、  
877 その他の原因（例えば、食事アレルギーやウイルス性胃腸炎など）に起因する可能性も考えら  
878 れるので、漫然と使用を継続せず医療機関を受診させるなどの対応が必要である。

879 乳幼児ではしばしば一過性の下痢や発熱を起こすことがあるが、激しい下痢や高熱があるよ  
880 うな場合には、脱水症状につながるおそれがあり、医師の診療を受けさせる必要がある。吐き  
881 だしたものが緑色<sup>lxxxvii</sup>をしていたり、血が混じっているような場合、又は、吐き出すときに咳<sup>せき</sup>  
882 込んだり、息を詰まらせたりするような場合も、早めに医師の診療を受けさせる必要がある。

883

## 884 II 呼吸器官に作用する薬

885 1 咳止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬（鎮咳去痰薬<sup>がい たん</sup>）

886 1) 咳や痰<sup>たん</sup>が生じる仕組み、鎮咳去痰薬<sup>がい たん</sup>の働き

887 気道に吸い込まれた埃<sup>ほこり</sup>や塵<sup>ちり</sup>などの異物が気道粘膜の線毛運動によって排出されないとき、飲食  
888 物等が誤って気管に入ってしまったとき、又は、冷たい空気や刺激性のある蒸気などを吸い込ん  
889 だときなど、それらを排除しようとして反射的に咳<sup>せき</sup>が出る。このように咳<sup>せき</sup>は、気管や気管支に何  
890 らかの異変が起こったときに、その刺激が中枢神経系に伝わり、延髄にある咳嗽中枢<sup>がいそう</sup>の働きによ  
891 って引き起こされる反応である。したがって、咳<sup>せき</sup>はむやみに抑え込むべきではないが、長く続く  
892 咳<sup>せき</sup>は体力の消耗や睡眠不足をまねくなどの悪影響もある。

<sup>lxxxvii</sup> 胆汁が混じることによる。

893 呼吸器官に感染を起こしたときや、空気が汚れた環境で過ごしたり、タバコを吸いすぎたとき  
894 などには、気道粘膜からの粘液分泌が増えるが、その粘液に気道に入り込んだ異物や粘膜上皮細  
895 胞の残骸などが混じって痰となる。痰が気道粘膜上に滞留すると呼吸の妨げとなるため、反射的  
896 に咳が生じて痰を排除しようとする。

897 気道粘膜に炎症を生じたときにも咳が誘発され、また、炎症に伴って気管や気管支が収縮して  
898 喘息（息が切れて、喉がゼーゼーと鳴る状態）を生じることもある。

899 鎮咳去痰薬は、咳を鎮める、痰の切れを良くする、また、喘息症状を和らげることを目的とす  
900 る医薬品の総称である。錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、内用液剤、シロップ剤等のほか、口腔  
901 咽喉薬の目的を兼ねたトローチ剤やドロップ剤がある。

902

903 2) 代表的な配合成分等、主な副作用

904 鎮咳去痰薬には、咳を鎮める成分、気管支を拡げる成分、痰の切れを良くする成分、気道の炎  
905 症を和らげる成分等を組み合わせて配合されている。

906 (a) 中枢神経系に作用して咳を抑える成分（鎮咳成分）

907 咳を抑えることを目的とする成分のうち、延髄の咳嗽中枢に作用するものとして、コデイ  
908 ンリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、ノスカピン塩酸塩水和物、デ  
909 キストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、チペピジンヒベンズ酸塩、ジメモルファンリン  
910 酸塩、クロペラスチン塩酸塩、クロペラスチンフェンジゾ酸塩等がある。

911 これらのうちコデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩については、その作用  
912 本体であるコデイン、ジヒドロコデインがモルヒネと同じ基本構造を持ち、依存性がある成  
913 分であり、麻薬性鎮咳成分とも呼ばれる。長期連用や大量摂取によって倦怠感や虚脱感、多  
914 幸感等が現れることがあり、薬物依存につながるおそれがある。（濫用等のおそれのある医薬  
915 品の販売については第4章Ⅲ-2）【その他遵守事項等】参照。）特に内服液剤では、その製  
916 剂的な特徴（第2章Ⅱ-3）（剤形ごとの違い、適切な使用方法）参照。）から、本来の目的以  
917 外の意図で服用する不適正な使用がなされることがある。

918 コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩は、妊娠中に摂取された場合、吸収  
919 された成分の一部が血液-胎盤関門を通過して胎児へ移行することが知られている<sup>lxxxviii</sup>。また、  
920 分娩時服用により新生児に呼吸抑制が現れたとの報告がある。また、母乳移行により乳児で  
921 モルヒネ中毒が生じたとの報告があり、授乳中の人は服用しないか、授乳を避ける必要があ  
922 る。

923 そのほか、コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩は胃腸の運動を低下させ  
924 る作用も示し、副作用として便秘が現れることがある。

<sup>lxxxviii</sup> コデインリン酸塩水和物については、動物実験（マウス）で催奇形作用が報告されている。

925 また、コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩（以下「コデイン類」とい  
 926 う。）を含む医薬品（以下「本剤」という。）については、米国等において12歳未満の小児等  
 927 への使用を禁忌とする措置がとられたことを踏まえ、平成29年度第3回薬事・食品衛生審  
 928 議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会で本剤の安全対策について検討された。その結果、  
 929 本剤による死亡例の国内報告はなく、日本での呼吸抑制のリスクは欧米と比較して遺伝学的  
 930 に低いと推定されること等から、国内で直ちに使用を制限する必要性は考えにくい一方、本  
 931 剤による小児の呼吸抑制発生リスクを可能な限り低減する観点から、一般用医薬品・医療用  
 932 医薬品とも、予防的な措置として以下を行うこととされた<sup>lxxxix</sup>。

- 933 ① 速やかに添付文書を改訂し、原則、本剤を12歳未満の小児等に使用しないよう注意  
 934 喚起を行うこと。
- 935 ② 1年6ヶ月程度の経過措置期間を設け、コデイン類を含まない代替製品や、12歳未  
 936 満の小児を適応外とする製品への切換えを行うこと。
- 937 ③ 切換え後、12歳未満の小児への使用を禁忌とする使用上の注意の改訂を再度実施す  
 938 ること（一般用医薬品は「してはいけないこと」に「12歳未満の小児」に追記する使  
 939 用上の注意の改訂を再度実施すること）<sup>xc</sup>。

940 これに対してノスカピン、ノスカピン塩酸塩水和物、デキストロメトルファン臭化水素酸  
 941 塩水和物、チペピジンヒベンズ酸塩、チペピジンクエン酸塩、ジメモルファンリン酸塩、ク  
 942 ロペラスチン塩酸塩、クロペラスチンフェンジゾ酸塩等は、非麻薬性鎮咳成分とも呼ばれる。  
 943 デキストロメトルファンフェノールフタリン塩は、主にトローチ剤・ドロップ剤に配合され  
 944 る鎮咳成分である。

945 中枢性の鎮咳作用を示す生薬成分として、ハンゲ（サトイモ科のカラスビシャクのコルク  
 946 層を除いた塊茎を基原とする生薬）が配合されている場合もある。

947 (b) 気管支を拡げる成分（気管支拡張成分）

948 メチルエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリンサッカリン塩、トリメトキノール塩酸塩  
 949 水和物、メトキシフェナミン塩酸塩等のアドレナリン作動成分は、交感神経系を刺激して気  
 950 管支を拡張させる作用を示し、呼吸を楽にして咳や喘息の症状を鎮めることを目的として用  
 951 いられる。

952 アドレナリン作動成分と同様の作用を示す生薬成分として、マオウ（マオウ科の *Ephedra*  
 953 *sinica* Stapf、*Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Meyer 又は *Ephedra equisetina* Bunge  
 954 マオウ、チュウマオウ又はエフェドラ・エタイセチナの地上茎を基原とする生薬）が配合さ

<sup>lxxxix</sup> 「コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品の「使用上の注意」改訂の周知について（依  
 頼）」（平成29年7月4日付け薬生安発0704第3号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知）

<sup>xc</sup> 「コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩又はトラマドール塩酸塩を含む医薬品の「使用上の注意」改訂の周  
 知について（依頼）」（令和元年7月9日付け薬生安発0709第11号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知）に  
 より禁忌とすることとされた。



955 れている場合もある。マオウについては、気管支拡張のほか、発汗促進、尿量増加（利尿）等  
956 の作用も期待される。

957 アドレナリン作動成分及びマオウ（構成生薬にマオウを含む漢方処方製剤も同様。）につい  
958 ては、気管支に対する作用のほか、交感神経系への刺激作用によって、心臓血管系や、肝臓  
959 でのエネルギー代謝等にも影響が生じることが考えられる。心臓病、高血圧、糖尿病又は甲  
960 状腺機能亢進症障害の診断を受けた人では、症状を悪化させるおそれがあり、使用する前に  
961 その適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされる  
962 べきである。高齢者では、心臓病や高血圧、糖尿病の基礎疾患がある場合が多く、また、一  
963 般的に心悸亢進や血圧上昇、血糖値上昇を招きやすいので、使用する前にその適否を十分考  
964 慮し、使用する場合にはそれらの初期症状等に常に留意する等、慎重な使用がなされること  
965 が重要である。

966 これらのうちメチルエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリンサッカリン塩、マオウにつ  
967 いては、中枢神経系に対する作用が他の成分に比べ強いとされ、依存性がある成分であるこ  
968 とに留意する必要がある。また、メチルエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリンサッカリ  
969 ン塩については、定められた用法用量の範囲内で乳児への影響は不明であるが、吸収された  
970 成分の一部が乳汁中に移行することが知られている。

971 自律神経系を介さずに気管支の平滑筋に直接作用して弛緩させ、気管支を拡張させる成分  
972 として、ジプロフィリン等のキサンチン系成分がある。キサンチン系成分も中枢神経系を興  
973 奮させる作用を示し、甲状腺機能障害又はてんかんの診断を受けた人では、症状の悪化を招  
974 くおそれがあり、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を  
975 行った薬剤師に相談がなされるべきである。また、キサンチン系成分は心臓刺激作用を示し、  
976 副作用として動悸が現れることがある。

977 (c) 痰の切れを良くする成分（去痰成分）

978 気道粘膜からの粘液の分泌を促進する作用を示すもの（グアイフェネシン、グアヤコール  
979 スルホン酸カリウム、クレゾールスルホン酸カリウム等）、痰の中の粘性タンパク質を溶解・  
980 低分子化して粘性を減少させるもの（エチルシステイン塩酸塩、メチルシステイン塩酸塩、  
981 カルボシステイン等）、粘液成分の含量比を調整し痰の切れを良くするもの（カルボシステイ  
982 ン）、さらに、分泌促進作用・溶解低分子化作用・線毛運動促進作用を示すもの（ブロムヘキ  
983 シン塩酸塩）などがある。

984 (d) 炎症を和らげる成分（抗炎症成分）

985 気道の炎症を和らげることを目的として、トラネキサム酸、グリチルリチン酸二カリウム  
986 等が配合されている場合がある。これら成分に関する出題については、I-1（かぜ薬（内  
987 服））を参照して作成のこと。

988 グリチルリチン酸を含む生薬成分として、カンゾウ（マメ科の *Glycyrrhiza uralensis*

989 Fischer 又は Glycyrrhiza glabra Linné ウラルカンゾウ又はグリチルリザ・グラブラの根及  
 990 びストロンで、ときには周皮を除いたもの（去皮りカンゾウ）を基原とする生薬）が用いら  
 991 れることもある。カンゾウについては、グリチルリチン酸による抗炎症作用のほか、気道粘  
 992 膜からの粘液分泌を促す等の作用も期待される。

993 カンゾウを大量に摂取するとグリチルリチン酸の大量摂取につながり、偽アルドステロン  
 994 症を起こすおそれがある。むくみ、心臓病、腎臓病又は高血圧のある人や高齢者では偽アル  
 995 ドステロン症を生じるリスクが高いため、それらの人に1日最大服用量がカンゾウ（原生薬  
 996 換算）として1g以上の製品を使用する場合は、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を  
 997 行った薬剤師に相談する等、事前にその適否を十分考慮するとともに、偽アルドステロン症  
 998 の初期症状に常に留意する等、慎重に使用する必要がある。また、どのような人が対象であ  
 999 っても、1日最大服用量がカンゾウ（原生薬換算）として1g以上となる製品は、長期連用  
 1000 を避ける。

1001 なお、カンゾウは、かぜ薬や鎮咳去痰薬以外の医薬品にも配合されていることが少なく  
 1002 く、また、甘味料として一般食品等にも広く用いられるため、医薬品の販売等に従事する専  
 1003 門家においては、購入者等に対して、摂取されるグリチルリチン酸の総量が継続して多くな  
 1004 らないように注意を促すことが重要である。

1005 甘草湯は、構成生薬がカンゾウのみからなる漢方処方製剤で、体力に関わらず使用広く応  
 1006 用でき、激しい咳、咽喉痛、口内炎、しわがれ声に、外用では痔・脱肛の痛みに用いられる。  
 1007 日本薬局方収載のカンゾウも、煎薬として同様の目的で用いられる。いずれについても、短  
 1008 期間の服用に止め、連用しないこととされており、5～6回使用しても咳や喉の痛みが鎮ま  
 1009 らない場合には、漫然と継続せず、いったん使用を中止し、医師の診療を受けるなどの対応  
 1010 が必要である。なお、甘草湯のエキス製剤は乳幼児にも使用されることがあるが、その場合、  
 1011 体格の個人差から体重あたりのグリチルリチン酸の摂取量が多くなることもあり、特に留意  
 1012 される必要がある。

#### 1013 (e) 抗ヒスタミン成分

1014 咳や喘息、気道の炎症は、アレルギーに起因する<sup>xci</sup>ことがあり、鎮咳成分や気管支拡張成  
 1015 分、抗炎症成分の働きを助ける目的で、クロルフェニラミンマレイン酸塩、クレマスチンフ  
 1016 マル酸塩、カルビノキサミンマレイン酸塩等の抗ヒスタミン成分が配合されている場合があ  
 1017 る。

1018 気道粘膜での粘液分泌を抑制することで痰が出にくくなることもあるため、痰の切れを良  
 1019 くしたい場合は併用に注意する必要がある。

1020 抗ヒスタミン成分に関する出題や、抗ヒスタミン成分が配合された内服薬に共通する留意

<sup>xci</sup> アレルギーによる気管支喘息は、炎症による粘膜の腫れにより、気道の過敏性が亢進して、気管支の内径が狭くなるとともに、ヒスタミン等の物質が気管支を収縮させることで引き起こされる。

1021 点に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこと。

1022 (f) 殺菌消毒成分

1023 口腔咽喉薬の効果を兼ねたトローチ剤やドロップ剤では、セチルピリジニウム塩化物等の  
1024 殺菌消毒成分が配合されている場合がある。基本的に他の配合成分は腸で吸収され、循環血  
1025 液中に入って薬効をもたらすのに対し、殺菌消毒成分は口腔内及び咽頭部において局所的に  
1026 作用する。したがって、口中に含み、噛まずにゆっくり溶かすようにして使用されることが  
1027 重要であり、噛み砕いて飲み込んでしまうと殺菌消毒作用は期待できない。

1028 殺菌消毒成分に関する出題については、Ⅱ－2（口腔咽喉薬、うがい薬（含嗽薬））を参照  
1029 して作成のこと。

1030 (g) 生薬成分

1031 比較的穏やかな鎮咳去痰作用を示し、中枢性鎮咳成分、気管支拡張成分、去痰成分又は抗  
1032 炎症成分の働きを助けることを期待して、次のような生薬成分が配合されている場合がある。

1033 ① キョウニン

1034 バラ科のホンアズ、アズ等の種子を基原とする生薬で、体内で分解されて生じた代  
1035 謝物の一部が延髄の呼吸中枢、咳嗽中枢を鎮静させる作用を示すとされる。

1036 ② ナンテンジツ

1037 メギ科のシロミナンテン（シロナンテン）又はナンテンの果実を基原とする生薬で、知  
1038 覚神経・末梢運動神経に作用して咳止めに効果があるとされる。

1039 ③ ゴミシ

1040 マツブサ科のチョウセンゴミシの果実を基原とする生薬で、鎮咳作用を期待して用いら  
1041 れる。

1042 ④ シャゼンソウ

1043 オオバコ科のオオバコの花期の全草を基原とする生薬で、種子のみを用いたものはシャ  
1044 ゼンシと呼ばれる。去痰作用を期待して用いられる。

1045 日本薬局方収載のシャゼンソウは、煎薬として咳に対して用いられる。

1046 ⑤ オウヒ

1047 バラ科のヤマザクラ又はカスミザクラのその他近縁植物の、~~通例、周皮を除いた~~樹皮を  
1048 基原とする生薬で、去痰作用を期待して用いられる。

1049 ⑥ キキョウ

1050 キキョウ科のキキョウの根を基原とする生薬で、痰又は痰を伴う咳に用いられる。

1051 ⑦ セネガ、オンジ

1052 セネガはヒメハギ科のセネガ又はヒロハセネガの根を基原とする生薬、オンジはヒメハ  
1053 ギ科のイトヒメハギの根及び根皮を基原とする生薬で、いずれも去痰作用を期待して用い  
1054 られる。

1055 これらの生薬成分の摂取により糖尿病の検査値に影響を生じることがあり、糖尿病が改  
 1056 善したと誤認されるおそれがあるため、1日最大配合量がセネガ原生薬として1.2g以上、  
 1057 又はオンジとして1g以上を含有する製品では、使用上の注意において成分及び分量に関  
 1058 連する注意として記載されている。

1059 ⑧ セキサソ

1060 ヒガンバナ科のヒガンバナ<sup>りん</sup>鱗茎を基原とする生薬で、去痰<sup>たん</sup>作用を期待して用いられる。  
 1061 セキサソのエキスは、別名を白色濃厚セキサソールとも呼ばれる。

1062 ⑨ バクモンドウ

1063 ユリ科のジャノヒゲの根の膨大部を基原とする生薬で、鎮咳<sup>がい</sup>、去痰<sup>たん</sup>、滋養強壮等の作用  
 1064 を期待して用いられる。

1066 ● 漢方処方製剤

1067 甘草湯<sup>かんぞうとう</sup>のほか、咳止め<sup>せき</sup>や痰<sup>たん</sup>を出しやすくする目的で用いられる漢方処方製剤としては、半夏  
 1068 厚朴湯<sup>こうぼくとう</sup>、柴朴湯<sup>さいぼくとう</sup>、麦門冬湯<sup>ばくもんどうとう</sup>、五虎湯<sup>ごことう</sup>、麻杏甘石湯<sup>まきょうかんせきとう</sup>、神秘湯<sup>しんぴとう</sup>などがある。

1069 これらのうち半夏厚朴湯<sup>はんげこうぼくとう</sup>を除くいずれも、構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含有  
 1070 する医薬品に共通する留意点に関する出題については、2)－(d) 炎症を和らげる成分を参照し  
 1071 て作成のこと。また、甘草湯<sup>かんぞうとう</sup>を除くいずれも、比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあ  
 1072 り、その場合に共通する留意点に関する出題については、XIV－1（漢方処方製剤）を参照し  
 1073 て作成のこと。

1074 (a) 半夏厚朴湯<sup>はんげこうぼくとう</sup>

1075 体力中等度をめやすとして、幅~~広く~~応用~~できる~~。気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感  
 1076 があり、ときに動悸<sup>き</sup>、めまい、嘔気<sup>おう</sup>などを伴う不安神経症、神経性胃炎、つわり、咳<sup>せき</sup>、しわが  
 1077 れ声、のどのつかえ感に適すとされる。

1078 (b) 柴朴湯<sup>さいぼくとう</sup>

1079 別名を小柴胡合半夏厚朴湯<sup>しょうさいこごうはんげこうぼくとう</sup>ともいう。体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異  
 1080 物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸<sup>き</sup>、めまい、嘔気<sup>おう</sup>などを伴うものの小児喘息、気  
 1081 管支喘息<sup>ぜん</sup>、気管支炎<sup>せき</sup>、咳、不安神経症、~~虚弱体質~~に適すとされるが、むくみの症状のある人  
 1082 等には不向きとされる。~~また、上記症状における虚弱体質改善にも用いられる。~~

1083 まれに重篤な副作用として間質性肺炎、肝機能障害を生じることが知られている。また、  
 1084 その他の副作用として、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感等の膀胱炎<sup>ぼうこう</sup>様症状が現れることがある。

1085 (c) 麦門冬湯<sup>ばくもんどうとう</sup>

1086 体力中等度以下で、痰<sup>たん</sup>が切れにくく、ときに強く咳<sup>せき</sup>こみ、又は咽頭の乾燥感があるものから咳<sup>せき</sup>、  
 1087 気管支炎<sup>ぜん</sup>、気管支喘息<sup>ぜん</sup>、咽頭炎、しわがれ声に適すとされるが、水様痰<sup>たん</sup>の多い人には不向きとさ  
 1088 れる。

1089 まれに重篤な副作用として間質性肺炎、肝機能障害を生じることが知られている。

1090 (d) 五虎湯、麻杏甘石湯、神秘湯

1091 五虎湯は体力中等度以上で、咳が強くでるものの咳、気管支喘息、気管支炎、小児喘息、感  
 1092 冒、痔の痛みに、麻杏甘石湯は体力中等度あるいはそれ以上で、咳が出て、ときにのどが渴  
 1093 くものの咳、小児喘息、気管支喘息、気管支炎、感冒、痔の痛みに、神秘湯は体力中等度ある  
 1094 いはそれ以上で、咳、喘鳴、息苦しさがあり、痰が少ないものの小児喘息、気管支喘息、気管  
 1095 支炎に用いられるが、いずれも胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人等には不向きとされる。

1096 いずれも構成生薬としてマオウを含む。マオウを含有する医薬品に共通する留意点に関す  
 1097 る出題については、2) - (b) 気管支を拡げる成分を参照して作成のこと。

1098

1099 3) 相互作用、受診勧奨

1100 【相互作用】 一般用医薬品の鎮咳去痰薬は、複数の有効成分が配合されている場合が多く、他  
 1101 の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン成分やアドレナリン作動成分を含有する医薬品（鼻炎用  
 1102 薬、睡眠改善薬、乗物酔い防止薬、アレルギー用薬等）などが併用された場合、同じ成分又は  
 1103 同種の作用を有する成分が重複摂取となり、効き目が強すぎたり、副作用が起こりやすくなる  
 1104 おそれがある。一般の生活者においては、「咳止め」と「鼻炎の薬」等は影響し合わないとの誤  
 1105 った認識がなされることが考えられるので、医薬品の販売等に従事する専門家において適宜注  
 1106 意を促していくことが重要である。

1107

1108 【受診勧奨等】 鎮咳去痰薬に解熱成分は配合されておらず、発熱を鎮める効果は期待できない。  
 1109 発熱を伴うときは、呼吸器に細菌やウイルス等の感染を生じている可能性がある。発熱を伴う  
 1110 場合における受診勧奨に関する出題については、I-1（かぜ薬）を参照して作成のこと。

1111 咳がひどく痰に線状の血が混じることがある、又は黄色や緑色の膿性の痰を伴うような場合  
 1112 には、一般用医薬品の使用によって対処を図るのでなく、早めに医療機関を受診することが望  
 1113 ましい。痰を伴わない乾いた咳が続く場合には、間質性肺炎等の初期症状である可能性があり、  
 1114 また、その原因が医薬品の副作用によるものであることもある。

1115 咳や痰、息切れ等の症状が長期間にわたっている場合には、慢性気管支炎や肺気腫<sup>xcii</sup>などの  
 1116 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の可能性があり、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。  
 1117 喫煙（当人の喫煙だけでなく、生活環境に喫煙者がいる場合の受動喫煙を含む。）は、咳や痰な  
 1118 どの呼吸器症状を遷延化・慢性化させ、COPDのリスク要因の一つとして指摘されており、  
 1119 喫煙に伴う症状のため鎮咳去痰薬を漫然と長期間にわたって使用することは適当でない。

1120 喘息については、気管支粘膜の炎症が慢性化していると、一般用医薬品の鎮咳去痰薬で一時的

<sup>xcii</sup> 何らかの原因によって次第に肺胞が壊れて、呼吸機能が低下する病気。

1121 的に症状を抑えることができたとしても、しばらくすると発作が繰り返し現れる。喘息発作が  
 1122 重積すると生命に関わる呼吸困難につながることもあり、一般用医薬品の使用によって対処を  
 1123 図るのでなく、早期に医療機関での診療を受けるなどの対応が必要である。

1124 なお、ジヒドロコデインリン酸塩、メチルエフェドリン塩酸塩等の反復摂取によって依存を  
 1125 生じている場合は、自己努力のみで依存からの離脱を図ることは困難であり、薬物依存は医療  
 1126 機関での診療が必要な病気である。医薬品を本来の目的以外の意図で使用する不適正な使用、  
 1127 又はその疑いがある場合における対応に関する出題については、第1章 II-2）（不適正な使  
 1128 用と副作用有害事象）を参照して作成のこと。

1129

## 1130 2 口腔咽喉薬、うがい薬（含嗽薬）

1131 口腔咽喉薬は、口腔内又は咽頭部の粘膜に局所的に作用して、それらの部位の炎症による痛み、  
 1132 腫れ等の症状の緩和を主たる目的とするもので、トローチ剤やドロップ剤のほか、口腔内に噴霧  
 1133 又は塗布して使用する外用液剤がある。殺菌消毒成分が配合され、口腔及び咽頭の殺菌・消毒等  
 1134 を目的とする製品もある。鎮咳成分や気管支拡張成分、去痰成分は配合されていない<sup>xciii</sup>。

1135 含嗽薬は、口腔及び咽頭の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去等を目的として、用時水に希釈又は  
 1136 溶解してうがいに用いる、又は患部に塗布した後、水でうがいする外用液剤である。

1137 これらのほか、胸部や喉の部分に適用することにより、有効成分が体温により暖められて揮散  
 1138 し、吸入されることで鼻づまりやくしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和を目的とする外用剤（塗  
 1139 り薬又は貼り薬）があるが、現在のところ、医薬品となっている製品はなく、いずれも医薬部外  
 1140 品（鼻づまり改善薬）として製造販売されている。

1141

1142 【口腔咽喉薬・含嗽薬に関する一般的な注意事項】 トローチ剤やドロップ剤は、有効成分が口  
 1143 腔内や咽頭部<sup>xciv</sup>に行き渡るよう、口中に含み、噛まずにゆっくり溶かすようにして使用される  
 1144 ことが重要であり、噛み砕いて飲み込んでしまうと効果は期待できない。

1145 噴射式の液剤では、息を吸いながら噴射すると気管支や肺に入ってしまうおそれがあるため、  
 1146 軽く息を吐きいたり、声を出しながら噴射することが望ましい。

1147 含嗽薬は、水で用時希釈又は溶解して使用するものが多いが、調製した濃度が濃すぎても薄  
 1148 すぎても効果が十分得られない。一般的に、薬液を10～20mL程度口に含み、顔を上向きに  
 1149 して咽頭の奥まで薬液が行き渡るようにガラガラを繰り返してから吐き出し、それを数回繰り  
 1150 返すのが効果的なうがいの仕方とされる。なお、含嗽薬の使用後すぐに食事を摂ると、殺菌消  
 1151 毒効果が薄れやすい。

1152 口腔咽喉薬・含嗽薬は、口腔内や咽頭における局所的な作用を目的とする医薬品であるが、

<sup>xciii</sup> これらの成分が配合されている場合には、鎮咳去痰薬に分類される。

<sup>xciv</sup> 嚥下の際は喉頭蓋が閉じて唾液とともに食道へと送られるため、喉頭から先の気道には到達しない。

1153 成分の一部が口腔<sup>くわう</sup>や咽頭の粘膜から吸収されて循環血流中に入りやすく、全身的な影響を生じ  
 1154 ることがあるため、配合成分によっては注意を要する場合がある。特に、口内炎などにより口  
 1155 腔内<sup>くわう</sup>にひどいただれがある人では、刺激感等が現れやすいほか、循環血流中への移行による全  
 1156 身的な影響も生じやすくなる。

1157

1158 1) 代表的な配合成分等、主な副作用

1159 一般用医薬品の口腔<sup>くわう</sup>咽喉薬や含嗽<sup>そく</sup>薬には、咽頭部の炎症を和らげる成分、殺菌消毒成分等を組  
 1160 み合わせて配合されている。

1161 なお、有効成分が生薬成分、グリチルリチン酸二カリウム、セチルピリジニウム塩化物等のみ  
 1162 からなる製品で、効能・効果が「痰<sup>たん</sup>、喉の炎症による声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み、  
 1163 喉の腫れ、口腔<sup>くわう</sup>内や喉の殺菌・消毒・洗浄又は口臭の除去」の範囲に限られるものについては、  
 1164 医薬部外品として扱われている。

1165 (a) 炎症を和らげる成分（抗炎症成分）

1166 声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み又は喉の腫れの症状を鎮めることを目的として、  
 1167 ~~リゾチーム塩酸塩~~、グリチルリチン酸二カリウム、トラネキサム酸等の抗炎症成分が用いら  
 1168 れる。これら成分に関する出題については、I-1（かぜ薬）を参照して作成のこと。

1169 ~~リゾチーム塩酸塩については、口腔<sup>くわう</sup>咽喉薬や含嗽<sup>そく</sup>薬の配合成分として使用された場合であ  
 1170 っても、ショック（アナフィラキシー）や皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症のよう  
 1171 な重篤な副作用を生じることがあり、また、鶏卵アレルギーの既往歴がある人では使用を避  
 1172 ける必要がある。~~

1173 炎症を生じた粘膜組織の修復を促す作用を期待して、アズレンスルホン酸ナトリウム（水  
 1174 溶性アズレン）が配合されている場合もある。

1175 (b) 殺菌消毒成分

1176 口腔<sup>くわう</sup>内や喉に付着した細菌等の微生物を死滅させたり、その増殖を抑えることを目的とし  
 1177 て、セチルピリジニウム塩化物、デカリニウム塩化物、ベンゼトニウム塩化物、ポビドンヨ  
 1178 ード、ヨウ化カリウム、ヨウ素、クロルヘキシジングルコン酸塩、クロルヘキシジン塩酸塩、  
 1179 チモール等が用いられる。

1180 セチルピリジニウム塩化物、デカリニウム塩化物、ベンゼトニウム塩化物に関する出題に  
 1181 ついては、Ⅷ（鼻に用いる薬）を参照して作成のこと。

1182 ヨウ素系殺菌消毒成分（ポビドンヨード、ヨウ化カリウム、ヨウ素）、クロルヘキシジング  
 1183 ルコン酸塩、クロルヘキシジン塩酸塩及びチモールに関する出題については、Ⅹ（皮膚に用  
 1184 いる薬）を参照して問題作成のこと。

1185 ヨウ素系殺菌消毒成分又はクロルヘキシジングルコン酸塩若しくはクロルヘキシジン塩酸  
 1186 塩が配合されたものでは、まれにショック（アナフィラキシー）のような全身性の重篤な副

1187 作用を生じることがある。これらの成分に対するアレルギーの既往歴がある人では、使用を  
1188 避ける必要がある。

1189 ヨウ素系殺菌消毒成分が口腔内に使用される場合、結果的にヨウ素の摂取につながり、甲  
1190 状腺におけるホルモン産生<sup>xcv</sup>に影響を及ぼす可能性がある。バセドウ病<sup>xcvi</sup>や橋本病<sup>xcvii</sup>など  
1191 の甲状腺疾患の診断を受けた人では、その治療に悪影響（治療薬の効果減弱など）を生じる  
1192 おそれがあるため、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤  
1193 を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

1194 妊娠中に摂取されたヨウ素の一部は血液-胎盤関門を通過して胎児に移行するため、長期間  
1195 にわたって大量に使用された場合には、胎児にヨウ素の過剰摂取による甲状腺機能障害を生  
1196 じるおそれがある。また、摂取されたヨウ素の一部が乳汁中に移行することも知られており、  
1197 母乳を与える女性では、同様に留意される必要がある。

1198 このほか、ヨウ素系殺菌消毒成分については、口腔粘膜の荒れ、しみる、灼熱感、悪心（吐  
1199 きけ）、不快感の副作用が現れることがある。また、ポビドンヨードが配合された含嗽薬では、  
1200 その使用によって銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがある。

1201 クロルヘキシジングルコン酸塩が配合された含嗽薬については、口腔内に傷やひどいただ  
1202 れのある人では、強い刺激を生じるおそれがあるため、使用を避ける必要がある。

1203 (c) 局所保護成分

1204 喉の粘膜を刺激から保護する成分として、グリセリンが配合されている場合がある。

1205 日本薬局方収載の複方ヨード・グリセリンは、グリセリンにヨウ化カリウム、ヨウ素、ハ  
1206 ッカ水、液状フェノール等を加えたもので、喉の患部に塗布して殺菌・消毒に用いられる。

1207 (d) 抗ヒスタミン成分

1208 咽頭の粘膜に付着したアレルギーによる喉の不快感等の症状を鎮めることを目的として、  
1209 口腔咽喉薬にクロルフェニラミンマレイン酸塩のような抗ヒスタミン成分が配合されている  
1210 場合がある。この場合、鎮咳去痰薬のように、咳に対する薬効を標榜することは出来ない。

1211 咽頭における局所的な作用を目的として配合されるが、結果的に抗ヒスタミン成分を経口  
1212 的に摂取することとなり、内服薬と同様な副作用が現れることがある。抗ヒスタミン成分に  
1213 共通する留意点等に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこ  
1214 と。

1215 (e) 生薬成分

1216 ① ラタニア

1217 クラメリア科のクラメリア・トリアンドラ及びその同属植物の根を基原とする生薬で、

<sup>xcv</sup> 甲状腺は、喉頭突起（のどぼとけ）の下方に位置する小さな内分泌腺で、摂取されたヨウ素を取り込んでホルモン（甲状腺ホルモン）を産生する。

<sup>xcvi</sup> 甲状腺ホルモンの分泌が異常に亢進して、眼球突出、頻脈などの症状が現れる病気。

<sup>xcvii</sup> 甲状腺ホルモンの分泌が低下して、倦怠感、むくみ、筋力低下などの症状が現れる病気。



1218 咽頭粘膜をひきしめる（収斂<sup>れん</sup>）作用により炎症の寛解を促す効果を期待して用いられる。

1219 ② ミルラ

1220 カンラン科のミルラノキ等の植物の皮部の傷口から流出して凝固した樹脂を基原とする

1221 生薬で、咽頭粘膜をひきしめる（収斂<sup>れん</sup>）作用のほか、抗菌作用も期待して用いられる。

1222 ③ その他

1223 芳香による清涼感等を目的として、ハッカ（シソ科のハッカの地上部を基原とする生薬）、

1224 ウイキョウ（セリ科のウイキョウの果実を基原とする生薬）、チョウジ（フトモモ科のチョ

1225 ウジの蕾<sup>つぼみ</sup>を基原とする生薬）、ユーカリ（フトモモ科のユーカリノキ又はその近縁植物の

1226 葉を基原とする生薬）等から得られた精油成分が配合されている場合がある。チョウジ油

1227 については、X I - 1（歯痛・歯槽膿漏<sup>のう</sup>薬）も参照のこと。

1228

1229 ● 漢方処方製剤

1230 主として喉の痛み等を鎮めることを目的とし、咳や痰<sup>せき たん</sup>に対する効果を標榜<sup>ぼう</sup>しない漢方処方製剤

1231 として、桔梗湯<sup>ききやうとう</sup>、驅風解毒散<sup>くふうげどくさん</sup>・驅風解毒湯<sup>くふうげどくとう</sup>、白虎加人參湯<sup>びやっこかにんじんとう</sup>、響声破笛丸<sup>きやうせい はてまがん</sup>などがある。これらは

1232 いずれも構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含有する医薬品に共通する留意点に関する

1233 出題については、II - 1（咳止め・痰<sup>せき たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

1234 (a) 桔梗湯<sup>ききやうとう</sup>、驅風解毒散<sup>くふうげどくさん</sup>、驅風解毒湯<sup>くふうげどくとう</sup>

1235 桔梗湯<sup>ききやうとう</sup>は、体力に関わらず使用~~法~~で~~く~~用<sup>で</sup>き、る。喉が腫れて痛み、ときに咳<sup>せき</sup>がでるもの

1236 の扁桃炎<sup>へんたんとんえん</sup>、扁桃周囲炎<sup>へんたんとんしゅういえん</sup>に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、食欲不振、胃部

1237 不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

1238 驅風解毒散<sup>くふうげどくさん</sup>及び驅風解毒湯<sup>くふうげどくとう</sup>は体力に関わらず使用<sup>で</sup>き、喉が腫れて痛む扁桃炎<sup>へんたんとんえん</sup>、扁桃周囲炎<sup>へんたんとんしゅういえん</sup>

1239 に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱く下痢しやすい

1240 人では、食欲不振、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。水又はぬる

1241 ま湯に溶かしてうがいしながら少しずつゆっくり服用するのを特徴とし、驅風解毒湯<sup>くふうげどくとう</sup>のトロ

1242 ーチ剤もある。

1243 いずれも短期間の使用に限られるものでないが、5～6回服用しても症状の改善がみられ

1244 ない場合には、扁桃炎<sup>へんたんとんえん</sup>や扁桃周囲炎<sup>へんたんとんしゅういえん</sup>から細菌等の二次感染を生じている可能性もあるので（特

1245 くに、高熱を伴う場合）、漫然と使用を継続せずにいったん使用を中止して、医師の診療を受け

1246 るなどの対応が必要である。

1247 (b) 白虎加人參湯<sup>びやっこかにんじんとう</sup>

1248 体力中等度以上で、熱感と口渇が強いものの喉の渇き、ほてり、湿疹<sup>しん</sup>・皮膚炎、皮膚のか

1249 ゆみに適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸虚弱で冷え

1250 症の人では、食欲不振、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

1251 比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあり、その場合に共通する留意点に関する出

1252 題については、XIV－1（漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

1253 (c) 響声破笛丸

1254 体力に関わらず使用法＜応用＞できる。しわがれ声、咽喉不快に適すとされるが、胃腸が弱  
1255 く下痢しやすい人では、食欲不振、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。  
1256 なお、短期間の使用に限られるものでないが、漫然と使用を継続することは避け、5～6日  
1257 間使用して症状の改善がみられない場合には、いったん使用を中止して専門家に相談がなさ  
1258 れることが望ましい。

1259 構成生薬としてダイオウを含む場合があり、その場合の留意点に関する出題については、  
1260 Ⅲ－2（腸の薬）を参照して作成のこと。

1261

1262 2) 相互作用、受診勧奨

1263 【相互作用】 ヨウ素は、レモン汁やお茶などに含まれるビタミンC等の成分と反応すると脱色  
1264 を生じて殺菌作用が失われるため、ヨウ素系殺菌消毒成分が配合された含嗽薬では、そうした  
1265 食品を摂取した直後の使用や混合は避けることが望ましい。

1266 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な事項につい  
1267 ては、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

1268

1269 【受診勧奨】 飲食物を飲み込むときに激しい痛みを感じるような場合には、扁桃蜂巣炎（扁桃  
1270 の回りの組織が細菌の感染により炎症を起こした状態）や扁桃膿瘍（扁桃の部分に膿が溜まっ  
1271 た状態）などを生じている可能性もあり、早期に医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

1272 声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み等の症状は、かぜの症状の一部として起こること  
1273 が多く、通常であれば、かぜの寛解とともに治まる。喉を酷使したりしていないにもかかわらず  
1274 症状が数週間以上続く場合には、喉頭癌等の重大な疾患が原因となっている可能性もあるの  
1275 で、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

1276

1277 Ⅲ 胃腸に作用する薬

1278 1 胃の薬（制酸薬、健胃薬、消化薬）

1279 1) 胃の不調、薬が症状を抑える仕組み

1280 胃の働きに異常が生じると、胃液の分泌量の増減や食道への逆流が起こったり、胃液による消  
1281 化作用から胃自体を保護する働きや胃の運動が低下して、胸やけや胃の不快感、消化不良、胃も  
1282 たれ、食欲不振等の症状として現れる。また、胃の働きに異常を生じていなくても、食べすぎた  
1283 ときなど、胃内容物の量に対してそれを処理する働きが追いつかないことにより、腹部に不調を  
1284 感じる場合もある。

1285 吐きけや嘔吐は、延髄にある嘔吐中枢の働きによって起こる。嘔吐中枢が刺激される経路<sup>xcviii</sup>は  
 1286 いくつかあるが、消化管での刺激が副交感神経系を通じて嘔吐中枢を刺激する経路も知られてお  
 1287 り、胃の痙攣等によって吐きけが起きている場合がある。

1288 制酸薬は、胃液の分泌亢進による胃酸過多や、それに伴う胸やけ、腹部の不快感、吐きけ等の  
 1289 症状を緩和することを目的とする医薬品である。その配合成分としては、胃酸の働きを弱めるも  
 1290 の、胃液の分泌を抑えるものなどが用いられる。

1291 健胃薬は、弱った胃の働きを高めること（健胃）を目的とする医薬品である。配合される生薬  
 1292 成分は独特の味や香りを有し、唾液や胃液の分泌を促して胃の働きを活発にする作用があるとさ  
 1293 れる。

1294 消化薬は、炭水化物、脂質、タンパク質等の分解に働く酵素を補う等により、胃や腸の内容物  
 1295 の消化を助けることを目的とする医薬品である。

1296 これらのほか一般用医薬品には、様々な胃腸の症状に幅広く対応できるよう、制酸、胃粘膜保  
 1297 護、健胃、消化、整腸、鎮痛鎮痙、消泡<sup>xcix</sup>等、それぞれの作用を目的とする成分を組み合わせた  
 1298 製品（いわゆる総合胃腸薬）もある。制酸と健胃のように相反する作用を期待するものが配合さ  
 1299 れている場合もあるが、胃腸の状態によりそれら成分に対する反応が異なり、総じて効果がもた  
 1300 らされると考えられている。しかし、消化不良、胃痛、胸やけなど症状がはっきりしている場合  
 1301 は、効果的に症状の改善を図るため、症状に合った成分のみが配合された製品が選択されること  
 1302 が望ましい。

1303 健胃薬、消化薬、整腸薬又はそれらの目的を併せ持つものには、医薬部外品として製造販売さ  
 1304 れている製品もあるが、それらは人体に対する作用が緩和なものとして、配合できる成分やその  
 1305 上限量が定められており、また、効能・効果の範囲も限定されている。

1306

## 1307 2) 代表的な配合成分等、主な副作用、相互作用、受診勧奨

### 1308 (a) 制酸成分

1309 中和反応によって胃酸の働きを弱めること（制酸）を目的として、i) 炭酸水素ナトリウム  
 1310 （重曹）のほか、ii) 乾燥水酸化アルミニウムゲル、ジヒドロキシアルミニウムモノアセテ  
 1311 ト等のアルミニウムを含む成分、iii) ケイ酸マグネシウム、酸化マグネシウム、炭酸マグネシ  
 1312 ウム等のマグネシウムを含む成分、iv) 合成ヒドロタルサイト、メタケイ酸アルミン酸マグネ  
 1313 シウム等のアルミニウムとマグネシウムの両方を含む成分、v) 沈降炭酸カルシウム、リン酸

<sup>xcviii</sup> 副交感神経系を経由する刺激以外の、嘔吐中枢が刺激される主な経路としては、内耳の前庭にある平衡器官の不調によ  
 って生じる刺激や、大脳皮質の興奮による刺激などがあり、また、延髄にある受容体が薬物などにより直接刺激されること  
 によって誘発される嘔吐もある。

<sup>xcix</sup> 気泡は、空気などの気体が球状になって液体中に存在するものであり、気泡を生じた液体は、気体の体積の分だけ全体の  
 体積が増す。液体状である消化管内容物中に無数の気泡が発生すると、その体積の増加によって消化管が刺激され、腹部の  
 膨満感として知覚される。消化管内容物中に発生した気泡の分離を促すこと（消泡）により、気体の吸収、排出が容易とな  
 る。

1314 水素カルシウム等のカルシウムを含む成分、又はこれらの成分を組み合わせたもの等が配合  
 1315 されている場合がある。メタケイ酸アルミン酸マグネシウムは、胃酸の中和作用のほか、胃  
 1316 粘膜にゼラチン状の皮膜を形成して保護する作用もあるとされる。

1317 また、ボレイ（イボタガキ科のカキの貝殻を基原とする生薬）等の生薬成分も、それらに  
 1318 含まれる炭酸カルシウムによる作用を期待して用いられる。

1319 これらの制酸成分を主体とする胃腸薬については、酸度の高い食品と一緒に使用すると胃  
 1320 酸に対する中和作用が低下することが考えられるため、炭酸飲料等での服用は適当でない。

1321 制酸成分のうちアルミニウムを含む成分については、透析療法を受けている人が長期間服  
 1322 用した場合にアルミニウム脳症<sup>c</sup>及びアルミニウム骨症<sup>ci</sup>を引き起こしたとの報告があり、透  
 1323 析療法を受けている人では使用を避ける必要がある。また、透析治療を受けていない人でも、  
 1324 長期連用は避ける必要がある。

1325 腎臓病の診断を受けた人では、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム等  
 1326 の無機塩類の排泄<sup>せつ</sup>が遅れたり、体内に貯留しやすくなるため、使用する前にその適否につき、  
 1327 治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

1328 制酸成分は他の医薬品（かぜ薬、解熱鎮痛薬等）でも配合されていることが多く、併用に  
 1329 よって制酸作用が強くなりすぎる可能性があるほか、高カルシウム血症、高マグネシウム血  
 1330 症等を生じるおそれがあるため、同種の無機塩類を含む医薬品との相互作用に注意する必要  
 1331 がある。また、カルシウム、アルミニウムを含む成分については止瀉薬<sup>しや</sup>、マグネシウムを含  
 1332 む成分については瀉下薬<sup>しや</sup>に配合される成分でもあり、それぞれ便秘、下痢等の症状に注意す  
 1333 ることも重要である。

#### 1334 (b) 健胃成分

1335 味覚や嗅覚を刺激して反射的な唾液や胃液の分泌を促すことにより、弱った胃の働きを高  
 1336 めることを目的として、オウバク、オウレン、センブリ、ゲンチアナ、リュウタン、ケイヒ、  
 1337 ユウタン等の生薬成分が配合されている場合がある。

1338 これら生薬成分が配合された健胃薬は、散剤をオブラートで包む等、味や香りを遮蔽する  
 1339 方法で服用されると効果が期待できず、そのような服用の仕方は適当でない。

#### 1340 ① オウバク、オウレン

1341 オウバク（ミカン科のキハダ又は *Phellodendron chinense* Schneider フェロデンドロ  
 1342 ン・キネンセの周皮を除いた樹皮を基原とする生薬）、オウレン（キンポウゲ科のオウレ  
 1343 ン、*Coptis chinensis* Franchet、*Coptis deltoidea* C.Y. Cheng et Hsiao 又は *Coptis*  
 1344 *teeta* Wallich コプティス・キネンシス、コプティス・デルトイデア又はコプティス・テ

<sup>c</sup> 体内でアルミニウムが過剰に存在する場合、脳にアルミニウムが蓄積することにより発生する脳症で、アルミニウムが脳の組織に付着することで、脳神経系の伝達を妨げ、言語障害等を引き起こす。

<sup>ci</sup> 骨組織にアルミニウムが蓄積して骨が軟化し、広範囲な骨・関節痛、骨折などを生じる病気。

①の根をほとんど除いた根茎を基原とする生薬）は、いずれも苦味による健胃作用を期待して用いられる。

日本薬局方収載のオウバク末（オウバクを粉末にしたもの）、オウレン末は、止瀉薬としても用いられる。止瀉薬における注意に関する出題については、Ⅲ-2（腸の薬）を参照して作成のこと。

日本薬局方収載のオウバク末は、外用薬としても用いられるが、その場合に関する出題についてはⅩ（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。

② センブリ

リンドウ科のセンブリの開花期の全草を基原とする生薬で、苦味による健胃作用を期待して用いられる。

日本薬局方収載のセンブリ末は、健胃薬のほか止瀉薬としても用いられる。

③ ゲンチアナ、リュウタン

ゲンチアナ（リンドウ科の *Gentiana lutea* Linné ゲンチアナの根及び根茎を基原とする生薬）、リュウタン（リンドウ科のトウリンドウ等の根及び根茎を基原とする生薬）は、いずれも苦味による健胃作用を期待して用いられる。

④ ユウタン

クマ科の *Ursus arctos* Linné 又はヒダマその他近縁動物の胆汁を乾燥したものを基原とする生薬で、苦味による健胃作用を期待して用いられるほか、消化補助成分として配合される場合もある。

同様の作用を期待して、ウシ等に由来する動物胆が用いられることもある。

⑤ ケイヒ

クスノキ科の *Cinnamomum cassia* J. Presl シンナムムム・カッシアの樹皮又は周皮の一部を除いた樹皮ものを基原とする生薬で、香りによる健胃作用を期待して用いられる。

⑥ その他

香りによる健胃作用を期待して用いられる生薬（芳香性健胃生薬）として、コウボク（モクレン科のホオノキ、*Magnolia officinalis* Rehder et Wilson 又は Magnolia officinalis Rehder et Wilson var. *biloba* Rehder et Wilson カラホオ等の樹皮を基原とする生薬）、ショウキョウ（ショウガ科のショウガの根茎を基原とする生薬）、チョウジ（フトモモ科のチョウジの蕾を基原とする生薬）、チンピ（ミカン科のウンシュウミカンの成熟した果皮を基原とする生薬）、ソウジュツ（キク科のホソバオケラ、シナオケラ等、又はそれらの種間雑種の根茎を基原とする生薬）、ビャクジュツ（キク科のオケラの根茎（和ヲビャクジュツ）又はオオバナオケラの根茎（唐カラビャクジュツ）を基原とする生薬）、ウイキョウ（Ⅱ-2（口腔咽喉薬、うがい薬）参照。）、オウゴン（Ⅴ-1（痔の薬）参照。）等が配合されている場合がある。

1379 味覚や嗅覚に対する刺激以外の作用による健胃成分として、乾燥酵母やカルニチン塩化物  
1380 が配合されている場合がある。

1381 乾燥酵母は、胃腸の働きに必要な栄養素を補給することにより胃の働きを高めるものと考  
1382 えられている。

1383 カルニチン塩化物は、生体内に存在する有機酸の一種であり、その働きは必ずしも明らか  
1384 にされていないが、胃液分泌を促す、胃の運動を高める、胃壁の循環血流を増す等の作用が  
1385 あるとされ、胃の働きの低下や食欲不振の改善を期待して、胃腸薬や滋養強壮保健薬に用い  
1386 られる。

#### 1387 (c) 消化成分

1388 炭水化物、脂質、タンパク質、繊維質等の分解に働く酵素を補うことを目的として、ジア  
1389 スターゼ、プロザイム、ニューラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ又はその複合酵素（ビオジア  
1390 スターゼ、タカチアスターゼ）等が配合されている場合がある。

1391 胆汁末や動物胆（ユウタンを含む。）、ウルソデオキシコール酸、デヒドロコール酸は、胆  
1392 汁の分泌を促す作用（利胆作用）があるとされ、消化を助ける効果を期待して用いられる。  
1393 これらの成分は肝臓の働きを高める作用もあるとされるが、肝臓病の診断を受けた人ではか  
1394 えって症状を悪化させるおそれがあり、使用する前にその適否につき、治療を行っている医  
1395 師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

#### 1396 (d) その他の成分

##### 1397 ① 胃粘膜保護・修復成分

1398 胃粘液の分泌を促す、胃粘膜を覆って胃液による消化から保護する、荒れた胃粘膜の  
1399 修復を促す等の作用を期待して、アズレンスルホン酸ナトリウム（水溶性アズレン）、ア  
1400 ルジオキサ、スクラルファート、ゲファルナート、ソファルコン、テプレノン、セトラ  
1401 キサート塩酸塩、トロキシピド、銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリ  
1402 ウム、メチルメチオニンスルホニウムクロライド等が配合されている場合がある。この  
1403 ほか、胃粘膜保護作用を期待して、アカメガシワ（トウダイグサ科のアカメガシワの樹  
1404 皮を基原とする生薬）等の生薬成分も用いられる。

1405 これらのうち、アルジオキサ（アラントインと水酸化アルミニウムの複合体）、スクラ  
1406 ルファートはアルミニウムを含む成分であるため、透析を受けている人では使用を避け  
1407 る必要がある。透析治療を受けていない人でも、長期連用は避ける必要がある。また、  
1408 腎臓病の診断を受けた人では、アルミニウムが体内に貯留しやすいため、使用する前に  
1409 その適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなさ  
1410 れるべきである。

1411 ソファルコン、テプレノンについては、まれに重篤な副作用として肝機能障害を生じ  
1412 ることがある。肝臓病の診断を受けた人では、使用する前にその適否につき、治療を行

1413 っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

1414 テブレノンについては、その他の副作用として腹部膨満感、吐きけ、腹痛、頭痛、皮下  
1415 出血、便秘、下痢、口渇が現れることがある。

1416 セトラキサート塩酸塩は、体内で代謝されてトラネキサム酸（Ⅰ－1（かぜ薬）参照。）  
1417 を生じることから、血栓のある人、血栓を起こすおそれのある人では、生じた血栓が分  
1418 解されにくくなることが考えられるので、使用する前にその適否につき、治療を行っ  
1419 ている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

1420 ② 胃粘膜の炎症を和らげる成分（抗炎症成分）

1421 胃粘膜の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウム、グリチル  
1422 リチン酸ナトリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、又は生薬成分としてカンゾ  
1423 ウが配合されている場合がある。グリチルリチン酸を含む成分又はカンゾウを含有する  
1424 医薬品に共通する留意点に関する出題については、Ⅰ－1（かぜ薬）、Ⅱ－1（せき止め・  
1425 痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

1426 ③ 消泡成分

1427 消化管内容物中に発生した気泡の分離を促すことを目的として、ジメチルポリシロキ  
1428 サン（別名ジメチコン）が配合されている場合がある。

1429 ④ 胃液分泌抑制成分

1430 胃液の分泌は副交感神経系からの刺激によって亢進<sup>こうしん</sup>することから、過剰な胃液の分泌  
1431 を抑える作用<sup>cii</sup>を期待して、副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンの働きを抑え  
1432 るロートエキスやピレンゼピン塩酸塩が配合されている場合がある。これらの成分を含  
1433 有する胃腸薬では、胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬、乗物酔い防止薬との併用を避ける必要がある。

1434 ロートエキスに関する出題については、Ⅲ－3（胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬）を参照して作成の  
1435 こと。

1436 ピレンゼピン塩酸塩は、消化管の運動にはほとんど影響を与えずに胃液の分泌を抑え  
1437 る作用を示すとされる。しかし、消化管以外では一般的な抗コリン作用のため、排尿困  
1438 難、動悸、目のかすみの副作用を生じることがある。排尿困難の症状がある人、緑内障  
1439 の診断を受けた人では、症状の悪化を招くおそれがあり、使用する前にその適否につき、  
1440 治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

1441 また、使用後は乗物又は機械類の運転操作を避ける必要がある。なお、まれに重篤な副  
1442 作用としてアナフィラキシーを生じることがある。

1443

1444 ● 漢方処方製剤

<sup>cii</sup> アセチルコリンのほか、ヒスタミンも胃液分泌に関与する伝達物質のひとつであり、胃液分泌を抑制することを目的として、ヒスタミンの働きを抑える成分が配合された医薬品がH<sub>2</sub>ブロッカーと呼ばれる製品群である。

1445 胃の不調を改善する目的で用いられる漢方処方製剤としては、安中散、人参湯（理中丸）、平胃  
 1446 散、六君子湯等がある。

1447 これらはいずれも構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含有する医薬品に共通する留意  
 1448 点に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。  
 1449 また、いずれも比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあり、その場合に共通する留意点に  
 1450 関する出題については、XIV－1（漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

1451 (a) 安中散

1452 体力中等度以下で、腹部は力がなくて筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛又は腹痛があつて、  
 1453 ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、吐きけ、嘔吐などを伴うものの神経性胃炎、  
 1454 慢性胃炎、胃腸虚弱に適するとされる。

1455 (b) 人参湯（理中丸）

1456 体力虚弱で、疲れやすく手足などが冷えやすいものの胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹  
 1457 痛、急・慢性胃炎に適すとされる。下痢又は嘔吐に用いる場合には、漫然と長期の使用は避  
 1458 け、1週間位使用しても症状の改善がみられないときは、いったん使用を中止して専門家に  
 1459 相談がなされるべきである。

1460 (c) 平胃散

1461 体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときに吐きけ、食後に腹が鳴って下痢の傾  
 1462 向のあるもの人における食べすぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振  
 1463 に適すとされる。急性胃炎に用いる場合には、漫然と長期の使用は避け、5～6回使用して  
 1464 も症状の改善がみられないときは、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの  
 1465 対応が必要である。

1466 (d) 六君子湯

1467 体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、て疲れやすく、貧血性  
 1468 で手足が冷えやすいものの胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に適す  
 1469 とされる。まれに重篤な副作用として、肝機能障害を生じることが知られている。

1470

1471 【相互作用】 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な  
 1472 事項については、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

1473

1474 【受診勧奨】 一般用医薬品の胃薬（制酸薬、健胃薬、消化薬）は、基本的に、一時的な胃の不調  
 1475 に伴う諸症状を緩和する目的で使用されるものであり、慢性的に胸やけや胃部不快感、胃部膨  
 1476 満感等の症状が現れる場合、又は医薬品を使用したときは治まるが、やめると症状がぶり返し、



1477 医薬品が手放せないような場合には、食道裂孔ヘルニア<sup>ciii</sup>、胃・十二指腸潰瘍、胃ポリープ等を  
1478 生じている可能性も考えられ、医療機関を受診するなどの対応が必要である。

1479 制酸薬は、胃内容物の刺激によって分泌促進される胃液分泌から胃粘膜を保護することを目  
1480 的として、食前又は食間に服用することとなっているものが多いが、暴飲暴食による胸やけ、  
1481 吐きけ（二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気）、嘔吐等の症状を予防するものではない。「腹八  
1482 分目を心がける」「良く噛んでゆっくりと食べる」「香辛料やアルコール、カフェイン等を多く  
1483 含む食品<sup>civ</sup>の摂取を控えめにする」等、生活習慣の改善が図られることも重要である。

1484 嘔吐に発熱や下痢、めまいや興奮を伴う場合、胃の中に吐くものがないのに吐きけが治まら  
1485 ない場合等には、医療機関を受診するなどの対応が必要である。特に、乳幼児や高齢者で嘔吐  
1486 が激しい場合には、脱水症状を招きやすく、また、吐瀉物が気道に入り込んで呼吸困難を生じ  
1487 ることもあるため、医師の診療を受けることが優先されるべきである。

1488 吐きけや嘔吐に腹部の激しい痛みを伴う場合の受診勧奨に関する出題については、Ⅲ－3（胃  
1489 腸鎮痛鎮痙薬）を参照して作成のこと。

### 1491 3) 胃の薬の服用方法

1492 胃の薬は、健胃成分、消化成分、制酸成分などが、その治療目的に合わせて組み合わせられる  
1493 が、消化を助け、胃もたれを改善し、胃をすっきりさせる効果を主とする製剤は、食後服用の  
1494 ものが多い。空腹時や就寝時の胸やけ、ストレスによる胃酸の出すぎなどを抑える効果を主と  
1495 する製剤は、食間や就寝前の服用のものが多い。どちらの効果も有する製剤では、食後又は食  
1496 間の服用指示のものが多い。症状により製剤を選択する場合は、その症状のひどい時間を確認  
1497 し、製剤の服用方法も参考にして選択すると良い。

1498 医療機関で処方された医療用医薬品を服用している場合は、副作用による胃の不快感を防止  
1499 するために胃の薬も処方されている場合もあるので、販売時には胃の薬が処方されていないか  
1500 必ず確認する必要がある。

1501

## 1502 2 腸の薬（整腸薬、止瀉薬、瀉下薬）

### 1503 1) 腸の不調、薬が症状を抑える仕組み

1504 腸における消化、栄養成分や水分の吸収が正常に行われなかったり、腸管がその内容物を送り  
1505 出す運動に異常が生じると、便秘や軟便、下痢といった症状が現れる。

1506 水分の吸収は大半が小腸で行われ、大腸では腸内容物が糞便となる過程で適切な水分量に調整  
1507 がなされるが、糞便には、腸内細菌の活動によって生じる物質や腸内細菌自体及びその死骸が多  
1508 く含まれ、それらも便通や糞便の質に影響を与える。

<sup>ciii</sup> 胃の一部が横隔膜の上に飛び出して、胃液が食道に逆流しやすくなる状態。

<sup>civ</sup> 胃液の分泌を過度に高めることがある。

1509 腸の働きは自律神経系により制御されており、異常を生じる要因は腸自体やその内容物による  
1510 ものだけでなく、腸以外の病気等が自律神経系を介して腸の働きに異常を生じさせる場合もある。

1511 下痢が起こる主な要因としては、急性の下痢では、体の冷えや消化不良、細菌やウイルス等の  
1512 消化器感染（食中毒など）、緊張等の精神的なストレスによるものがあり、慢性の下痢については、  
1513 腸自体に病変を生じている可能性がある。便秘が起こる主な要因としては、一過性の便秘では、  
1514 環境変化等のストレスや医薬品の副作用などがあり、慢性の便秘については、加齢や病気による  
1515 腸の働きの低下、便意を繰り返し我慢し続けること等による腸管の感受性の低下などがある。ま  
1516 た、これらの要因が重なり合って、便秘と下痢が繰り返し現れる場合もある。

1517 整腸薬は、腸の調子や便通を整える（整腸）、腹部膨満感、軟便、便秘に用いられることを目的  
1518 とする医薬品であり、その配合成分としては、腸内細菌の数やバランスに影響を与えたり、腸の  
1519 活動を促す成分が主として用いられる。

1520 止瀉薬は、下痢、食あたり、吐き下し、水あたり、下り腹、軟便等に用いられること（止瀉。瀉  
1521 はお腹を下す意味。）を目的とする医薬品であり、その配合成分としては、腸やその機能に直接働  
1522 きかけるもののほか、腸管内の環境を整えて腸に対する悪影響を減らすことによる効果を期待す  
1523 るものもある。

1524 瀉下薬（下剤）は、便秘症状及び便秘に伴う肌荒れ、頭重、のぼせ、吹き出物、食欲不振、腹部  
1525 膨満、腸内異常発酵、痔の症状の緩和、又は腸内容物の排除に用いられること（瀉下）を目的と  
1526 する医薬品であり、その配合成分としては、腸管を直接刺激するもの、腸内細菌の働きによって  
1527 生成した物質が腸管を刺激するもの、糞便のかさや水分量を増すもの等がある。

1528 整腸薬、瀉下薬では、医薬部外品として製造販売されている製品もあるが、それらは人体に対  
1529 する作用が緩和なものとして、配合できる成分（瀉下薬については、糞便のかさや水分量を増す  
1530 ことにより作用する成分に限られる。）やその上限量が定められている。また、効能・効果の範囲  
1531 も限定され、例えば、下痢・便秘の繰り返し等の場合における整腸については、医薬品において  
1532 のみ認められている。

1533

## 1534 2) 代表的な配合成分等、主な副作用

### 1535 (a) 整腸成分

1536 腸内細菌のバランスを整えることを目的として、ビフィズス菌、アシドフィルス菌、ラク  
1537 トミン、乳酸菌、酪酸菌等の生菌成分が用いられる。

1538 ケツメイシ（マメ科のエビスグサ又は *Cassia tora* Linné カッシア・トーラの種子を基原と  
1539 する生薬）、ゲンノショウコ（フウロソウ科のゲンノショウコの地上部を基原とする生薬）、  
1540 アセンヤク（アカネ科の *Uncaria gambir* Roxburgh ガンビールの葉及び若枝から得た水製乾  
1541 燥エキスを基原とする生薬）等の生薬成分が、整腸作用を期待して配合されている場合もあ  
1542 る。日本薬局方収載のケツメイシ、ゲンノショウコについては、煎薬として整腸（便通を整

1543 える。)、腹部膨満感等に用いられる。

1544 【トリメブチンマレイン酸塩】 消化管（胃及び腸）の平滑筋に直接作用して、消化管の運動  
1545 を調整する作用（消化管運動が低下しているときは亢進的に、運動が亢進しているときは抑  
1546 制的に働く。）があるとされる。

1547 まれに重篤な副作用として肝機能障害を生じることがある。肝臓病の診断を受けた人では、  
1548 使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相  
1549 談がなされるべきである。

1550 (b) 止瀉成分

1551 ① 収斂成分

1552 腸粘膜のタンパク質と結合して不溶性の膜を形成し、腸粘膜をひきしめる（収斂）こと  
1553 により、腸粘膜を保護することを目的として、次没食子酸ビスマス、次硝酸ビスマス等の  
1554 ビスマスを含む成分、タンニン酸アルブミン等が配合されている場合がある。タンニン酸  
1555 アルブミンに含まれるタンニン酸やその類似の物質を含む生薬成分としてゴバイシ（ウル  
1556 シ科のヌルデの若芽や葉上にアブラムシ科のヌルデシロアブラムシが寄生し、その刺激に  
1557 よって葉上に生成したのう状虫こぶを基原とする生薬<sup>cv</sup>）、オウバク、オウレン等も用いら  
1558 れる。

1559 ビスマスを含む成分は収斂作用のほか、腸内で発生した有毒物質を分解する作用も持つ  
1560 とされる。オウバク、オウレンは、収斂作用のほか、抗菌作用、抗炎症作用も期待して用  
1561 えられる。

1562 収斂成分を主体とする止瀉薬については、細菌性の下痢や食中毒のときに使用して腸の  
1563 運動を鎮めると、かえって状態を悪化させるおそれがある。急性の激しい下痢又は腹痛・  
1564 腹部膨満・吐きけ等の症状を伴う人では、細菌性の下痢や食中毒が疑われるため、安易な  
1565 使用を避けることが望ましいとされている。

1566 次没食子酸ビスマス、次硝酸ビスマス等のビスマスを含む成分については、海外におい  
1567 て長期連用した場合に精神神経症状（不安、記憶力減退、注意力低下、頭痛等）が現れた  
1568 との報告があり、1週間以上継続して使用しないこととされている。アルコールと一緒に  
1569 摂取されると、循環血液中への移行が高まって精神神経症状を生じるおそれがあり、服用  
1570 時は飲酒を避ける必要がある。胃潰瘍や十二指腸潰瘍の診断を受けた人では、損傷した粘  
1571 膜からビスマスの吸収が高まるおそれがあるため、使用する前にその適否につき、治療を  
1572 行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。なお、循  
1573 環血液中に移行したビスマスは血液-胎盤関門を通過することが知られており、妊婦又は妊  
1574 娠していると思われる女性では使用を避けるべきである。

<sup>cv</sup> 葉に虫が寄生してこぶ状に膨らんだもの。ゴバイシはヌルデノミミフシアブラムシが寄生したものである。

1575 タンニン酸アルブミンについては、まれに重篤な副作用としてショック（アナフィラキ  
1576 シー）を生じることがある。タンニン酸アルブミンに含まれるアルブミンは、牛乳に含ま  
1577 れるタンパク質（カゼイン）から精製された成分であるため、牛乳にアレルギーがある人  
1578 では使用を避ける必要がある。

1579 ② ロペラミド塩酸塩

1580 ロペラミド塩酸塩が配合された止瀉薬は、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによ  
1581 る下痢の症状に用いられることを目的としており、食あたりや水あたりによる下痢につい  
1582 ては適用対象でない。発熱を伴う下痢や、血便のある場合又は粘液便が続くような場合は、  
1583 本剤の適用対象でない可能性があり、症状の悪化、治療期間の延長を招くおそれがあるた  
1584 め、安易な使用は避けるべきである。なお、本成分を含む一般用医薬品では、15歳未満  
1585 の小児には適用がない<sup>evi</sup>。

1586 使用は短期間にとどめ、2～3日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師  
1587 の診療を受けるなどの対応が必要である。

1588 腸管の運動を低下させる作用を示し、胃腸鎮痛鎮痙薬との併用は避ける必要がある。ま  
1589 た、水分や電解質の分泌も抑える作用もあるとされる。効き目が強すぎて便秘が現れるこ  
1590 とがあり、まれに重篤な副作用としてイレウス様症状を生じることがある。便秘を避けな  
1591 ければならない肛門疾患がある人では、使用を避けるべきである。

1592 このほか重篤な副作用として、まれにショック（アナフィラキシー）、皮膚粘膜眼症候群、  
1593 中毒性表皮壊死融解症を生じることがある。

1594 中枢神経系を抑制する作用もあり、副作用としてめまいや眠気が現れることがあるため、  
1595 乗物又は機械類の運転操作を避ける必要がある。また、中枢抑制作用が増強するおそれ  
1596 あるため、服用時は飲酒しないこととされている。

1597 吸収された成分の一部が乳汁中に移行することが知られており、母乳を与える女性では  
1598 使用を避けるか、又は使用期間中の授乳を避けるべきである。

1599 ③ 腸内殺菌成分

1600 細菌感染による下痢の症状を鎮めることを目的として、ベルベリン塩化物、タンニン酸  
1601 ベルベリン、アクリノール、~~木クレオソート<sup>evii</sup>~~等が用いられる。これらは、通常の腸管内  
1602 に生息する腸内細菌に対しても抗菌作用を示すが、ブドウ球菌や大腸菌などに対する抗菌  
1603 作用の方が優位であることと、下痢状態では腸内細菌のバランスが乱れている場合が多い  
1604 ため、結果的に腸内細菌のバランスを正常に近づけることにつながると考えられている。

1605 しかしながら、腸内殺菌成分の入った止瀉薬を、下痢の予防で服用したり、症状が治ま

<sup>evi</sup> 外国で乳幼児が過量摂取した場合に、中枢神経系障害、呼吸抑制、腸管壊死に至る麻痺性イレウスを起こしたとの報告がある。

<sup>evii</sup> クレオソートのうち、医薬品として使用されるして使のは木材を原料とする木クレオソートである。石炭を原料とする石炭クレオソートは発がん性のおそれがあり、医薬品としては使用できない。

1606 ったのに漫然と服用したりすると、腸内細菌のバランスを崩し、腸内環境を悪化させるこ  
 1607 ともあるので、あくまで下痢の症状がある時、その症状を改善する必要のある間のみの服  
 1608 用にとどめるべきである。

1609 ベルベリン塩化物、タンニン酸ベルベリンに含まれるベルベリンは、生薬のオウバクや  
 1610 オウレンの中に存在する物質のひとつであり、抗菌作用のほか、抗炎症作用も併せ持つと  
 1611 される。オウバクのエキス製剤は、苦味による健胃作用よりも、ベルベリンによる止瀉作  
 1612 用を期待して、消化不良による下痢、食あたり、吐き下し、水あたり、下り腹、軟便等の症  
 1613 状に用いられる。

1614 タンニン酸ベルベリンは、タンニン酸（収斂作用）とベルベリン（抗菌作用）の化合物  
 1615 であり、消化管内ではタンニン酸とベルベリンに分かれて、それぞれ止瀉に働くことを期  
 1616 待して用いられる。

1617 ~~木クレオソートについては、殺菌作用のほか、局所麻酔作用もあるとされる。また、過~~  
 1618 ~~剰な腸管の（蠕動）運動を正常化し、あわせて水分や電解質の分泌も抑える止瀉作用もあ~~  
 1619 ~~る。局所麻酔作用に関する注意等の出題についてはⅢ－3（胃腸鎮痛鎮痙薬）を参照して~~  
 1620 ~~作成のこと。~~

#### 1621 ④ 吸着成分

1622 腸管内の異常発酵等によって生じた有害な物質を吸着させることを目的として、炭酸カ  
 1623 ルシウム、沈降炭酸カルシウム、乳酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、天然ケイ酸ア  
 1624 ルミニウム、ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム等が配合されている場合がある。同様の  
 1625 作用を期待して、カオリンや薬用炭などの生薬成分も用いられる。

1626 アルミニウムを含む成分に共通する留意点に関する出題については、Ⅲ－1（胃の薬）  
 1627 を参照して作成のこと。

#### 1628 ⑤ 生薬成分

1629 木クレオソート<sup>cviii</sup>は、過剰な腸管の（蠕動）運動を正常化し、あわせて水分や電解質の  
 1630 分泌も抑える止瀉作用がある。また、歯に使用の場合、局所麻酔作用もあるとされる。局  
 1631 所麻酔作用に関する注意等の出題についてはⅢ－3（胃腸鎮痛鎮痙薬）を参照して作成の  
 1632 こと。

#### 1633 (c) 瀉下成分

##### 1634 ① 刺激性瀉下成分

1635 腸管を刺激して反射的な腸の運動を引き起こすことによる瀉下作用を目的として配合さ  
 1636 れる成分である。刺激性瀉下成分が配合された瀉下薬については、大量に使用することは  
 1637 避けることとされている（腸管粘膜への刺激が大きくなり、激しい腹痛や腸管粘膜に炎症

<sup>cviii</sup> クレオソートのうち、医薬品として使用されるのは木材を原料とする木クレオソートである。石炭を原料とする石炭クレオソートは発がん性のおそれがあり、医薬品としては使用できない。

1638 を引き起こすおそれがある）。

1639 i) 小腸刺激性瀉下成分

1640 ヒマシ油は、ヒマシ（トウダイグサ科のトウゴマの種子）を圧搾して得られた脂肪  
1641 油を用いた生薬で、小腸でリパーゼの働きによって生じる分解物が、小腸を刺激する  
1642 ことで瀉下作用をもたらすと考えられている。

1643 日本薬局方収載のヒマシ油及び加香ヒマシ油は、腸内容物の急速な排除を目的とし  
1644 て用いられる。急激で強い瀉下作用（峻下作用）を示すため、激しい腹痛又は悪心・  
1645 嘔吐の症状がある人、妊婦又は妊娠していると思われる女性、3歳未満の乳幼児では  
1646 使用を避けることとされている。

1647 主に誤食・誤飲等による中毒の場合など、腸管内の物質をすみやかに体外に排除さ  
1648 せなければならない場合に用いられるが、防虫剤や殺鼠剤を誤って飲み込んだ場合の  
1649 ような脂溶性の物質による中毒には使用を避ける必要がある（ナフタレンやリン等が  
1650 ヒマシ油に溶解して、中毒症状を増悪させるおそれがある）。

1651 吸収された成分の一部が乳汁中に移行して、乳児に下痢を引き起こすおそれがあり、  
1652 母乳を与える女性では使用を避けるか、又は使用期間中の授乳を避ける必要がある。

1653 ii) 大腸刺激性瀉下成分

1654 大腸を刺激して排便を促すことを目的として、センナ（マメ科の *Cassia*  
1655 *angustifolia* Vahl 又は *Cassia acutifolia* Delile チンネベリセンナ又はアレキサ  
1656 シンドリアセンナの小葉を基原とする生薬）、センナから抽出された成分であるセンノシ  
1657 ド、ダイオウ（タデ科の *Rheum palmatum* Linné、*Rheum tanguticum* Maximowicz、*Rheum*  
1658 *officinale* Baillon、*Rheum coreanum* Nakai ショウヨウダイオウ、タンゲートダイオ  
1659 ウ、ダイオウ、チョウセンダイオウ又はそれらの種間雑種の、通例、根茎を基原とす  
1660 る生薬）、カサントラノール、ビスコジル、ピコスルファートナトリウム等が用いられ  
1661 る。

1662 このほか、大腸刺激による瀉下作用を期待して、センノシドに類似の物質を含むア  
1663 ロエ（ユリ科の *Aloe ferox* Miller 又はこれと *Aloe africana* Miller 又は *Aloe spicata*  
1664 *Baker* との種間雑種ケープアロエ等の葉から得た液汁<sup>cix</sup>を乾燥したものを基原とする  
1665 生薬）や、ジュウヤク（ドクダミ科のドクダミの花期の地上部を基原とする生薬）、ケ  
1666 ンゴシ（ヒルガオ科のアサガオの種子を基原とする生薬）等の生薬成分が配合されて  
1667 いる場合もある。

1668 刺激性瀉下成分が配合された瀉下薬は一般に、腸の急激な動きに刺激されて流産・  
1669 早産を誘発するおそれがある。特に、センナ及びセンノシドが配合された瀉下薬につ

<sup>cix</sup> 観葉植物として栽培されるキダチアロエや食用に用いられるアロエ・ベラは、生薬であるアロエの基原植物とは別種である。

1670 いては、妊婦又は妊娠していると思われる女性では、使用を避けるべきである。

1671 センナ、センノシド、ダイオウ、~~カサントラノール~~については、吸収された成分の  
1672 一部が乳汁中に移行することが知られている。乳児に下痢を生じるおそれがあり、母  
1673 乳を与える女性では使用を避けるか、又は使用期間中の授乳を避ける必要がある。構  
1674 成生薬にダイオウを含む漢方処方製剤においても、同様に、母乳を与える女性では使  
1675 用を避けるか、又は使用期間中の授乳を避けることとされている。

1676 【センナ、センノシド、ダイオウ】 センナ中に存在するセンノシドは、胃や小腸で消  
1677 化されないが、大腸に生息する腸内細菌によって分解され、分解生成物が大腸を刺激  
1678 して瀉下作用をもたらすと考えられている。センノシドカルシウム等として配合され  
1679 ている場合もある。

1680 ダイオウもセンナと同様、センノシドを含み、大腸刺激性瀉下成分として用いられ  
1681 る。

1682 ダイオウは各種の漢方処方の構成生薬としても重要であるが、瀉下を目的としない  
1683 場合には瀉下作用は副作用となる。構成生薬にダイオウを含む漢方処方製剤では、瀉  
1684 下作用の増強を生じて、腹痛、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすくなるた  
1685 め、瀉下薬の併用に注意する必要がある。

1686 【ビサコジル、ピコスルファートナトリウム】 ビサコジルは、大腸のうち特に結腸や  
1687 直腸の粘膜を刺激して、排便を促すと考えられている。また、結腸での水分の吸収を  
1688 抑えて、糞便のかさを増大させる働きもあるとされる。内服薬のほか、浣腸薬（坐剤）  
1689 としても用いられるが、その場合の出題についてはⅢ－4（その他の消化器官用薬）  
1690 を参照して作成のこと。内服薬では、胃内で分解されて効果が低下したり、胃粘膜に  
1691 無用な刺激をもたらすのを避けるため、腸内で溶けるように錠剤がコーティング等さ  
1692 れている製品（腸溶性製剤）が多い。腸溶性製剤の場合、胃内でビサコジルが溶け出  
1693 すおそれがあるため、服用前後1時間以内は制酸成分を含む胃腸薬の服用や牛乳の摂  
1694 取を避けることとされている。

1695 ピコスルファートナトリウムは、胃や小腸では分解されないが、大腸に生息する腸  
1696 内細菌によって分解されて、大腸への刺激作用を示すようになる。

1697  
1698 大腸刺激性瀉下成分配合の瀉下止瀉薬は、服用してから数時間後に効果のあるもの  
1699 が多いので、就寝前に服用して起床時に効果を求めると、排便のリズムも付きやすい。  
1700 ただ、毎日漫然と同じ瀉下止瀉薬を連続して服用していると、腸の運動が緩慢になり、  
1701 服用する薬の量を増やさないと効果が出なくなることが多い。大腸刺激性瀉下成分配  
1702 合の瀉下止瀉薬は、便秘時の頓服として使用すべきで、毎日の排便が滞るような時は、  
1703 無機塩類や膨潤性瀉下成分の製剤を使用する、ビフィズス菌や乳酸菌などの整腸成

分の製剤を並行して使用する、食物繊維を積極的に摂るなど、大腸刺激性瀉下成分のみに依存しない方法を指導することが必要である。

② 無機塩類

腸内容物の浸透圧を高めること<sup>cx</sup>で糞便中の水分量を増し、また、大腸を刺激して排便を促すことを目的として、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、硫酸マグネシウム等のマグネシウムを含む成分が配合されている場合がある。また、同様な目的で硫酸ナトリウムも用いられる。

マグネシウムを含む成分は、一般に消化管からの吸収は少ないとされているが、一部は腸で吸収されて尿中に排泄<sup>せつ</sup>されることが知られている。腎臓病の診断を受けた人では、高マグネシウム血症<sup>cx</sup>を生じるおそれがあり、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

硫酸ナトリウムについては、血液中の電解質のバランスが損なわれ、心臓の負担が増加し、心臓病を悪化させるおそれがある。心臓病の診断を受けた人では、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

③ 膨潤性瀉下成分

腸管内で水分を吸収して腸内容物に浸透し、糞便のかさを増やすとともに糞便を柔らかくすることによる瀉下作用を目的として、カルメロースナトリウム（別名カルボキシメチルセルロースナトリウム）、カルメロースカルシウム（別名カルボキシメチルセルロースカルシウム）が配合されている場合がある。同様な作用を期待して、プラントゴ・オバタ（プラントゴ・オバタ（オオバコ科））の種子又は種皮のような生薬成分も用いられる。

膨潤性瀉下成分が配合された瀉下薬については、その効果を高めるため、使用と併せて十分な水分摂取がなされることが重要である。

④ ジオクチルソジウムスルホサクシネート（DSS）

腸内容物に水分が浸透しやすくする作用があり、糞便中の水分量を増して柔らかくすることによる瀉下作用を期待して用いられる。

⑤ マルツエキス

主成分である麦芽糖が腸内細菌によって分解（発酵）して生じるガスによって便通を促すとされている。瀉下薬としては比較的作用が穏やかなため、主に乳幼児の便秘に用いられる。なお、乳児の便秘は母乳不足又は調整乳希釈方法の誤りによって起こることもある

<sup>cx</sup> 水分の移動は濃度の低い方から濃度の高い方に動き、この水分の移動に伴う圧力差を浸透圧という。腸管における腸内容物からの水分の吸収は浸透圧の差を利用しているため、腸内容物の塩分濃度を高めることで、水分の吸収が妨げられる。

<sup>cx</sup> 血液中のマグネシウム濃度が異常に高くなり、脱力感、低血圧、呼吸障害などが現れる。重症の場合には、心停止が起こることもある。



1735 が、水分不足に起因する便秘にはマルツエキスの効果は期待できない。

1736 マルツエキスは麦芽糖を60%以上含んでおり水飴状で甘く、乳幼児の発育不良時の栄  
1737 養補給にも用いられる。

1738

1739 ● 漢方処方製剤

1740 腸の不調を改善する目的で用いられる漢方処方製剤としては、桂枝加芍薬湯、大黃甘草湯、大  
1741 黄牡丹皮湯、麻子仁丸等がある。

1742 これらのうち、桂枝加芍薬湯及び大黃甘草湯は、構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを  
1743 含有する医薬品に共通する留意点に関する出題については、Ⅱ-1（咳止め・痰を出しやすくす  
1744 る薬）を参照して作成のこと。また、大黃甘草湯、大黃牡丹皮湯及び麻子仁丸は、構成生薬として  
1745 ダイオウを含む。ダイオウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題については、(c) ①-  
1746 ii) を参照して作成のこと。

1747 ① 桂枝加芍薬湯

1748 体力中等度以下で、腹部膨満感のあるもの<sup>cxii</sup>のしぶり腹<sup>cxii</sup>、腹痛、下痢、便秘に適すとされる。

1749 短期間の使用に限られるものでないが、1週間位服用して症状の改善がみられない場合に  
1750 は、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの対応が必要である。

1751 ② 大黃甘草湯

1752 体力に関わらず使用できる。広く応用され、便秘、便秘に伴う頭重、のぼせ、湿疹・皮膚  
1753 炎、ふきでもの（にきび）、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔などの症状の  
1754 緩和に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱く下痢  
1755 しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。また、  
1756 本剤を使用している間は、他の瀉下薬の使用を避ける必要がある。

1757 短期間の使用に限られるものでないが、5～6日間服用しても症状の改善がみられない場  
1758 合には、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるべきである。

1759 ③ 大黃牡丹皮湯

1760 体力中等度以上で、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの月経不順、月経困難、月経痛、  
1761 便秘、痔疾に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱  
1762 く下痢しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。  
1763 また、本剤を使用している間は、他の瀉下薬の使用を避ける必要がある。

1764 便秘、痔疾に対して用いる場合には、1週間位服用しても症状の改善がみられないときは、  
1765 いったん使用を中止して専門家に相談がなされるべきである。

1766 月経不順、月経困難に対して用いる場合には、比較的長期間（1ヶ月位）服用されること

<sup>cxii</sup> 残便感があり、繰り返し腹痛を伴い便意を催すもの。

1767 があり、その場合に共通する留意点に関する出題については、XIV-1（漢方処方製剤）を  
1768 参照して作成のこと。

1769 ④ 麻子仁丸

1770 体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの便秘、便秘に伴う頭重、のぼせ、湿疹・  
1771 皮膚炎、ふきでもの（にきび）、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔などの症  
1772 状の緩和に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副  
1773 作用が現れやすい等、不向きとされる。また、本剤を使用している間は、他の瀉下薬の使用  
1774 を避ける必要がある。

1775 短期間の使用に限られるものでないが、5～6日間服用しても症状の改善がみられない場  
1776 合には、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるべきである。

1777

1778 3) 相互作用、受診勧奨

1779 【相互作用】 医薬品の成分の中には副作用として便秘や下痢を生じるものがあり、止瀉薬や瀉  
1780 下薬と一緒にそうした成分を含有する医薬品が併用された場合、作用が強くなり、副作用  
1781 を生じやすくなるおそれがある。

1782 逆に、整腸薬や止瀉薬、瀉下薬が他の医薬品の有効性や安全性に影響を及ぼすこともある。  
1783 例えば、駆虫薬は駆除した寄生虫の排出を促すため瀉下薬が併用されることがあるが、ヒマシ  
1784 油を使用した場合には、駆虫成分が腸管内にとどまらず吸収されやすくなり、全身性の副作用  
1785 を生じる危険性が高まるため、ヒマシ油と駆虫薬の併用は避けることとされている。

1786 整腸薬と止瀉薬は、いずれも効能・効果に軟便が含まれていることがあるが、生菌成分が配  
1787 合された整腸薬に、腸内殺菌成分が配合された止瀉薬が併用された場合、生菌成分の働きが腸  
1788 内殺菌成分によって弱められる。

1789 瀉下薬については、複数の瀉下薬を併用すると、激しい腹痛を伴う下痢や下痢に伴う脱水症  
1790 状等を生じるおそれがあり、どのような種類の瀉下成分を含有するものであっても、瀉下薬を  
1791 使用している間は、他の瀉下薬の使用を避けることとされている。

1792 また、食品にも緩下作用（緩和な瀉下作用）を示すものがあり、そうした食品との相互作用  
1793 についても留意されるべきである。例えば、センナの茎を用いた製品は、医薬品的な効能効果  
1794 が標榜又は暗示されていなければ食品として流通することが可能となっているが、ときに微量  
1795 のセンノシドが含まれる場合があることが知られており、「医薬品でないから大丈夫」とと安易に  
1796 考えて瀉下薬と同時期に摂取された場合、複数の瀉下薬を併用した場合と同様な健康被害につ  
1797 ながるおそれがある。

1798 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な事項につい  
1799 ては、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

1800

1801 【受診勧奨】 一般用医薬品の使用はあくまで対症療法であり、下痢や便秘を引き起こした原因  
1802 の特定やその解消が図られることが、一般用医薬品の適正な使用を確保する上で重要である。

1803 医薬品の副作用として下痢や便秘が現れることもあり<sup>cxiii</sup>、医薬品の使用中に原因が明確でない  
1804 下痢や便秘を生じた場合は、安易に止瀉薬や瀉下薬によって症状を抑えようとせず、その医  
1805 薬品の使用を中止して、医師や薬剤師などの専門家に相談するよう説明がなされるべきである。

1806 下痢、便秘のいずれに関しても、一般用医薬品により対処を図ることが適当であるか、適切  
1807 な判断がなされることが重要である。過敏性腸症候群<sup>cxiv</sup>の便通障害のように下痢と便秘が繰り返  
1808 返し現れるものもあり、症状が長引くような場合には、医師の診療を受けるなどの対応が必要  
1809 である。

1810 下痢は、腸管内の有害な物質を排出するために起こる防御反応でもあり、止瀉薬によって下  
1811 痢を止めることでかえって症状の悪化を招くことがある。また、下痢に伴って脱水症状を招き  
1812 やすいため、下痢への対処においては水分・電解質の補給も重要である。

1813 下痢に発熱を伴う場合は、食中毒菌等による腸内感染症の可能性があり、また、虫垂炎や虚  
1814 血性大腸炎<sup>cxv</sup>のような重大な疾患に起因する場合もある。便に血が混じっている場合は、赤痢  
1815 や腸管出血性大腸菌（O157等）、潰瘍性大腸炎、大腸癌<sup>がん</sup>などによる腸管出血の可能性もある。  
1816 粘液便が続いているような場合には、腸の炎症性疾患の可能性もある。いずれも、安易に止瀉  
1817 薬を用いて症状を一時的に鎮めようとするのではなく、早期に医療機関を受診して原因の特定、  
1818 治療がなされるべきである。

1819 便秘については、便秘になりやすい食生活等の生活習慣の改善が図られることが重要であり、  
1820 瀉下薬の使用は一時的なものにとどめることが望ましい。特に、刺激性瀉下成分を主体とする  
1821 瀉下薬は、繰り返し使用されると腸管の感受性が低下して効果が弱くなるため、常用を避ける  
1822 必要がある。瀉下薬が手放せなくなっているような慢性の便秘については、漫然と継続使用す  
1823 るよりも、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

1824 腹痛は便秘の時にしばしば起こる症状であるが、腹痛が著しい場合や便秘に伴って吐きけや  
1825 嘔吐<sup>おう</sup>が現れた場合には、急性腹症（腸管の狭窄<sup>ま</sup>、閉塞<sup>く</sup>、腹腔内器官の炎症等）の可能性もある。  
1826 瀉下薬の配合成分の刺激によってその症状を悪化させるおそれがあり、安易に瀉下薬を使用せ  
1827 ずに医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

1828

cxiii 胃腸薬の副作用として下痢や便秘が現れることもある。

cxiv 腸管の組織自体に形態的な異常はないにもかかわらず、腸が正常に機能せず、腹痛や下痢・便秘などを生じる病気。

cxv 大腸への動脈血流が突然あるいは長期間に亘って妨げられたため起こる大腸粘膜やその内側の粘膜層の損傷で、損傷した大腸粘膜に潰瘍<sup>びらん</sup>（糜爛）を生じる。

1829 3 胃腸鎮痛鎮痙薬<sup>けい</sup>

## 1830 1) 代表的な鎮痙成分、症状を抑える仕組み、主な副作用

## 1831 (a) 抗コリン成分

1832 急な胃腸の痛みは、主として胃腸の過剰な動き（痙攣<sup>けいれん</sup>）によって生じる。消化管の運動は  
 1833 副交感神経系の刺激によって亢進<sup>こうしん</sup>し、また、副交感神経系は胃液分泌の亢進<sup>こうしん</sup>にも働く。その  
 1834 ため、副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンと受容体の反応を妨げることで、その働  
 1835 きを抑える成分（抗コリン成分）が、胃痛、腹痛、さしこみ（痙痛<sup>せん</sup><sup>cxvi</sup>、癢<sup>しやく</sup><sup>cxvii</sup>）を鎮めるこ  
 1836 と（鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>）のほか、胃酸過多や胸やけに対する効果も期待して用いられる。

1837 胃腸鎮痛鎮痙薬に配合される抗コリン成分としては、メチルベナクチジウム臭化物、ブチ  
 1838 ルスコポラミン臭化物、メチルオクタトロピン臭化物、ジサイクロミン塩酸塩、オキシフェ  
 1839 ンサイクリミン塩酸塩、チキジウム臭化物等がある。抗コリン作用を示すアルカロイド<sup>cxviii</sup>を  
 1840 豊富に含む生薬成分として、~~ロートエキス（ロートコン（ナス科のハシリドコロ又はチョウ~~  
 1841 ~~センハシリドコロの根茎及び根を基原とする生薬）の抽出物~~<sup>が用いられることも多い。</sup>

1842 これらの成分が副交感神経系の働きを抑える作用は消化管に限定されないため、散瞳によ  
 1843 る目のかすみや異常な眩<sup>まぶ</sup>しさ、顔のほてり、頭痛、眠気、口渇、便秘、排尿困難等の副作用が  
 1844 現れることがある。重大な事故につながるおそれがあるため、抗コリン成分が配合された医  
 1845 薬品を使用した後は、乗物又は機械類の運転操作を避ける必要がある。また、排尿困難の症  
 1846 状がある人、心臓病又は緑内障の診断を受けた人では、症状の悪化を招くおそれがあり、使  
 1847 用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談  
 1848 がなされるべきである。高齢者では、排尿困難や緑内障の基礎疾患を持つ場合が多く、また、  
 1849 一般的に口渇や便秘の副作用が現れやすいので、使用する前にその適否を十分考慮し、使用  
 1850 する場合にはそれらの初期症状等に常に留意する等、慎重な使用がなされることが重要であ  
 1851 る。

1852 ブチルスコポラミン臭化物については、まれに重篤な副作用としてショック（アナフィラ  
 1853 キシー）を生じることが知られている。

1854 ロートエキスについては、吸収された成分の一部が母乳中に移行して乳児の脈が速くなる  
 1855 （頻脈）おそれがあるため、母乳を与える女性では使用を避けるか、又は使用期間中の授乳  
 1856 を避ける必要がある。なお、ロートエキスにより母乳が出にくくなることもある。

1857 メチルオクタトロピン臭化物についても、吸収された成分の一部が母乳中に移行すること  
 1858 が知られている。

## 1859 (b) パパベリン塩酸塩

cxvi 発作性の間欠的な痛み。

cxvii 胸部や腹部に生じる激しい痛みの通俗的な総称。

cxviii 主に植物由来のアルカリ性化合物の総称。（一部、中性や弱酸性を示すものもある。）

1860 消化管の平滑筋に直接働いて胃腸の痙攣<sup>けいれん</sup>を鎮める作用を示すとされる。抗コリン成分と異  
1861 なり、胃液分泌を抑える作用は見出されない。

1862 抗コリン成分と異なり自律神経系を介した作用ではないが、眼圧を上昇させる作用を示す  
1863 ことが知られている。緑内障の診断を受けた人では、症状の悪化を招くおそれがあり、使用  
1864 する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談が  
1865 なされるべきである。

1866 (c) 局所麻酔成分

1867 消化管の粘膜及び平滑筋に対する麻酔作用による鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>の効果を期待して、アミノ安息  
1868 香酸エチル、オキセサゼインのような局所麻酔成分が配合されている場合がある。

1869 いずれも痛みが感じにくくなることで重大な消化器疾患や状態の悪化等を見過ごすおそれ  
1870 があり、長期間にわたって漫然と使用することは避けることとされている。

1871 アミノ安息香酸エチルについては、メトヘモグロビン血症<sup>cxix</sup>を起こすおそれがあるため、  
1872 6歳未満の小児への使用は避ける必要がある。外用薬の有効成分としても用いられるが、そ  
1873 の場合に関する出題については、V-1（痔<sup>じ</sup>の薬）を参照して作成のこと。

1874 オキセサゼインについては、局所麻酔作用のほか、胃液分泌を抑える作用もあるとされ、  
1875 胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬と制酸薬の両方の目的で使用される。精神神経系の副作用として、頭痛、眠  
1876 気、めまい、脱力感が現れることがある。妊娠中や小児における安全性は確立されておらず、  
1877 妊婦又は妊娠していると思われる女性、15歳未満の小児では、使用を避けることとされて  
1878 いる。

1879 (d) 生薬成分

1880 鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>作用を期待して、エンゴサク（ケシ科の [Corydalis turtschaninovii Besser forma](#)  
1881 [yanhusuo Y. H. Chou et C. C. Hsu](#) エンゴサクの塊茎を、通例、湯通ししたものを基原とす  
1882 る生薬）、シャクヤク（I-2（解熱鎮痛薬）参照。）等が配合されている場合がある。

1883

1884 2) 相互作用、受診勧奨

1885 【相互作用】 胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬に配合されている成分は、胃腸以外に対する作用も示すものがほ  
1886 とんどであり、複数の胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬が併用された場合、泌尿器系や循環器系、精神神経系な  
1887 どに対する作用（副作用）が現れやすくなるため、胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬を使用している間は、他の  
1888 胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬の使用を避けることとされている。

1889 抗コリン成分については、胃腸鎮痛鎮痙<sup>けい</sup>薬以外の医薬品（かぜ薬、乗物酔い防止薬、鼻炎用  
1890 内服薬等）にも配合されている場合があり、また、一部の抗ヒスタミン成分のように抗コリン

<sup>cxix</sup> 赤血球中のヘモグロビンの一部がメトヘモグロビンに変化して、赤血球の酸素運搬能力が低下し、貧血症状を呈する病  
気。正常な赤血球では、メトヘモグロビンの割合はヘモグロビン全体の1%以下に維持されているが、メトヘモグロビン血  
症では10%以上になる。

1891 作用を併せ持つものが配合されている場合（かぜ薬、睡眠改善薬、乗物酔い防止薬、鎮咳去痰  
1892 薬、アレルギー用薬等）もある。抗コリン作用を有する成分を含有する医薬品どうしが併用さ  
1893 れた場合、抗コリン作用が増強され、排尿困難、目のかすみや異常な眩しさ、頭痛、眠気、口  
1894 渇、便秘等の副作用が現れやすくなる。

1895

1896 【受診勧奨】 痛みが次第に強くなる、痛みが周期的に現れる、嘔吐や発熱を伴う、下痢や血便・  
1897 血尿を伴う、原因不明の痛みが30分以上続く等の場合には、基本的に医療機関を受診するな  
1898 どの対応が必要である。その際、医師の診療を受けるまでの当座の対処として一般用医薬品が  
1899 使用されると、痛みの発生部位が不明確となり、原因の特定を困難にすることがあるので、原  
1900 因不明の腹痛に安易に胃腸鎮痛鎮痙薬を使用することは好ましくない。

1901 腹部の痛みは必ずしも胃腸に生じたものとは限らず、月経困難症、胆嚢炎、胆管炎、胆石症、  
1902 急性膵炎などのように、胃腸以外の臓器に起因する場合がある。血尿を伴って側腹部に痛みが  
1903 生じた時は、腎臓や尿路の病気が疑われる。これらについて胃腸鎮痛鎮痙薬を使用することは  
1904 適当でない。

1905 また、下痢に伴う腹痛については、基本的に下痢への対処が優先され、胃腸鎮痛鎮痙薬の適  
1906 用となる症状でない。下痢を伴わずに腹部に痛みを生じる病気としては、上記のような胃腸以  
1907 外の臓器に起因するもののほか、腸閉塞（イレウス）、アニサキス症<sup>cxx</sup>などがある。

1908 小児では、内臓に異常がないにもかかわらず、へその周りに激しい痛み（ときに吐きけを伴  
1909 う）が繰り返し現れることがあり（反復性臍疝痛）、精神的なストレスによる自律神経系の乱れ  
1910 が主な原因と考えられている。数時間以内に自然寛解する場合が多いが、長時間頻回に腹痛を  
1911 訴えるような場合には、医療機関に連れて行くなどの対応が必要である。

1912

#### 1913 4 その他の消化器用薬

##### 1914 1) 浣腸薬

1915 浣腸薬は、便秘の場合に排便を促すことを目的として、直腸内に適用される医薬品である。剤  
1916 形には注入剤（肛門から薬液を注入するもの）のほか、坐剤となっているものもある<sup>cxxi</sup>。

1917 繰り返し使用すると直腸の感受性の低下（いわゆる慣れ）が生じて効果が弱くなり、医薬品の  
1918 使用に頼りがちになるため、連用しないこととされている。なお、便秘以外のときに直腸内容物  
1919 の排除を目的として用いることは適当でない。

1920 便秘については、瀉下薬と同様、便秘になりやすい食生活等の生活習慣の改善が図られること  
1921 が重要であり、浣腸薬の使用は一時的なものにとどめるべきである。特に乳幼児では、安易な使

<sup>cxx</sup> アニサキスは海洋動物を宿主とする寄生虫の一種で、魚の生食によりヒトの消化管に入り、胃腸粘膜に食い込んで腹痛（嘔吐を伴う）を引き起こす。

<sup>cxxi</sup> 一般に「浣腸薬」という場合には、注入剤として用いられるものを指すことが多い。

1922 用を避けることとされている。

1923 浣腸薬は一般に、直腸の急激な動きに刺激されて流産・早産を誘発するおそれがあるため、妊  
1924 婦又は妊娠していると思われる女性では使用を避けるべきである。

1925 腹痛が著しい場合や便秘に伴って吐きけや嘔吐が現れた場合には、急性腹症（腸管の狭窄、閉  
1926 塞、腹腔内器官の炎症等）の可能性があり、浣腸薬の配合成分の刺激によってその症状を悪化さ  
1927 せるおそれがある。また、排便時に出血を生じる場合は、痔出血のほか、直腸ポリープや直腸癌  
1928 等に伴う出血であることもあり、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

1929 (a) 注入剤

1930 【用法に関連した注意】 注入剤の用法に関連した注意事項に関する出題については、以下の  
1931 内容から作成のこと。

1932 ① 薬液の放出部を肛門に差し込み、薬液だまりの部分をつぶして、薬液を押し込むように注入  
1933 する。

1934 ② 注入するときはゆっくりと押し込み、注入が終わったら放出部をゆっくりと抜き取る。ま  
1935 た、注入する薬液は人肌程度に温めておくと、不快感を生じることが少ない。

1936 ③ 薬液を注入した後すぐに排便を試みると、薬液のみが排出されて効果が十分得られない  
1937 ことから、便意が強まるまでしばらく我慢する。薬液が漏れ出しそうな場合は肛門を脱脂  
1938 綿等で押さえておくとよい。

1939 ④ 半量等を使用する用法がある場合、残量を再利用すると感染のおそれがあるので使用後  
1940 は廃棄する。

1941 配合成分としては、浸透圧の差によって腸管壁から水分を取り込んで直腸粘膜を刺激し、  
1942 排便を促す効果を期待して、グリセリンやソルビトールが用いられる。直腸内の浸透圧変化  
1943 に伴って、使用時の体調によっては肛門部に熱感を生じることがある。また、肛門から異物  
1944 を注入する用法であることから、人によっては肛門部の不快感を生じることがある。

1945 グリセリンが配合された浣腸薬では、排便時に血圧低下を生じて、立ちくらみの症状が現  
1946 れるとの報告があり、そうした症状は体力の衰えている高齢者や心臓に基礎疾患がある人で  
1947 特に現れやすいため、高齢者又は心臓病の診断を受けた人では、使用する前にその適否につ  
1948 き、治療を行っている医師等に相談がなされるべきである。

1949 また、グリセリンが配合された浣腸薬が、肛門や直腸の粘膜に損傷があり出血している  
1950 きに使用されると、グリセリンが傷口から血管内に入って、赤血球の破壊（溶血）を引き起  
1951 こす、また、腎不全を起こすおそれがある。痔出血の症状がある人では、使用する前にその  
1952 適否につき、治療を行っている医師等に相談がなされるべきである。

1953 (b) 坐剤

1954 【用法に関連した注意】 坐剤の用法に関連した注意に関する出題については、以下の内容か  
1955 ら作成のこと。

1956 ① 柔らかい場合には、しばらく冷やした後を使用する。また、硬すぎる場合には、柔らかく  
1957 なった後に使用する。無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがある。

1958 ② 坐剤を挿入した後すぐに排便を試みると、坐剤が排出されて効果が十分得られないこと  
1959 から、便意が強まるまでしばらく我慢する。

1960 配合成分としては、ビサコジルのほか、炭酸水素ナトリウム等も用いられる。

1961 ビサコジルに関する出題については、Ⅲ－2（腸の薬）を参照して作成のこと。瀉下薬の  
1962 有効成分として内服でも用いられるが、誤って坐剤を服用することのないよう留意される必  
1963 要がある。

1964 炭酸水素ナトリウムは、直腸内で徐々に分解して炭酸ガスの微細な気泡を発生することで  
1965 直腸を刺激する作用を期待して用いられる。炭酸水素ナトリウムを主薬とする坐剤では、ま  
1966 れに重篤な副作用としてショックを生じることがある。

1967

## 1968 2) 駆虫薬

1969 駆虫薬は、腸管内の寄生虫に対して、これを駆除するために用いられる医薬品である。一般用  
1970 医薬品の駆虫薬が対象とする寄生虫は、回虫と蟯虫である<sup>cxxii</sup>。

1971 いずれも手指や食物に付着した虫卵が口から入ることで感染するが、回虫では、孵化した幼虫  
1972 が腸管壁から体組織に入り込んで体内を巡り、肺に達した後に気道から再び消化管内に入って成  
1973 虫となる。そのため腹痛や下痢、栄養障害等の消化器症状のほか、呼吸器等にも障害を引き起  
1974 すことがある。蟯虫は、肛門から這い出してその周囲に産卵するため、肛門部の痒みやそれに伴  
1975 う不眠、神経症を引き起こすことがある。

1976 駆虫薬は腸管内に生息する虫体にのみ作用し、虫卵や腸管内以外に潜伏した幼虫（回虫の場合）  
1977 には駆虫作用が及ばないため、それらが成虫となった頃にあらためて使用しないと完全に駆除で  
1978 きない。再度駆虫を必要とする場合には、1ヵ月以上間隔を置いてから使用することとされてい  
1979 る。なお、回虫や蟯虫の感染は、その感染経路から、通常、衣食を共にする家族全員にその可能  
1980 性があり、保健所等において虫卵検査を受けて感染が確認された場合には、一緒に駆虫を図るこ  
1981 とが基本となる。

1982 駆虫薬は、一度に多く服用しても駆虫効果が高まることはなく、かえって副作用が現れやす  
1983 くなるため、定められた1日の服用回数や服用期間を守って適正に使用されることが重要である。  
1984 同様に、複数の駆虫薬を併用しても駆虫効果が高まることはなく、副作用が現れやすくなり、ま  
1985 た、組合せによってはかえって駆虫作用が減弱することもある。

1986 駆虫薬はその有効成分（駆虫成分）が腸管内において薬効をもたらす局所作用を目的とする医  
1987 薬品であり、消化管からの駆虫成分の吸収は好ましくない全身作用（頭痛、めまい等の副作用）

<sup>cxxii</sup> 条虫（いわゆるサナダ虫など）や吸虫、鉤虫、旋毛虫、鞭虫等の駆除を目的とする一般用医薬品はない。これらについては、医療機関を受診して診療を受けるなどの対応が必要である。



1988 を生じる原因となるため、極力少ないことが望ましい。食事を摂って消化管内に内容物があると  
 1989 きに使用すると、消化管内容物の消化・吸収に伴って駆虫成分の吸収が高まることから、空腹時  
 1990 に使用することとされているものが多い。

1991 駆除した虫体や腸管内に残留する駆虫成分の排出を促すため瀉下薬が併用されることがあるが、  
 1992 ヒマシ油を使用すると腸管内で駆虫成分が吸収されやすくなり、副作用を生じる危険性が高まる  
 1993 ため、ヒマシ油との併用は避ける必要がある。

1994

1995 ● 代表的な駆虫成分、主な副作用

1996 (a) サントニン

1997 回虫の自発運動を抑える作用を示し、虫体を排便とともに排出させることを目的として用  
 1998 いられる。消化管から吸収されたサントニンは主に肝臓で代謝されるが、肝臓病の診断を受  
 1999 けた人では、肝機能障害を悪化させるおそれがあるため、使用する前にその適否につき、治  
 2000 療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

2001 服用後、一時的に物が黄色く見えたり、耳鳴り、口渇が現れることがある。

2002 (b) カイニン酸

2003 回虫に痙攣を起こさせる作用を示し、虫体を排便とともに排出させることを目的として用  
 2004 いられる。

2005 カイニン酸を含む生薬成分として、マクリ（フジマツモ科のマクリの全藻を基原とする生  
 2006 薬）が配合されている場合もある。日本薬局方収載のマクリは、煎薬として回虫の駆除に用  
 2007 いられる。

2008 (c) ピペラジンリン酸塩

2009 アセチルコリン伝達を妨げて、回虫及び蟯虫の運動筋を麻痺させる作用を示し、虫体を排  
 2010 便とともに排出させることを目的として用いられる。

2011 副作用として痙攣、倦怠感、眠気、食欲不振、下痢、便秘等が現れることがある。痙攣の症  
 2012 状のある人、貧血、著しい栄養障害の診断を受けた人では、それらの症状の悪化を招くおそ  
 2013 れがあるため、また、肝臓病、腎臓病の診断を受けた人では、吸収されて循環血液中に移行  
 2014 したピペラジンが滞留して副作用を生じやすくなるおそれがあるため、使用する前にその適  
 2015 否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきで  
 2016 ある。

2017 (d) パモ酸ピルビニウム

2018 蟯虫の呼吸や栄養分の代謝を抑えて殺虫作用を示すとされる。

2019 赤～赤褐色の成分で、尿や糞便が赤く着色することがある。水に溶けにくいいため消化管か  
 2020 らの吸収は少ないとされているが、ヒマシ油との併用は避ける必要がある。また、空腹時に  
 2021 服用することとなっていないが、同様の理由から、脂質分の多い食事やアルコール摂取は避

2022 けるべきである。

2023

#### 2024 IV 心臓などの器官や血液に作用する薬

##### 2025 1 強心薬

##### 2026 1) 動悸、息切れ等を生じる原因と強心薬の働き

##### 2027 (a) 動悸、息切れ、気つけ

2028 心臓は、血液を全身に循環させるポンプの働きを担っているが、通常、自律神経系によっ  
2029 て無意識のうちに調整がなされており、激しい運動をしたり、興奮したときなどの動悸や息  
2030 切れは、正常な健康状態でも現れる。

2031 体の不調による動悸、息切れは、日常生活の身体活動や平静にしているときに起こるもの  
2032 で、心臓の働きが低下して十分な血液を送り出せなくなり、脈拍数を増やすことによってそ  
2033 の不足を補おうとして動悸（心臓の拍動が強く若しくは速くなり、又は脈拍が乱れ、それが  
2034 不快に感じられる。）が起こる。また、心臓から十分な血液が送り出されないと体の各部への  
2035 酸素の供給が低下するため、呼吸運動によって取り込む空気の量を増やすことでそれを補お  
2036 うとして、息切れ（息をすると胸苦しさや不快感があり、意識的な呼吸運動を必要とする。）  
2037 が起こる。これらは睡眠不足や疲労による心臓の働きの低下のほか、不安やストレス等の精  
2038 神的な要因、また、女性では貧血や、更年期に生じるホルモンバランスの乱れなどによっ  
2039 て起こることがある。

2040 気つけとは、心臓の働きの低下による一時的なめまい、立ちくらみ等の症状に対して、意  
2041 識をはっきりさせたり、活力を回復させる効果のことである。

##### 2042 (b) 強心薬の働き

2043 強心薬は、疲労やストレス等による軽度の心臓の働きの乱れについて、心臓の働きを整え  
2044 て、動悸や息切れ等の症状の改善を目的とする医薬品である。心筋に作用して、その収縮力  
2045 を高めるとされる成分（強心成分）を主体として配合される。

2046

##### 2047 2) 代表的な配合成分等、主な副作用

##### 2048 (a) 強心成分

2049 心筋に直接刺激を与え、その収縮力を高める作用（強心作用）を期待して、センソ、ゴオ  
2050 ウ、ジャコウ、ロクジョウ等の生薬成分が用いられる。

##### 2051 ① センソ

2052 ヒキガエル科の**アジアシナ**ヒキガエル等の**耳毒腺**の分泌物を集めたものを基原とする生  
2053 薬で、微量で強い強心作用を示す。皮膚や粘膜に触れると局所麻酔作用を示し、センソが  
2054 配合された丸薬、錠剤等の内服固形製剤は、口中で噛み砕くと舌等が麻痺することがある  
2055 ため、噛まずに服用することとされている。

2056 有効域（第2章 II-2）（薬の体内での働き）参照。）が比較的狭い成分であり、1日用  
 2057 量中センソ5mgを超えて含有する医薬品は劇薬に指定されている。一般用医薬品では、1  
 2058 日用量が5mg以下となるよう用法・用量が定められており、それに従って適正に使用され  
 2059 る必要がある。なお、通常用量においても、悪心（吐きけ）、嘔吐の副作用が現れることが  
 2060 ある。

2061 ② ジャコウ、ゴオウ、ロクジョウ

2062 ジャコウは、シカ科のジャコウジカの雄の麝香腺分泌物を基原とする生薬で、強心作用  
 2063 のほか、呼吸中枢を刺激して呼吸機能を高めたり、意識をはっきりさせる等の作用がある  
 2064 とされる。

2065 ゴオウは、ウシ科のウシの胆嚢中に生じた結石を基原とする生薬で、強心作用のほか、  
 2066 末梢血管の拡張による血圧降下、興奮を静める等の作用があるとされる。

2067 ロクジョウは、シカ科の *Cervus nippon Temminck*、*Cervus elaphus Linné*、*Cervus*  
 2068 *canadensis Erxleben* 又はその他同属動物の雄鹿の角化していないマンシュウアカジカ又  
 2069 はマンシュウジカの雄のまだ角化していない、若しくは、わずかに角化した幼角を基原と  
 2070 する生薬で、強心作用の他、強壯、血行促進等の作用があるとされる。

2071 これらは強心薬のほか、小児五疳薬、滋養強壯保健薬等にも配合されている場合がある。

2072 (b) 強心成分以外の配合成分

2073 強心成分の働きを助ける効果を期待して、また、一部の強心薬では、小児五疳薬や胃腸薬、  
 2074 滋養強壯保健薬等の効能・効果を併せ持つものもあり、鎮静、強壯などの作用を目的とする  
 2075 生薬成分を組み合わせて配合されている場合が多い。

2076 ① リュウノウ

2077 中枢神経系の刺激作用による気つけの効果を期待して用いられる。

2078 リュウノウ中に存在する主要な物質として、ボルネオールが配合されている場合もある。

2079 ② シンジュ

2080 ウグイスガイ科のアコヤガイ、シンジュガイ又はクロチョウガイ等の外套膜組成中に病  
 2081 的に形成された顆粒状物質を基原とする生薬で、鎮静作用等を期待して用いられる。

2082 ③ その他

2083 レイヨウカク<sup>cxxiii</sup>、ジンコウ、動物胆（ユウタンを含む。）、サフラン、ニンジン、インヨ  
 2084 ウカク等が配合されている場合がある。

2085 レイヨウカク、ジンコウについてはI-6（小児の疳を適応症とする生薬製剤・漢方処  
 2086 方製剤）、動物胆（ユウタンを含む。）についてはIII-1（胃の薬）、サフランについてはVI

<sup>cxxiii</sup> レイヨウカクは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約による規制により、今後は本邦におい  
 て入手が困難となることが予想される。そのため、レイヨウカクを含有する強心薬のうち、センソ又はゴオウを主体とす  
 る一般用医薬品（いわゆる「六神丸」又は「感応丸」）においては、スイギョウカクへ代替する医薬品もある。

2087 (婦人薬)、ニンジン、インヨウカクについてはXⅢ（滋養強壮保健薬）をそれぞれ参照し  
 2088 て問題作成のこと。

2089

2090 ● 漢方処方製剤

2091 【<sup>りょうけいじゆつかんとう</sup>苓桂朮甘湯】 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸<sup>き</sup>があるもの  
 2092 の立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸<sup>き</sup>、息切れ、神経症、神経過敏に適すとされる。強心  
 2093 作用が期待される生薬は含まれず、主に尿量増加<sup>りやうりやうぞうか</sup>（利尿）作用により、水毒（漢方の考え方で、  
 2094 体の水分が停滞したり偏在して、その循環が悪いことを意味する。）の排出を促すことを主眼と  
 2095 する。

2096 構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題  
 2097 については、Ⅱ－1（<sup>せき</sup>咳止め・<sup>たん</sup>痰を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。なお、高血圧、  
 2098 心臓病、腎臓病の診断を受けた人では、カンゾウ中のグリチルリチン酸による偽アルドステロ  
 2099 ン症を生じやすく、また、動悸<sup>き</sup>や息切れの症状は、それら基礎疾患によっても起こることがあ  
 2100 る。医薬品の販売等に従事する専門家においては、本剤を使用しようとする人における状況の  
 2101 把握に努めることが重要である。

2102 比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあり、その場合に共通する留意点に関する出題  
 2103 については、XⅣ－1（漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

2104

2105 3) 相互作用、受診勧奨

2106 【相互作用】 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な  
 2107 事項について、XⅣ（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。特に、滋養強壮保  
 2108 健薬では、強心薬と同じ生薬成分が配合されていることが多い。

2109 何らかの疾患（心臓病に限らない。）のため医師の治療を受けている場合には、強心薬の使用  
 2110 が治療中の疾患に悪影響を生じることがあり、また、動悸<sup>き</sup>や息切れの症状が、治療中の疾患に  
 2111 起因する可能性や、処方された薬剤の副作用である可能性も考えられる。医師の治療を受けて  
 2112 いる人では、強心薬を使用する前に、その適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調  
 2113 剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

2114

2115 【受診勧奨】 強心薬については一般に、5～6日間使用して症状の改善がみられない場合には、  
 2116 心臓以外の要因、例えば、呼吸器疾患、貧血、高血圧症、甲状腺機能の異常等のほか、精神神経  
 2117 系の疾患も考えられる。医薬品の販売等に従事する専門家においては、強心薬を使用した人の  
 2118 状況に応じて、適宜、医療機関の受診を勧奨することが重要である。

2119 激しい運動をしていないにもかかわらず突発的に動悸<sup>き</sup>や息切れが起こり、意識が薄れてきた  
 2120 り、脈が十分触れなくなったり、胸部の痛み又は冷や汗を伴うような場合には、早めに医師の

2121 診療を受けるなどの対応が必要である。

2122 心臓の働きの低下が比較的軽微であれば、心臓に無理を生じない程度の軽い運動と休息の繰  
2123 り返しを日常生活に積極的に取り入れることにより、心筋が鍛えられ、また、手足の筋肉の動  
2124 きによって血行が促進されて心臓の働きを助けることにつながる。強心薬の使用によって症状  
2125 の緩和を図るだけでなく、こうした生活習慣の改善によって、動悸や息切れを起こしにくい体  
2126 質づくりが図られることも重要である。

2127 一般用医薬品にも副作用として動悸が現れることがあるものがあるが、一般の生活者におい  
2128 ては、それが副作用による症状と認識されずに、強心薬による対処を図ろうとすることも考え  
2129 られる。医薬品の販売等に従事する専門家においては、強心薬を使用しようとする人における  
2130 状況の把握に努めることが重要である。

2131

## 2132 2 高コレステロール改善薬

### 2133 1) 血中コレステロールと高コレステロール改善成分の働き

2134 コレステロールは細胞の構成成分で、胆汁酸や副腎皮質ホルモン等の生理活性物質の産生に重  
2135 要な物質でもある等、生体に不可欠な物質である。コレステロールの産生及び代謝は、主として  
2136 肝臓で行われる。

2137 コレステロールは水に溶けにくい物質であるため、血液中では血漿タンパク質と結合したリポ  
2138 タンパク質となって存在する。リポタンパク質は比重によっていくつかの種類に分類されるが、  
2139 そのうち低密度リポタンパク質（LDL）は、コレステロールを肝臓から末梢組織へと運ぶリポ  
2140 タンパク質である。一方、高密度リポタンパク質（HDL）は、末梢組織のコレステロールを取  
2141 り込んで肝臓へと運ぶリポタンパク質である<sup>cxixiv</sup>。このように、2種類のリポタンパク質によって、  
2142 肝臓と末梢組織の間をコレステロールが行き来しているが、血液中のLDLが多く、HDLが少  
2143 ないと、コレステロールの運搬が末梢組織側に偏ってその蓄積を招き、心臓病や肥満、動脈硬化  
2144 症等の生活習慣病につながる危険性が高くなる。

2145 血漿中のリポタンパク質のバランスの乱れは、生活習慣病を生じる以前の段階では自覚症状を  
2146 伴うものでないため、自分で気付いて医療機関の受診がなされるよりもむしろ、偶然又は生活習  
2147 慣病を生じて指摘されることが多い。医療機関で測定する検査値として、LDLが140mg/dL以  
2148 上、HDLが40mg/dL未満、中性脂肪が150mg/dL以上のいずれかである状態を、脂質異常症  
2149 という。

2150 高コレステロール改善薬は、血中コレステロール異常の改善、血中コレステロール異常に伴う  
2151 末梢血行障害（手足の冷え、痺れ）の緩和等を目的として使用される医薬品である。末梢組織へ  
2152 のコレステロールの吸収を抑えたり、肝臓におけるコレステロールの代謝を促す等により、血中

<sup>cxixiv</sup> このため、LDLコレステロールを「悪玉コレステロール」、HDLコレステロールを「善玉コレステロール」と呼ぶことがある。

2153 コレステロール異常の改善を促すとされる成分（高コレステロール改善成分）を主体として配合  
2154 される。

2155

2156 2) 代表的な配合成分、主な副作用

2157 (a) 高コレステロール改善成分

2158 大豆油不<sup>けん</sup>飽<sup>けい</sup>化物（ソイステロール）、リノール酸を含む植物油、ポリエノスファチジ  
2159 ルコリン（大豆から抽出・精製したレシチンの一種）、パンテチン等が用いられる。悪心（吐  
2160 きけ）、胃部不快感、胸やけ、下痢等の消化器系の副作用が現れることがある。

2161 大豆油不<sup>けん</sup>飽<sup>けい</sup>化物（ソイステロール）には、腸管におけるコレステロールの吸収を抑え  
2162 る働きがあるとされる。

2163 リノール酸、ポリエノスファチジルコリンは、コレステロールと結合して、代謝されや  
2164 すいコレステロールエステルを形成するとされ、肝臓におけるコレステロールの代謝を促す  
2165 効果を期待して用いられる。

2166 パンテチンは、LDL等の異化排泄<sup>せつ</sup>を促進し、リポタンパクリパーゼ活性を高めて、HD  
2167 L産生を高める作用があるとされる。

2168 (b) ビタミン成分

2169 ① ビタミンB<sub>2</sub>（リボフラビン酪酸エステル等）

2170 血漿中に過剰に存在するコレステロールは、過酸化脂質となって種々の障害の原因となる  
2171 ことが知られている。リボフラビンは酵素により、フラビンモノヌクレオチド（FMN）さ  
2172 らにフラビンアデニンジヌクレオチド（FAD）へと活性化され、フラビン酵素の補酵素と  
2173 して細胞内の酸化還元系やミトコンドリアにおける電子伝達系に働き、糖質、脂質の生体内  
2174 代謝に広く関与する。コレステロールの生合成抑制と排泄<sup>せつ</sup>・異化促進作用、中性脂肪抑制作  
2175 用、過酸化脂質分解作用を有すると言われている。

2176 リボフラビンの摂取によって尿が黄色くなることがあるが、これは使用の中止を要する副  
2177 作用等の異常ではない。

2178 ② ビタミンE（トコフェロール酢酸エステル）

2179 ビタミンEは、コレステロールからの過酸化脂質の生成を抑えるほか、末梢血管における  
2180 血行を促進する作用があるとされ、血中コレステロール異常に伴う末梢血行障害（手足の冷  
2181 え、痺れ）の緩和等を目的として用いられる。

2182 同様の作用を期待して、ガンマ-オリザノールが配合されている場合もある。ガンマ-オリザ  
2183 ノールに関する出題については、XⅢ（滋養強壮保健薬）を参照して作成のこと。

2184

2185 3) 生活習慣改善へのアドバイス、受診勧奨等

2186 コレステロールは、食事から摂取された糖及び脂質から主に産生される。糖質や脂質を多く含

2187 む食品の過度の摂取を控える、日常生活に適度な運動を取り入れる等、生活習慣の改善が図られ  
 2188 ることが重要であり、高コレステロール改善薬の使用による対処は、食事療法、運動療法の補助  
 2189 的な位置づけである。

2190 目安としてウエスト周囲径（腹囲）が、男性なら85cm、女性なら90cm以上である場合には  
 2191 生活習慣病を生じるリスクが高まるとされており、[いわゆるメタボリックシンドロームの予防で](#)  
 2192 [は、血中コレステロール値に留意することが重要である。](#)ただし、高コレステロール改善薬は、  
 2193 結果的に生活習慣病の予防につながるものであるが、ウエスト周囲径（腹囲）を減少させるなど  
 2194 の<sup>もう</sup>痩身効果を目的とする医薬品ではない。医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者  
 2195 等に対してその旨を説明する等、正しい理解を促すことが重要である。

2196 生活習慣の改善を図りつつ、しばらくの間（1～3ヶ月）、高コレステロール改善薬の使用を続  
 2197 けてもなお、検査値に改善がみられない時には、遺伝的又は内分泌的要因も疑われる<sup>cxxv</sup>ため、い  
 2198 ったん使用を中止して医師の診療を受けるなどの対応が必要である。このような場合、医薬品の  
 2199 販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して、高コレステロール改善薬の使用を漫然  
 2200 と継続せずに医療機関を受診するよう促すべきである。

2201

### 2202 3 貧血用薬（鉄製剤）

#### 2203 1) 貧血症状と鉄製剤の働き

2204 貧血は、その原因によりビタミン欠乏性貧血<sup>cxxvi</sup>、鉄欠乏性貧血<sup>cxxvii</sup>等に分類されるが、一般的  
 2205 な症状として、疲労、動悸<sup>き</sup>、息切れ、血色不良、頭痛、耳鳴り、めまい、微熱、皮膚や粘膜の蒼白<sup>もう</sup>  
 2206 （青白くなること）、下半身のむくみ等が現れる。

2207 貧血用薬（鉄製剤）は、鉄欠乏性貧血に対して不足している鉄分を補充[することにより](#)も、造  
 2208 血機能の回復を図る医薬品である。

2209 鉄分は、赤血球が酸素を運搬する上で重要なヘモグロビンの産生に不可欠なミネラルである。  
 2210 鉄分の摂取不足を生じても、初期には貯蔵鉄<sup>cxxviii</sup>（肝臓などに蓄えられている鉄）や血清鉄（ヘ  
 2211 モグロビンを産生するために、貯蔵鉄が赤血球へと運ばれている状態）が減少するのみでヘモグ  
 2212 ロビン量自体は変化せず、ただちに貧血の症状は現れない。しかし、持続的に鉄が欠乏すると、  
 2213 ヘモグロビンが減少して貧血症状が現れる。鉄欠乏状態を生じる要因としては、日常の食事から  
 2214 の鉄分の摂取不足及び鉄の消化管からの吸収障害による鉄の供給量の不足、消化管出血等が挙げ  
 2215 られる。また、体の成長が著しい年長乳児や幼児、月経血損失のある女性、鉄要求量の増加する

<sup>cxxv</sup> 代謝酵素、受容体やアポタンパク質の遺伝子異常による家族性の原因及び糖尿病、腎疾患、甲状腺疾患など他の疾患によ  
 って生じる続発性のものである可能性がある。

<sup>cxxvi</sup> 特に、ビタミンB [1.2.12](#)が不足して生じる巨赤芽球貧血は悪性貧血と呼ばれている。ビタミンB [1.2.12](#)は、胃腺から出  
 る粘液に含まれる、内因子と呼ばれるタンパク質と結合することで、小腸から吸収されやすくなるので、胃粘膜の異常によ  
 りビタミンB [1.2.12](#)が不足する。

<sup>cxxvii</sup> 赤血球に含まれる色素、ヘモグロビンの生合成に必要な鉄分が不足して生じる貧血である。

<sup>cxxviii</sup> フェリチン（鉄を含有するタンパク質）として肝臓や脾臓のような臓器に存在している。

2216 妊婦・母乳を与える女性では、鉄欠乏状態を生じやすい。

2217

2218 2) 代表的な配合成分、主な副作用

2219 (a) 鉄分

2220 不足した鉄分を補充することを目的として配合されているものであり、主な成分としては、  
2221 フマル酸第一鉄、溶性ピロリン酸第二鉄、可溶性含糖酸化鉄、クエン酸鉄アンモニウムなど  
2222 が用いられる。

2223 なお、鉄製剤を服用すると便が黒くなることがある。これは使用の中止を要する副作用等  
2224 の異常ではないが、鉄製剤の服用前から便が黒い場合は貧血の原因として消化管内で出血し  
2225 ている場合もあるため、服用前の便の状況との対比が必要である。

2226 (b) 鉄以外の金属成分

2227 銅はヘモグロビンの産生過程で、鉄の代謝や輸送に重要な役割を持つ。補充した鉄分を利用  
2228 してヘモグロビンが産生されるのを助ける目的で、硫酸銅が配合されている場合がある。

2229 コバルトは赤血球ができる過程で必要不可欠なビタミンB12の構成成分であり、骨髄で  
2230 の造血機能を高める目的で、硫酸コバルトが配合されている場合がある。

2231 マンガンは、糖質・脂質・タンパク質の代謝をする際に働く酵素の構成物質であり、エネ  
2232 ルギー合成を促進する目的で、硫酸マンガンが配合されている場合がある。

2233 (c) ビタミン成分

2234 貧血を改善するため、ヘモグロビン産生に必要なビタミンB6や、正常な赤血球の形成に  
2235 働くビタミンB12や葉酸などが配合されている場合がある。

2236 ビタミンC（アスコルビン酸等）は、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つことを目  
2237 的として用いられる。

2238

2239 【主な副作用】 貧血用薬（鉄製剤）の主な副作用として、悪心（吐きけ）、嘔吐、食欲不振、胃  
2240 部不快感、腹痛、便秘、下痢等の胃腸障害が知られている。鉄分の吸収は空腹時のほうが高い  
2241 とされているが、消化器系への副作用を軽減するには、食後に服用することが望ましい。胃へ  
2242 の負担を軽減するため、腸溶性<sup>cxxix</sup>とした製品もある。

2243

2244 3) 相互作用、受診勧奨等

2245 【相互作用】 複数の貧血用薬と併用すると、鉄分の過剰摂取となり、胃腸障害や便秘等の副作  
2246 用が起こりやすくなる。

2247 服用の前後30分にタンニン酸を含む飲食物（緑茶、紅茶、コーヒー、ワイン、柿等）を摂取

<sup>cxxix</sup> 胃と腸のpHの違いを利用して、胃ではなく腸で溶けるようにコーティングされた製剤のこと。



2248 すると、タンニン酸と反応して鉄の吸収が悪くなることがあるので、服用前後はそれらの摂取  
2249 を控えることとされている。

2250 医師の治療を受けている人では、鉄分の吸収に影響を及ぼす薬剤が処方されている場合があ  
2251 るので、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤  
2252 師に相談がなされるべきである。

2253

2254 【受診勧奨等】 貧血のうち鉄製剤で改善できるのは、鉄欠乏性貧血のみである。特段の基礎疾  
2255 患等がなく鉄分の欠乏を生じる主な要因としては、食事の偏り（鉄分の摂取不足）が考えられ、  
2256 貧血用薬（鉄製剤）の使用による対処と併せて、食生活の改善が図られることが重要である。  
2257 なお、貧血の症状がみられる以前から予防的に貧血用薬（鉄製剤）を使用することは適当でな  
2258 い。

2259 食生活を改善し、かつ鉄製剤（貧血用薬）の使用を2週間程度続けても症状の改善がみられ  
2260 ない場合には、月経過多、消化管出血、痔及び子宮筋腫等、出血性の疾患による慢性的な血液  
2261 の損失が原因で貧血症状が起きている可能性がある。これらの場合、基礎疾患の治療が優先さ  
2262 れるべきであり、一般用医薬品による対処を漫然と継続することは適当でない。また、鉄欠乏  
2263 性貧血以外の貧血<sup>cxxx</sup>により症状が現れていることも疑われ、鉄製剤によって対処すること自体  
2264 が適当でない可能性もある。いずれの場合も、医薬品の販売等に従事する専門家においては、  
2265 購入者等に対して、貧血用薬（鉄製剤）の使用を漫然と継続せずに医療機関を受診するよう促  
2266 すべきである。

2267

#### 2268 4 その他の循環器用薬

##### 2269 1) 代表的な配合成分等、主な副作用

##### 2270 ● 生薬成分

2271 コウカ（キク科のベニバナの管状花をそのまま又は黄色色素の大部分を除いたもので、と  
2272 きに圧搾して板状としたものを基原とする生薬）には、末梢の血行を促してうっ血鬱血  
2273 除く作用があるとされる。

2274 日本薬局方収載のコウカを煎じて服用する製品は、冷え症及び血色不良に用いられる。

2275

##### 2276 ● 生薬成分以外の成分

##### 2277 (a) ユビデカレノン

2278 肝臓や心臓などの臓器に多く存在し、エネルギー代謝に関与する酵素の働きを助ける成分

<sup>cxxx</sup> ビタミン欠乏性貧血等、赤血球が生成される上で必要な、鉄以外の要素が欠損している場合がある。また、造血器系には異常が認められなくても、腎不全等の腎障害により、赤血球が生成される上で必要なタンパク質の産生が低下する腎性貧血等の場合がある。

2279 で、摂取された栄養素からエネルギーが産生される際にビタミンB群とともに働く。別名コ  
2280 エンザイムQ10とも呼ばれる。

2281 心筋の酸素利用効率を高めて収縮力を高めることによって血液循環の改善効果を示すとさ  
2282 れ、軽度な心疾患により日常生活の身体活動を少し越えたときに起こる動悸、息切れ、むく  
2283 みの症状に用いられる。ただし、2週間位使用して症状の改善がみられない場合には、心臓  
2284 以外の病気が原因である可能性も考えられ、漫然と使用を継続することは適当でない。

2285 副作用として、胃部不快感、食欲減退、吐きけ、下痢、発疹・痒みが現れることがある。

2286 小児において心疾患による動悸、息切れ、むくみの症状があるような場合には、医師の診  
2287 療を受けることが優先されるべきであり、15歳未満の小児向けの製品はない。

2288 心臓の病気で医師の治療又は指示を受けている人では、その処置が優先されるべきであり、  
2289 使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相  
2290 談するべきである。

2291 動悸、息切れ、むくみの症状は、高血圧症、呼吸器疾患、腎臓病、甲状腺機能の異常、貧血  
2292 などが原因となって起こることもある。これらの基礎疾患がある人では、使用する前にその  
2293 適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するべきである。

2294 (b) ヘプロニカート、イノシトールヘキサニコチネート

2295 いずれの化合物もニコチン酸が遊離し、そのニコチン酸の働きによって末梢の血液循環を  
2296 改善する作用を示すとされる。ビタミンEと組み合わせて用いられる場合が多い。

2297 (c) ルチン

2298 ビタミン様物質の一種で、高血圧等における毛細血管の補強、強化の効果を期待して用い  
2299 られる。

2300

2301 ● 漢方処方製剤

2302 (a) 三黄瀉心湯

2303 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向な  
2304 どのあるものの高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔  
2305 出血、便秘、更年期障害、血の道症に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、  
2306 体の弱い人）、胃腸が弱く下痢しやすい人、だらだら出血が長引いている人では、激しい腹痛  
2307 を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2308 構成生薬としてダイオウを含む。ダイオウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出  
2309 題については、Ⅲ-2（腸の薬）を参照して作成のこと。本剤を使用している間は、瀉下薬  
2310 の使用を避ける必要がある。

2311 鼻血に用いる場合には、漫然と長期の使用は避け、5～6回使用しても症状の改善がみら  
2312 れないときは、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの対応が必要である。

2313 痔出血、便秘に用いる場合も同様に、漫然と長期の使用は避け、1週間位使用しても症状  
 2314 の改善がみられないときは、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの対応が  
 2315 必要である。その他の適応に対して用いる場合には、比較的長期間（1ヶ月位）服用される  
 2316 ことがあり、その場合に共通する留意点に関する出題については、XIV-1（漢方処方製剤）  
 2317 を参照して作成のこと。

2318 (b) 七物降下湯

2319 体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないもの的高血圧に伴う随伴症  
 2320 状（のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重）に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃  
 2321 部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。また、小児向けの漢方処方ではなく、  
 2322 15歳未満の小児への使用は避ける必要がある。

2323 比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあり、その場合に共通する留意点に関する出  
 2324 題については、XIV-1（漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

2325

2326 2) 相互作用、受診勧奨等

2327 【相互作用】 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な  
 2328 事項について、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

2329 コエンザイムQ10~~10~~については、医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていなければ、  
 2330 食品（いわゆる健康食品）の素材として流通することが可能となっており、そうした食品が合  
 2331 わせて摂取された場合、胃部不快感や吐きけ、下痢等の副作用が現れやすくなるおそれがある。  
 2332 また、作用が増強されて心臓に負担を生じたり、副作用が現れやすくなるおそれがあることか  
 2333 ら、強心薬等の併用は避ける必要がある。

2334

2335 【受診勧奨等】 高血圧や心疾患に伴う諸症状を改善する医薬品は、体質の改善又は症状の緩和  
 2336 を主眼としており、いずれも高血圧や心疾患そのものの治療を目的とするものではない。これ  
 2337 らの医薬品の使用は補助的なものであり、高血圧や心疾患そのものへの対処については、医療  
 2338 機関の受診がなされるなどの対応が必要である。

2339 医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等が、それら疾患について、一般用医  
 2340 薬品によって自己治療が可能であるかの誤解を生じることのないよう、適切な情報提供に努め  
 2341 るべきである。

2342

2343 V 排泄に関わる部位に作用する薬

2344 1 痔の薬

2345 1) 痔の発症と対処、痔疾用薬の働き

2346 痔は、肛門付近の血管がうっ血鬱血し、肛門に負担がかかることによって生じる肛門の病気の

2347 総称で、その主な病態としては、痔核、裂肛、痔瘻がある。

2348 痔核は、肛門に存在する細かい血管群が部分的に拡張し、肛門内にいぼ状の腫れが生じたもの  
2349 で、一般に「いぼ痔」と呼ばれる。便秘や長時間同じ姿勢でいる等、肛門部に過度の圧迫をかけ  
2350 ることが、痔核を生じる主な要因とされる。直腸粘膜と皮膚の境目となる歯状線より上部の、直  
2351 腸粘膜にできた痔核を内痔核と呼ぶ。直腸粘膜には知覚神経が通っていないため、自覚症状が少  
2352 ないことが特徴である。排便時に、肛門から成長した痔核がはみ出る脱肛、出血等の症状が現れ  
2353 る。一方、歯状線より下部の、肛門の出口側にできた痔核を外痔核と呼ぶ。内痔核と異なり、排  
2354 便と関係なく、出血や患部の痛みを生じる。

2355 裂肛は、肛門の出口からやや内側の上皮に傷が生じた状態であり、一般に、「切れ痔」（又は「裂  
2356 け痔」）と呼ばれる。裂肛は、便秘等により硬くなった糞便を排泄する際や、下痢の便に含まれる  
2357 多量の水分が肛門の粘膜に浸透して炎症を起こしやすくなった状態で、勢いよく便が通過する際  
2358 に粘膜が傷つけられることで生じる。

2359 痔瘻は、肛門内部に存在する肛門腺窩と呼ばれる小さなくぼみに糞便の滓が溜まって炎症・化  
2360 膿を生じた状態で、体力低下等により抵抗力が弱まっているときに起こりやすい。炎症・化膿が  
2361 進行すると、肛門周囲の皮膚部分から膿が溢れ、その膿により周辺部の皮膚がかぶれ、赤く腫れ  
2362 て激痛を生じる。

2363 痔は、肛門部に過度の負担をかけることやストレス等により生じる生活習慣病である。長時間  
2364 座るのを避け、軽い運動によって血行を良くすることが痔の予防につながる。また、食物繊維の  
2365 摂取を心がける等、便秘を避けることや香辛料などの刺激性のある食べ物を避けることなども痔  
2366 の予防に効果的である。

2367 一般用医薬品の痔疾用薬には、肛門部又は直腸内に適用する外用薬（外用痔疾用薬）と内服し  
2368 て使用する内用薬（内用痔疾用薬）がある。いずれもその使用と併せて、痔を生じた要因となっ  
2369 ている生活習慣の改善等が図られることが重要である。

2370 外用痔疾用薬は、痔核（いぼ痔）又は裂肛（切れ痔）による痛み、痒み、腫れ、出血等の緩和、  
2371 患部の消毒を目的とする坐剤、軟膏剤（注入軟膏を含む。）又は外用液剤である。

2372 内用痔疾用薬は、比較的緩和な抗炎症作用、血行改善作用を目的とする成分のほか、瀉下・整  
2373 腸成分等が配合されたもので、外用痔疾用薬と併せて用いると効果的なものである。

2374

2375 2) 代表的な配合成分等、主な副作用

2376 ● 外用痔疾用薬

2377 外用痔疾用薬は局所に適用されるものであるが、坐剤及び注入軟膏では、成分の一部が直腸粘  
2378 膜から吸収されて循環血流中に入りやすく、全身的な影響を生じることがあるため、配合成分に  
2379 よっては注意を要する場合がある。

2380 坐剤及び注入軟膏の用法に関連した注意に関する出題については、Ⅲ－4（その他の消化器官

2381 用薬）を参照して作成のこと。

2382 (a) 局所麻酔成分

2383 局所麻酔成分は、皮膚や粘膜などの局所に適用されると、その周辺の知覚神経に作用して  
2384 刺激の神経伝導伝達を可逆的に遮断する作用を示す。痔に伴う痛み・痒みを和らげることを  
2385 目的として、リドカイン、リドカイン塩酸塩、アミノ安息香酸エチル、ジブカイン塩酸塩、  
2386 プロカイン塩酸塩等の局所麻酔成分が用いられる。

2387 リドカイン、リドカイン塩酸塩、アミノ安息香酸エチル又はジブカイン塩酸塩が配合され  
2388 た坐剤及び注入軟膏では、まれに重篤な副作用としてショック（アナフィラキシー）を生じ  
2389 ることがある。

2390 (b) 鎮痒成分

2391 ① 抗ヒスタミン成分

2392 痔に伴う痒みを和らげることを目的として、ジフェンヒドラミン塩酸塩、ジフェンヒ  
2393 ドラミン、クロルフェニラミンマレイン酸塩等の抗ヒスタミン成分が配合されている場  
2394 合がある。外用薬で用いられる抗ヒスタミン成分に関する出題については、X（皮膚に  
2395 用いる薬）を参照して作成のこと。

2396 ジフェンヒドラミン塩酸塩又はジフェンヒドラミンが配合された坐剤及び注入軟膏に  
2397 おける留意点に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこ  
2398 と。

2399 ② 局所刺激成分

2400 局所への穏やかな刺激によって痒みを抑える効果を期待して、熱感刺激を生じさせる  
2401 クロタミトン、冷感刺激を生じさせるカンフル、ハッカ油（シソ科ハッカの地上部を水  
2402 蒸気蒸留して得た油を冷却、固形分を除去した精油）、メントール等が配合されている  
2403 場合がある。

2404 (c) 抗炎症成分

2405 ① ステロイド性抗炎症成分

2406 痔による肛門部の炎症や痒みを和らげる成分として、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、  
2407 プレドニゾロン酢酸エステル等のステロイド性抗炎症成分が配合されている場合がある。  
2408 ステロイド性抗炎症成分を含有する医薬品に共通する留意点等に関する出題については、  
2409 X（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。なお、ステロイド性抗炎症成分が配合さ  
2410 れた坐剤及び注入軟膏では、その含有量によらず長期連用を避ける必要がある。

2411 ② グリチルレチン酸、リゾチーム塩酸塩

2412 比較的緩和な抗炎症作用を示す成分として、グリチルレチン酸やリゾチーム塩酸塩が  
2413 配合されている場合がある。グリチルレチン酸はグリチルリチン酸が分解されてできる  
2414 成分で、グリチルリチン酸と同様に作用する。

2415 これらの成分が配合された坐剤及び注入軟膏における留意点に関する出題については、  
2416 I-1（かぜ薬）を参照して作成のこと。

2417 (d) 組織修復成分

2418 痔による肛門部の創傷の治癒を促す効果を期待して、アラントイン、アルミニウムクロロ  
2419 ヒドロキシアラントイネート（別名アルクロキサ）のような組織修復成分が用いられる。

2420 (e) 止血成分

2421 ① アドレナリン作動成分

2422 血管収縮作用による止血効果を期待して、テトラヒドロゾリン塩酸塩、メチルエフェ  
2423 ドリン塩酸塩、エフェドリン塩酸塩、ナファゾリン塩酸塩等のアドレナリン作動成分が  
2424 配合されていることがある。

2425 メチルエフェドリン塩酸塩が配合された坐剤及び注入軟膏については、交感神経系に  
2426 対する刺激作用によって心臓血管系や肝臓でのエネルギー代謝等にも影響を生じること  
2427 が考えられ、心臓病、高血圧、糖尿病又は甲状腺機能障害の診断を受けた人では、症状  
2428 を悪化させるおそれがあり、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は  
2429 処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。高齢者では、心臓病や高血  
2430 圧、糖尿病の基礎疾患がある場合が多く、また、一般的に心悸亢進や血圧上昇、血糖値  
2431 上昇を招きやすいので、使用する前にその適否を十分考慮し、使用する場合にはそれら  
2432 の初期症状等に常に留意する等、慎重な使用がなされることが重要である。

2433 ② 収斂保護止血成分

2434 粘膜表面に不溶性の膜を形成することによる、粘膜の保護・止血を目的として、タン  
2435 ニン酸、酸化亜鉛、硫酸アルミニウムカリウム、卵黄油等が配合されている場合がある。

2436 タンニン酸については、ロートエキス・タンニン坐剤や複方ロートエキス・タンニン  
2437 軟膏のように、鎮痛鎮痙作用を示すロートエキスと組み合わせて用いられることもある。  
2438 ロートエキスが配合された坐剤及び注入軟膏における留意点に関する出題については、  
2439 III-3（胃腸鎮痛鎮痙薬）を参照して作成のこと。

2440 (f) 殺菌消毒成分

2441 痔疾患に伴う局所の感染を防止することを目的として、クロルヘキシジン塩酸塩、セチル  
2442 ピリジニウム塩化物、ベンザルコニウム塩化物、デカリニウム塩化物、イソプロピルメチル  
2443 フェノール等の殺菌消毒成分が配合されている場合がある。

2444 セチルピリジニウム塩化物、ベンザルコニウム塩化物、デカリニウム塩化物の殺菌消毒作  
2445 用に関する出題については、VIII（鼻に用いる薬）を参照して作成のこと。

2446 クロルヘキシジン塩酸塩、イソプロピルメチルフェノールの殺菌消毒作用に関する出題に  
2447 ついては、X（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。

2448 (g) 生薬成分

2449 ① シコン  
 2450 ムラサキ科のムラサキの根を基原とする生薬で、新陳代謝促進、殺菌、抗炎症等の作  
 2451 用を期待して用いられる。

2452 ② セイヨウトチノミ（セイヨウトチノキ種子）  
 2453 トチノキ科のセイヨウトチノキ（マロニエ）の種子を基原とする生薬で、血行促進、  
 2454 抗炎症等の作用を期待して用いられる。

2455 (h) その他：ビタミン成分  
 2456 肛門周囲の末梢血管の血行を改善する作用を期待してビタミンE（トコフェロール酢酸エ  
 2457 ステル）、傷の治りを促す作用を期待してビタミンA油等が配合されている場合がある。

2458  
 2459 ● 内用痔疾用薬

2460 内用痔疾用薬は、生薬成分を中心として、以下のような成分を組み合わせられて配合されている。

2461 (a) 生薬成分

2462 痔に伴う症状の緩和を目的として、センナ（又はセンノシド）、ダイオウ、カンゾウ、ボタ  
 2463 ンピ、トウキ、サイコ、オウゴン、セイヨウトチノミ、カイカ、カイカク等の生薬成分が配合  
 2464 されている場合がある。

2465 センナ（又はセンノシド）、ダイオウが配合された医薬品に共通する留意点に関する出題に  
 2466 ついては、Ⅲ－2（腸の薬）を参照して作成のこと。

2467 カンゾウが配合された医薬品に共通する留意点に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・  
 2468 痰を出しやすくする薬）参照して作成のこと。

2469 ボタンピについてはⅠ－2（解熱鎮痛薬）、トウキについてはⅥ（婦人薬）、サイコについ  
 2470 てはⅩⅣ－2（その他の生薬製剤）を、それぞれ参照して問題作成のこと。

2471 ① オウゴン、セイヨウトチノミ

2472 オウゴンはシソ科のコガネバナの周皮を除いた根を基原とする生薬、セイヨウトチ  
 2473 ノミはトチノキ科のセイヨウトチノキ（マロニエ）の種子を用いた生薬で、いずれも主  
 2474 に抗炎症作用を期待して用いられる。

2475 ② カイカ、カイカク

2476 カイカはマメ科のエンジュの蓄<sup>つぼみ</sup>を基原とする生薬、カイカクはマメ科のエンジュの  
 2477 成熟果実を基原とする生薬で、いずれも主に止血効果を期待して用いられる。

2478 ~~(b) 抗炎症成分~~

2479 ~~リゾチーム塩酸塩などの抗炎症成分が配合されている場合がある。これら成分に関する出~~  
 2480 ~~題については、Ⅰ－1（かぜ薬）を参照して作成のこと。~~

2481 ~~(c)~~ (b) 止血成分

2482 カルバゾクロムは、毛細血管を補強、強化して出血を抑える働きがあるとされ、止血効果

2483 を期待して配合されている場合がある。

2484 ~~(d)~~-(c) その他：ビタミン成分

2485 肛門周囲の末梢血管の血行を促して、うっ血鬱血を改善する効果を期待して、ビタミンE  
2486 （トコフェロール酢酸エステル、トコフェロールコハク酸エステル等）が配合されている場  
2487 合がある。

2488

2489 ● 漢方処方製剤

2490 乙字湯、芎帰膠艾湯のいずれも、構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含む医薬品に共  
2491 通する留意点に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照して作  
2492 成のこと。

2493 また、いずれも比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあり、その場合に共通する留意点  
2494 に関する出題については、XⅣ－1（漢方処方製剤）を参照して問題作成のこと。

2495 (a) 乙字湯

2496 体力中等度以上で、大便がかた硬く、便秘傾向のあるものの痔核（いぼ痔）、切れ痔、便秘、  
2497 軽度の脱肛に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱  
2498 く下痢しやすい人では、悪心・嘔吐、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不  
2499 向きとされる。

2500 通常、構成生薬としてダイオウを含み、その留意点に関する出題については、Ⅲ－2（腸  
2501 の薬）を参照して作成のこと。

2502 まれに重篤な副作用として、肝機能障害、間質性肺炎を生じることが知られている。

2503 短期間の使用に限られるものでないが、切れ痔、便秘に用いる場合には、5～6日間服用  
2504 して症状の改善がみられないときは、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなど  
2505 の対応が必要である。

2506 (b) 芎帰膠艾湯

2507 体力中等度以下で冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの痔出血、貧血、月経異  
2508 常・月経過多・不正出血、皮下出血に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃  
2509 部不快感、腹痛、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2510 短期間の使用に限られるものでないが、1週間位服用して症状の改善がみられないときは、  
2511 いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの対応が必要である。

2512

2513 3) 相互作用、受診勧奨

2514 【相互作用】 外用痔疾薬のうち坐剤及び注入軟膏については、成分の一部が直腸で吸収されて  
2515 循環血流中に入り、内服の場合と同様の影響を生じることがある。そのため、痔疾用薬の成分  
2516 と同種の作用を有する成分を含む内服薬や医薬部外品、食品等が併用されると、効き目が強す



2517 ぎたり、副作用が現れやすくなることがある。

2518 内用痔疾用薬では生薬成分を主体とした製剤や漢方処方製剤が中心となるが、漢方処方製剤、  
2519 生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な事項については、XIV（漢方  
2520 処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

2521

2522 【受診勧奨】 一般の生活者においては、痔はその発症部位から恥ずかしい病気として認識され  
2523 ている場合が多く、不確かな情報に基づく誤った対処がなされたり、放置して症状を悪化させ  
2524 てしまうことがある。

2525 肛門部にはもともと多くの細菌が存在しているが、肛門の括約筋によって外部からの細菌の  
2526 侵入を防いでおり、血流量も豊富なため、それらの細菌によって感染症を生じることがあまり  
2527 ない。しかし、痔の悪化等により細菌感染が起きると、異なる種類の細菌の混合感染が起こり、  
2528 膿瘍や痔瘻を生じて周囲の組織に重大なダメージをもたらすことがある。これらの治療には手  
2529 術を要することもあり、すみやかに医療機関を受診し、専門医の診療を受ける必要がある。

2530 痔の原因となる生活習慣の改善を図るとともに、一定期間、痔疾用薬を使用してもなお、排  
2531 便時の出血、痛み、肛門周囲の痒み等の症状が続く場合には、肛門癌<sup>cxxxix</sup>などの重大な病気の症  
2532 状である可能性も考えられ、早期に医療機関を受診して専門医の診療を受けるなどの対応が必  
2533 要である。

2534

## 2535 2 その他の泌尿器用薬

### 2536 1) 代表的な配合成分等、主な副作用

#### 2537 (a) 尿路消毒成分

2538 ウワウルシ（ツツジ科のクマコケモモの葉を基原とする生薬）は、利尿作用のほかに、経  
2539 口的に摂取した後、尿中に排出される分解代謝物が抗菌作用を示し、尿路の殺菌消毒効果を  
2540 期待して用いられる。

2541 日本薬局方収載のウワウルシは、煎薬として残尿感、排尿に際して不快感のあるものに用  
2542 いられる。

#### 2543 (b) 利尿成分

2544 ~~尿量増加~~（利尿）作用を期待して、以下のような生薬成分が配合されている場合がある。

#### 2545 ① カゴソウ：シソ科のウツボグサの花穂を基原とする生薬

2546 日本薬局方収載のカゴソウは、煎薬として残尿感、排尿に際して不快感のあるものに  
2547 用いられる。

#### 2548 ② キササゲ：ノウゼンカズラ科のキササゲ等の果実を基原とする生薬

<sup>cxxxix</sup> 肛門周囲に接している皮膚細胞又は肛門と直腸の境の粘膜上皮細胞が腫瘍化したもの。

- 2549 ③ サンキライ：ユリ科の *Smilax glabra Roxburgh* ケナシサルトリイバラの塊茎を基原と  
 2550 する生薬  
 2551 ④ ソウハクヒ：クワ科のマグワの根皮を基原とする生薬  
 2552 日本薬局方収載のキササゲ、サンキライ、ソウハクヒは、煎薬として尿量減少に用い  
 2553 られる。  
 2554 ⑤ モクツウ：アケビ科のアケビ又はミツバアケビの蔓性の茎を、通例、横切りしたものを  
 2555 基原とする生薬  
 2556 ⑥ ブクリヨウ：XIV－2（その他の生薬製剤）を参照。

2557  
 2558 ● 漢方処方製剤

2559 いずれも比較的長期間（1ヶ月位）使用されることがあり、その場合の留意点に関する出題に  
 2560 ついては、XIV－1（漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

2561 (a) 牛車腎気丸

2562 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに  
 2563 口渇があるもの下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、痒み、排尿困難、頻尿、むく  
 2564 み、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）に適すとされるが、胃腸が弱く下  
 2565 痢しやすい人、のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人では、胃部不快感、腹痛、のぼ  
 2566 せ、動悸等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2567 まれに重篤な副作用として、肝機能障害、間質性肺炎を生じることが知られている。

2568 (b) 八味地黄丸

2569 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇が  
 2570 あるもの下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、痒み、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻  
 2571 尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れに適すとされ  
 2572 るが、胃腸の弱い人、下痢しやすい人では、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢の副作用が現  
 2573 れるおそれがあるため使用を避ける必要があり、また、のぼせが強く赤ら顔で体力の充実し  
 2574 ている人では、のぼせ、動悸等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2575 (c) 六味丸

2576 体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渇がある  
 2577 ももの排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、痒み、夜尿症、しびれに適すとされるが、胃腸が弱  
 2578 く下痢しやすい人では、胃部不快感、腹痛、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされ  
 2579 る。

2580 (d) 猪苓湯

2581 体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの排尿困難、排尿痛、残  
 2582 尿感、頻尿、むくみに適すとされる。

2583 (e) 竜胆瀉肝湯<sup>りゅうたんしゃかんとう</sup>

2584 体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ  
2585 (おりもの)、頻尿に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃部不快感、下痢等  
2586 の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2587 構成生薬としてカンゾウを含む。カンゾウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出  
2588 題については、Ⅱ-1（咳止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

2589

2590 2) 相互作用、受診勧奨

2591 【相互作用】 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な  
2592 事項について、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

2593

2594 【受診勧奨】 残尿感や尿量減少は一時的な体調不良等によるもののほか、泌尿器系の疾患にお  
2595 ける自覚症状としても現れる。例えば、膀胱炎<sup>ぼうこう</sup>や前立腺肥大などによっても、そうした症状が起  
2596 ることがあるが、その場合、一般用医薬品によって対処することは適当でない。

2597

2598 VI 婦人薬

2599 1) 適用対象となる体質・症状

2600 女性の月経は、子宮の内壁を覆っている膜（子宮内膜）が剥がれ落ち、血液（経血）と共に排出  
2601 される生理現象で、一生のうち妊娠可能な期間に、妊娠期間中などを除き、ほぼ毎月、周期的に  
2602 起こる。月経周期は、個人差があり、約21日～40日と幅がある。種々のホルモンの複雑な相  
2603 互作用によって調節されており、視床下部や下垂体で産生されるホルモンと、卵巣で産生される  
2604 女性ホルモンが月経周期に関与する。

2605 加齢とともに卵巣からの女性ホルモンの分泌が減少していき、やがて月経が停止して、妊娠可  
2606 能な期間が終了することを閉経という。閉経の前後には、更年期（閉経周辺期）と呼ばれる移行  
2607 的な時期があり、体内の女性ホルモンの量が大きく変動することがある。

2608 そのため更年期においては、月経周期が不規則になるほか、不定愁訴<sup>cxxxii</sup>として血の道症（臓  
2609 器・組織の形態的異常がなく、抑うつ鬱<sup>うつ鬱</sup>や寝つきが悪くなる、神経質、集中力の低下等の精神神  
2610 経症状が現れる病態）の症状に加え、冷え症、腰痛、頭痛、頭重、ほてり、のぼせ、立ちくらみ等  
2611 の症状が起こることがあり、こうした症候群を更年期障害という。

2612 血の道症は、月経、妊娠、分娩<sup>べん</sup>、産褥<sup>じよく</sup>（分娩後、母体が通常<sup>べん</sup>の身体状態に回復するまでの期間）、  
2613 更年期等の生理現象や、流産、人工妊娠中絶、避妊手術などを原因とする異常生理によって起こ  
2614 るとされ、範囲が更年期障害よりも広く、年齢的に必ずしも更年期に限らない。特に、月経の約

<sup>cxxxii</sup> 体のどの部位が悪いのかははっきりしない訴えで、全身の倦怠感や疲労感、微熱感などを特徴とする。更年期障害のほか、自律神経失調症等の心身症の症状として現れることが多い。

2615 10～3日前に現れ、月経開始と共に消失する腹部膨満感、頭痛、乳房痛などの身体症状や感情  
 2616 の不安定、興奮、抑うつ鬱などの精神症状を主体とするものを、月経前症候群という。

2617 婦人薬は、月経及び月経周期に伴って起こる症状を中心として、女性に現れる特有な諸症状（血  
 2618 行不順、自律神経系の働きの乱れ、生理機能障害等の全身的な不快症状）の緩和と、保健を主た  
 2619 る目的とする医薬品であり、その効能・効果として、血の道症、更年期障害、月経異常及びそれ  
 2620 らに随伴する冷え症、月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしび  
 2621 れ、こしけ（おりもの）、血色不良、便秘、むくみ等に用いられる。

2622

2623 2) 代表的な配合成分等、主な副作用

2624 (a) 女性ホルモン成分

2625 人工的に合成された女性ホルモンの一種であるエチニルエストラジオールは、エストラジ  
 2626 オールを補充するもので、<sup>ちつ</sup>膣粘膜又は外陰部に適用されるものがある。これらの成分は適用  
 2627 部位から吸収されて循環血液中に移行する。

2628 妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって胎児の先天性異常の発生が報告されており、妊  
 2629 婦又は妊娠していると思われる女性では使用を避ける必要がある。吸収された成分の一部が  
 2630 乳汁中に移行することが考えられ、母乳を与える女性では使用を避けるべきである。

2631 長期連用により血栓症を生じるおそれがあり、また、乳癌<sup>がん</sup>や脳卒中などの発生確率が高ま  
 2632 る可能性もある<sup>cxxxiii</sup>ため、継続して使用する場合には、医療機関を受診するよう促すべきで  
 2633 ある。

2634 (b) 生薬成分

2635 ① サフラン、コウブシ

2636 鎮静、鎮痛のほか、女性の滞っている月経を促す作用を期待して、サフラン（アヤメ科の  
 2637 サフランの柱頭を基原とする生薬）、コウブシ（カヤツリグサ科のハマスゲの根茎を基原とす  
 2638 る生薬）等が配合されている場合がある。

2639 日本薬局方収載のサフランを煎じて服用する製品は、冷え症及び血色不良に用いられる。

2640 ② センキュウ、トウキ、ジオウ

2641 センキュウ（セリ科のセンキュウの根茎を、通例、湯通ししたものを基原とする生薬）、ト  
 2642 ウキ（セリ科のトウキ又はホッカイトウキの根を、通例、湯通ししたものを基原とする生薬）、  
 2643 ジオウ（ゴマノハグサ科のアカヤジオウ等の根又はそれを蒸したものを基原とする生薬）は、  
 2644 血行を改善し、血色不良や冷えの症状を緩和するほか、強壮、鎮静、鎮痛等の作用を期待し  
 2645 て用いられる。

2646 ③ その他の生薬成分

<sup>cxxxiii</sup> 医薬品・医療用具等安全性情報 No.197（平成16年1月）

2647 鎮痛・鎮<sup>けい</sup>痙の作用を期待して、シャクヤク、ボタンピ等が配合されている場合がある。こ  
2648 れら生薬成分に関する出題については、I-2（解熱鎮痛薬）を参照して作成のこと。

2649 鎮静作用を期待して、サンソウニン、カノコソウ等が配合されている場合がある。これら  
2650 生薬成分に関する出題については、I-3（眠気を促す薬）を参照して作成のこと。

2651 抗炎症作用を期待して、カンゾウが配合されている場合がある。カンゾウに関する出題、  
2652 カンゾウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題については、II-1（咳<sup>せき</sup>止め・痰<sup>たん</sup>  
2653 を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

2654 胃腸症状に対する効果を期待して、オウレン、ソウジュツ、ビヤクジュツ、ダイオウ等が  
2655 配合されている場合がある。これら生薬成分に関する出題については、III（胃腸に作用する  
2656 薬）を参照して作成のこと。特に、ダイオウを含有する医薬品については、妊婦又は妊娠し  
2657 ていると思われる女性、授乳婦における使用に関して留意される必要があり、III-2（腸の  
2658 薬）を参照して問題作成のこと。

2659 このほか、利尿作用を期待して、モクツウ（V-2（その他の泌尿器用薬）参照。）、ブクリ  
2660 ョウ（XIV-2（その他の生薬製剤）参照。）等が配合されている場合がある。

2661 (c) ビタミン成分

2662 疲労時に消耗しがちなビタミンの補給を目的として、ビタミンB<sup>1</sup>（チアミン硝化物、チ  
2663 アミン塩化物塩酸塩等）、ビタミンB<sup>2</sup>（リボフラビン、リボフラビンリン酸エステルナト  
2664 リウム等）、ビタミンB<sup>6</sup>（ピリドキシン塩酸塩等）、ビタミンB<sup>12</sup>（シアノコバラミン）、  
2665 ビタミンC（アスコルビン酸等）が配合されている場合がある。また、血行を促進する作用  
2666 を目的として、ビタミンE（トコフェロールコハク酸エステル等）が配合されている場合が  
2667 ある。

2668 これら成分に関する出題については、XIII（滋養強壮保健薬）を参照して作成のこと。

2669 (d) その他

2670 滋養強壮作用を目的として、アミノエチルスルホン酸（タウリン）、グルクロノラクトン、  
2671 ニンジン等が配合されている場合がある。

2672 これら成分に関する出題については、XIII（滋養強壮保健薬）を参照して作成のこと。

2673

2674 ● 漢方処方製剤

2675 女性の月経や更年期障害に伴う諸症状の緩和に用いられる主な漢方処方製剤として、温<sup>うんけい</sup>経湯、  
2676 温<sup>うんせい</sup>清飲、加<sup>か</sup>味<sup>み</sup>逍<sup>しょう</sup>遙<sup>よう</sup>散、桂<sup>けい</sup>枝<sup>し</sup>茯<sup>ふく</sup>苓<sup>りょう</sup>丸、五<sup>ご</sup>積<sup>しゃく</sup>散、柴<sup>さい</sup>胡<sup>こ</sup>桂<sup>けい</sup>枝<sup>し</sup>乾<sup>かん</sup>姜<sup>きょう</sup>湯、四<sup>し</sup>物<sup>つ</sup>湯、桃<sup>とう</sup>核<sup>かく</sup>承<sup>じょう</sup>氣<sup>き</sup>湯、当<sup>とう</sup>歸<sup>くわい</sup>芍<sup>しやく</sup>薬<sup>やく</sup>  
2677 散等がある。

2678 これらのうち、温<sup>うんけい</sup>経湯、加<sup>か</sup>味<sup>み</sup>逍<sup>しょう</sup>遙<sup>よう</sup>散、五<sup>ご</sup>積<sup>しゃく</sup>散、柴<sup>さい</sup>胡<sup>こ</sup>桂<sup>けい</sup>枝<sup>し</sup>乾<sup>かん</sup>姜<sup>きょう</sup>湯、桃<sup>とう</sup>核<sup>かく</sup>承<sup>じょう</sup>氣<sup>き</sup>湯は構成生薬とし  
2679 てカンゾウを含む。カンゾウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題については、II-  
2680 1（咳<sup>せき</sup>止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

2681 また、(感冒に用いられる場合の五積散<sup>ごしやくさん</sup>、便秘に用いられる場合の桃核承気湯<sup>とうかくじょうきとう</sup>を除き、) いずれ  
 2682 も比較的長期間（1ヶ月位）服用されることがあり、その場合に共通する留意点に関する出題に  
 2683 ついては、XIV-1（漢方処方製剤）を参照して問題作成のこと。

2684 (a) 温経湯<sup>うんけいとう</sup>

2685 体力中等度以下で、手足がほてり、唇が乾くものの月経不順、月経困難、こしけ（おりも  
 2686 の）、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎<sup>しん</sup>、足腰の冷え、しもやけ、手あれ（手の湿疹・  
 2687 皮膚炎）に適すとされるが、胃腸の弱い人では、不向きとされる。

2688 (b) 温清飲<sup>うんせいいん</sup>

2689 体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの月経不順、月経困難、  
 2690 血の道症、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎<sup>しん</sup>に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい  
 2691 人では胃部不快感、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2692 まれに重篤な副作用として、肝機能障害を生じることが知られている。

2693 (c) 加味逍遙散<sup>かみしょうようさん</sup>

2694 体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの  
 2695 精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更  
 2696 年期障害、血の道症、不眠症に適すとされるが、胃腸の弱い人では悪心（吐きけ）、嘔吐<sup>おう</sup>、胃  
 2697 部不快感、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2698 まれに重篤な副作用として、肝機能障害、腸間膜静脈硬化症を生じることが知られている。

2699 (d) 桂枝茯苓丸<sup>けいしぶくりょうがん</sup>

2700 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴え  
 2701 るものの、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打  
 2702 ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎<sup>しん</sup>、にきびに適すとされるが、体の虚弱な人（体  
 2703 力の衰えている人、体の弱い人）では不向きとされる。

2704 まれに重篤な副作用として、肝機能障害を生じることが知られている。

2705 (e) 五積散<sup>ごしやくさん</sup>

2706 体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭  
 2707 痛、更年期障害、感冒に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、  
 2708 胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、不向きとされる。

2709 構成生薬としてマオウを含む。マオウを含有する漢方処方製剤に共通する留意点に関する  
 2710 出題については、II-1（咳止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

2711 (f) 柴胡桂枝乾姜湯<sup>さいこけいしかんきょうとう</sup>

2712 体力中等度以下で、冷え症、貧血気味、神経過敏で、動悸<sup>き</sup>、息切れ、ときにねあせ、頭部の  
 2713 発汗、口の渇きがあるものの更年期障害、血の道症、不眠症、神経症、動悸<sup>き</sup>、息切れ、かぜの  
 2714 後期の症状、気管支炎に適すとされる。

2715 まれに重篤な副作用として、間質性肺炎、肝機能障害を生じることが知られている。

2716 (g) 四物湯<sup>しもつとう</sup>

2717 体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの月経不順、  
2718 月経異常、更年期障害、血の道症、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲  
2719 労回復に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸の弱い人、  
2720 下痢しやすい人では、胃部不快感、腹痛、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2721 (h) 桃核承気湯<sup>とうかくじょうきとう</sup>

2722 体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの月経不順、月経困難症、月経痛、月経時  
2723 や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔<sup>じ</sup>疾、打撲  
2724 症に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱く下痢し  
2725 やすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2726 構成生薬としてダイオウを含む。ダイオウを含有する医薬品については、妊婦又は妊娠し  
2727 ていると思われる女性、授乳婦における使用に関して留意される必要があり、Ⅲ－2（腸の  
2728 薬）を参照して問題作成のこと。

2729 (i) 当归芍薬散<sup>とうきしやくやくさん</sup>

2730 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、  
2731 肩こり、耳鳴り、動悸<sup>き</sup>などを訴えるものの月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産  
2732 後あるいは流産による障害（貧血、疲労<sup>けん</sup>倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、  
2733 肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り、~~低~~低血圧に適すとされるが、  
2734 胃腸の弱い人では、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2735

### 2736 3) 相互作用、受診勧奨

2737 【相互作用】 内服で用いられる婦人薬では、通常、複数の生薬成分が配合されている場合が多  
2738 く、他の婦人薬、生薬成分を含有する医薬品（鎮静薬、胃腸薬、内用痔<sup>じ</sup>疾用薬、滋養強壮保健  
2739 薬、漢方処方製剤等）が併用された場合、同じ生薬成分又は同種の作用を示す生薬成分が重複  
2740 摂取となり、効き目が強すぎたり、副作用が起こりやすくなるおそれがある。一般の生活者に  
2741 おいては、「痔<sup>じ</sup>の薬」と「更年期障害の薬」等は影響し合わないとの誤った認識がなされること  
2742 も考えられるので、医薬品の販売等に従事する専門家において適宜注意を促していくことが重  
2743 要である。

2744 何らかの疾患（婦人病に限らない。）のため医師の治療を受けている場合には、婦人薬の使用  
2745 が治療中の疾患に悪影響を及ぼすことがあり、また、動悸<sup>き</sup>や息切れ、めまい、のぼせ等の症状  
2746 が、治療中の疾患に起因する可能性や、処方された薬剤の副作用である可能性も考えられる。  
2747 医師の治療を受けている人では、婦人薬を使用する前に、その適否につき、治療を行っている  
2748 医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

2749

2750 【受診勧奨】 内服で用いられる婦人薬は、比較的作用が穏やかで、ある程度長期間使用することによって効果が得られるとされる。効果の現れ方は、症状や使用する人の体質、体の状態等  
2751 により異なるが、効果がみられないのに漫然と使用を継続することは適当でない。1ヶ月位使  
2752 用して症状の改善がみられず、日常生活に支障を来すようであれば、医療機関を受診するなど  
2753 の対応が必要である。  
2754

2755 月経痛について、年月の経過に伴って次第に増悪していくような場合や大量の出血を伴う場  
2756 合には、子宮内膜症などの病気の可能性がある。月経不順については、卵巣機能の不全による  
2757 場合もあるが、過度のストレスや、不適切なダイエット等による栄養摂取の偏りによって起こ  
2758 ることもあり、月経前症候群を悪化させる要因ともなる。

2759 おりものは女性の生殖器からの分泌物で、卵巣が働いている間は、程度の差はあるものの、  
2760 ほとんどの女性にみられる。おりものの量が急に増えたり、膿のようなおりもの、血液が混じ  
2761 ったおりものが生じたような場合には、膣や子宮に炎症や感染症を起こしている可能性がある。  
2762 特に、月経以外の不規則な出血（不正出血）がある場合には、すみやかに医療機関を受診して  
2763 専門医の診療を受けるなどの対応が必要である。

2764 頭痛やうつ鬱状態、動悸・息切れ等の更年期障害の不定愁訴とされる症状の背景に、原因と  
2765 なる病気が存在する可能性もある。うつ鬱状態については、うつ鬱病等が背景に隠れている場  
2766 合もある。そして、動悸・息切れが心疾患による症状のおそれもある。のぼせやほてり等の症  
2767 状については、高血圧や心臓、甲状腺の病気でも起こることがある。更年期は様々な病気が起  
2768 こりやすい年齢でもあり、そのような原因が見いだされた場合には、その治療が優先される必  
2769 要がある。

2770 医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して、一般用医薬品の使用によ  
2771 る対処は一時的なものに止め、症状が継続するようであれば医療機関を受診するよう促してい  
2772 くことが重要である。  
2773

2773

## 2774 VII 内服アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）（点鼻薬、点眼薬はそれぞれⅧ、Ⅸを参照）

### 2775 1) アレルギーの症状、薬が症状を抑える仕組み

2776 アレルギー（過敏反応）を生じる仕組み等に関する出題については、第1章 II-1)（副作用）  
2777 を参照して作成のこと。どのような物質がアレルゲン（抗原）となってアレルギーを生じるかは、  
2778 人によって異なり、複数の物質がアレルゲンとなることもある。主なものとしては、小麦、卵、  
2779 乳、そば、落花生、えび、かに等の食品、ハウスダスト（室内塵<sup>cxxxiv</sup>）、家庭用品が含有する化学  
2780 物質や金属等が知られており、スギやヒノキ、ブタクサ等の花粉のように季節性<sup>cxxxv</sup>のものもあ

cxxxiv 塵埃、動物の皮膚（フケ）、屋内塵性ダニの糞や死骸等が混じったもの

cxxxv スギ、ヒノキ等の樹木は春が中心であるが、カモガヤ等のイネ科の草本では初夏に、ブタクサやヨモギ等のキク科の草



2781 る。

2782 アレルゲンが皮膚や粘膜から体内に入り込むと、その物質を特異的に認識した免疫グロブリン  
2783（抗体）によって肥満細胞<sup>cxxxvi</sup>が刺激され、細胞間の刺激の伝達を担う生理活性物質であるヒス  
2784タミンやプロスタグランジン等の物質が遊離する。肥満細胞から遊離したヒスタミンは、周囲の  
2785器官や組織の表面に分布する特定のタンパク質（受容体）と反応することで、血管拡張（血管の  
2786容積が拡張する）、血管透過性亢進（血漿タンパク質が組織中に漏出する）等の作用を示す。

2787 なお、蕁麻疹<sup>じんしん</sup>についてはアレルゲンとの接触以外に、皮膚への物理的な刺激等によってヒスタ  
2788ミンが肥満細胞から遊離して生じるもの（寒冷蕁麻疹<sup>じんしん</sup>、日光蕁麻疹<sup>じんしん</sup>、心因性蕁麻疹<sup>じんしん</sup>など）も知ら  
2789れている。また、食品（特に、サバなどの生魚）が傷むとヒスタミンやヒスタミンに類似した物  
2790質（ヒスタミン様物質）が生成することがあり、そうした食品を摂取することによって生じる蕁  
2791麻疹<sup>じんしん</sup>もある。

2792 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎及び副鼻腔炎<sup>くわう</sup>に関する出題については、Ⅷ（鼻に用いる薬）を参  
2793照して作成のこと。

2794 内服アレルギー用薬は、蕁麻疹<sup>じんしん</sup>や湿疹<sup>しん</sup>、かぶれ及びそれらに伴う皮膚の痒み又は鼻炎に用いら  
2795れる内服薬の総称で、ヒスタミンの働きを抑える作用を示す成分（抗ヒスタミン成分）を主体と  
2796して配合されている。また、抗ヒスタミン成分に、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎<sup>くわう</sup>に  
2797よる諸症状の緩和を目的として、鼻粘膜の充血や腫れを和らげる成分（アドレナリン作動成分）  
2798や鼻汁分泌やくしゃみを抑える成分（抗コリン成分）等を組み合わせて配合されたものを鼻炎用  
2799内服薬という。

2800

2801 2) 代表的な配合成分等、主な副作用

2802 (a) 抗ヒスタミン成分

2803 肥満細胞から遊離したヒスタミンが受容体と反応するのを妨げることにより、ヒスタミン  
2804の働きを抑える作用を示す成分（抗ヒスタミン成分）として、クロルフェニラミンマレイン  
2805酸塩、カルビノキサミンマレイン酸塩、クレマスチンフマル酸塩、ジフェンヒドラミン塩酸  
2806塩、ジフェニルピラリン塩酸塩、ジフェニルピラリンテオクル酸塩、トリプロリジン塩酸塩、  
2807メキタジン、アゼラスチン、エメダスチン、ケトチフェンフマル酸塩、エピナスチン塩酸塩、  
2808フェキソフェナジン塩酸塩、ロラタジン等が用いられる。

2809 メキタジンについては、まれに重篤な副作用としてショック（アナフィラキシー）、肝機能  
2810障害、血小板減少を生じることがある。

2811 内服薬として摂取された抗ヒスタミン成分は、吸収されて循環血流に入り全身的に作用す

本では真夏から秋口に花粉が飛散する。

<sup>cxxxvi</sup> マスト細胞ともいい、身体中の血管周囲、特に皮膚・皮下組織、肺、消化管、肝臓に存在しており、免疫機構の一端を担う。なお、肥満細胞の名称は、ヒスタミンやプロスタグランジン等の生理活性物質を細胞内に貯蔵するために細胞自体が大きくなることから付いたものであり、肥満症との関連性はない。

2812 る。例えば、ヒスタミンは、脳の下部にある睡眠・覚醒に大きく関与する部位において覚醒  
2813 の維持・調節を行う働きを担っているが、抗ヒスタミン成分によりヒスタミンの働きが抑え  
2814 られると眠気が促される（I-3（眠気を促す薬）参照。）。重大な事故につながるおそれがあるため、抗ヒスタミン成分が配合された内服薬を服用した後は、乗物又は機械類の運転操作を避けることとされている。

2817 ジフェンヒドラミン塩酸塩、ジフェンヒドラミンサリチル酸塩等のジフェンヒドラミンを  
2818 含む成分については、吸収されたジフェンヒドラミンの一部が乳汁に移行して乳児に昏睡を  
2819 生じるおそれがあるため、母乳を与える女性は使用を避けるか、使用する場合には授乳を避  
2820 ける必要がある。

2821 抗ヒスタミン成分は、ヒスタミンの働きを抑える作用以外に抗コリン作用も示すため、排  
2822 尿困難や口渇、便秘等の副作用が現れることがある。排尿困難の症状がある人、緑内障の診  
2823 断を受けた人では、症状の悪化を招くおそれがあり、使用する前にその適否につき、治療を  
2824 行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

#### 2825 (b) 抗炎症成分

2826 皮膚や鼻粘膜の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウム、グリチ  
2827 ルリチン酸、グリチルリチン酸モノアンモニウム、~~ブロメライン~~、トラネキサム酸等が配合  
2828 されている場合がある。生薬成分として、グリチルリチン酸を含むカンゾウが用いられるこ  
2829 ともある。

2830 これらの成分の働き、副作用等に関する出題については、I-1（かぜ薬）又はII-1（咳  
2831 止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して問題作成のこと。

#### 2832 (c) アドレナリン作動成分

2833 鼻炎用内服薬では、交感神経系を刺激して鼻粘膜の血管を収縮させることによって鼻粘膜  
2834 の充血や腫れを和らげることを目的として、プソイドエフェドリン塩酸塩、フェニレフリン  
2835 塩酸塩、メチルエフェドリン塩酸塩等のアドレナリン作動成分が配合されている場合がある。  
2836 メチルエフェドリン塩酸塩については、血管収縮作用により痒み<sup>かゆ</sup>を鎮める効果を期待して、  
2837 アレルギー用薬でも用いられることがある。

2838 内服薬として摂取されたアドレナリン作動成分は、吸収されて循環血流に入り全身的に作  
2839 用する。プソイドエフェドリン塩酸塩以外のアドレナリン作動成分における留意点等に関す  
2840 る出題については、II-1（咳止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

2841 プソイドエフェドリン塩酸塩については、他のアドレナリン作動成分に比べて中枢神経系  
2842 に対する作用が強く、副作用として不眠や神経過敏が現れることがある。また、交感神経系  
2843 に対する刺激作用によって心臓血管系や肝臓でのエネルギー代謝等への影響も生じやすく、  
2844 心臓病、高血圧、糖尿病又は甲状腺機能障害の診断を受けた人、前立腺肥大による排尿困難  
2845 の症状がある人では、症状を悪化させるおそれがあり、使用を避ける必要がある。自律神経

2846 系を介した副作用として、めまいや頭痛、排尿困難が現れることがある。

2847 パーキンソン病の治療のため医療機関でセレギリン塩酸塩等のモノアミン酸化酵素<sup>cxxxvii</sup>阻  
2848 害剤が処方されて治療を受けている人が、プソイドエフェドリン塩酸塩が配合された鼻炎用  
2849 内服薬を使用した場合、体内でのプソイドエフェドリンの代謝が妨げられて、副作用が現れ  
2850 やすくなるおそれが高く、使用を避ける必要がある。一般用医薬品の販売に従事する専門家  
2851 においては、プソイドエフェドリン塩酸塩が配合された鼻炎用内服薬の購入者等に対して、  
2852 その医薬品を使用しようとする人がモノアミン酸化酵素阻害剤で治療を受けている可能性が  
2853 ある場合には、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に事前に確認するよ  
2854 う説明がなされることが重要である。

2855 なお、プソイドエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリン塩酸塩については、依存性がある  
2856 成分であり、長期間にわたって連用された場合、薬物依存につながるおそれがある。医薬  
2857 品を本来の目的以外の意図で使用する不適正な使用、又はその疑いがある場合における対応  
2858 に関する出題については、第1章 II-2）（不適正な使用と副作用有害事象）を参照して作  
2859 成のこと。

2860 (d) 抗コリン成分

2861 鼻炎用内服薬では、鼻腔内の粘液分泌腺からの粘液の分泌を抑えるとともに、鼻腔内の刺  
2862 激を伝達する副交感神経系の働きを抑えることによって、鼻汁分泌やくしゃみを抑えること  
2863 を目的として、ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド等の抗コリン成分が配合  
2864 されている場合がある。

2865 ベラドンナはナス科の草本で、その葉や根に、副交感神経系から放出されるアセチルコリ  
2866 ンの働きを抑える作用を示すアルカロイドを含む。

2867 抗コリン成分に共通する留意点等に関する出題については、III-3（胃腸鎮痛鎮痙薬）を  
2868 参照して作成のこと。

2869 (e) ビタミン成分

2870 皮膚や粘膜の健康維持・回復に重要なビタミンを補給することを目的として、ビタミンB  
2871 6.6（ピリドキサールリン酸エステル、ピリドキシン塩酸塩）、ビタミンB 2.2（リボフラビン  
2872 リン酸エステルナトリウム等）、パンテノール、パントテン酸カルシウム等、ビタミンC（ア  
2873 スコルビン酸等）、ニコチン酸アミド等が配合されている場合がある。

2874 (f) 生薬成分

2875 ① シンイ

2876 モクレン科の Magnolia biondii Pampanini、ハクモクレン、Magnolia sprengeri  
2877 Pampanini、タムシバ又はコブシタムシバ、コブシ、ボウシュンカ、マダノリア・スプレ

<sup>cxxxvii</sup> 生体物質であるアドレナリンや医薬品として摂取されたプソイドエフェドリンなどの物質の代謝に関与する酵素。

2878 ゲリ又はハクモクレン等の<sup>つぼみ</sup>蓄を基原とする生薬で、鎮静、鎮痛の作用を期待して用いられ  
2879 る。

2880 ② サイシン

2881 ウマノスズクサ科のウスバサイシン又はケイリンサイシン又はウスバサイシンの根及び  
2882 根茎を基原とする生薬で、鎮痛、鎮<sup>がい</sup>咳、利尿等の作用を有するとされ、鼻閉への効果を  
2883 期待して用いられる。

2884 ③ ケイガイ

2885 シソ科のケイガイの花穂を基原とする生薬で、発汗、解熱、鎮痛等の作用を有するとさ  
2886 れ、鼻閉への効果を期待して用いられる。

2887

2888 ● 漢方処方製剤

2889 漢方の考え方に基づく、生体に備わっている自然治癒の働きに不調を生じるのは、体内にお  
2890 ける様々な循環がバランスよく行われないうことによるとされている。漢方処方製剤では、使用す  
2891 る人の体質と症状にあわせて漢方処方が選択されることが重要である。皮膚の症状を主とする人  
2892 に適すとされるものとして、茵陳蒿湯、十味敗毒湯、消風散、当帰飲子等が、鼻の症状を主とす  
2893 る人に適すとされるものとして、葛根湯加川芎辛夷、小青竜湯、荊芥連翹湯、辛夷清肺湯等が  
2894 ある。

2895 これらのうち茵陳蒿湯、辛夷清肺湯を除き、いずれも構成生薬としてカンゾウを含む。また、  
2896 葛根湯加川芎辛夷は、構成生薬としてマオウを含む。構成生薬にカンゾウ又はマオウを含む漢方  
2897 処方製剤に共通する留意点に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰を出しやすくする薬）  
2898 を参照して作成のこと。

2899 また、いずれも比較的長期間（1ヶ月以上）服用されることがあり、その場合に共通する留意  
2900 点に関する出題については、XⅣ－1（漢方処方製剤）を参照して問題作成のこと。

2901 (a) 茵陳蒿湯

2902 体力中等度以上で、口渇があり、尿量少なく、便秘するものの蕁麻疹、口内炎、湿疹・皮膚  
2903 炎、皮膚の痒みに適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸  
2904 が弱く下痢しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとさ  
2905 される。

2906 (b) 十味敗毒湯

2907 体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの化膿性皮膚疾患・急  
2908 性皮膚疾患の初期、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、水虫に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰  
2909 えている人、体の弱い人）、胃腸が弱い人では不向きとされる。

2910 短期間の使用に限られるものではないが、化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、急性湿  
2911 疹に用いる場合は、漫然と長期の使用は避け、1週間位使用して症状の改善がみられないと

2912 きは、いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの対応が必要である。

2913 (c) 消風散

2914 体力中等度以上の人の皮膚疾患で、<sup>かゆ</sup>痒みが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感がある  
2915 ものの湿疹・皮膚炎、<sup>じんしん</sup>蕁麻疹、水虫、あせもに適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えて  
2916 いる人、体の弱い人）、胃腸が弱く下痢をしやすい人では、胃部不快感、腹痛等の副作用が現  
2917 れやすい等、不向きとされる。

2918 (d) 当帰飲子

2919 体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）、  
2920 <sup>かゆ</sup>痒みに適すとされるが、胃腸が弱く下痢をしやすい人では、胃部不快感、腹痛等の副作用が  
2921 現れやすい等、不向きとされる。

2922 (e) 葛根湯加川芎辛夷

2923 比較的体力が<sup>の</sup>あるものの鼻づまり、蓄膿症（<sup>のう</sup>副鼻腔炎）、慢性鼻炎に適すとされるが、体の虚  
2924 弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心、  
2925 胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

2926 (f) 荊芥連翹湯

2927 体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張している  
2928 ものの蓄膿症（<sup>のう</sup>副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきびに適すとされるが、胃腸の弱い人で  
2929 は、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。まれに重篤な副作用として肝  
2930 機能障害、間質性肺炎が現れることが知られている。

2931 (g) 辛夷清肺湯

2932 体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（<sup>のう</sup>副  
2933 鼻腔炎）に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸虚弱で  
2934 冷え症の人では、胃部不快感等の副作用が現れやすいなど、不向きとされている。まれに重  
2935 篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、腸間膜静脈硬化症が現れることが知られている。

2936

### 2937 3) 相互作用、受診勧奨

2938 【相互作用】 一般用医薬品のアレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）は、複数の有効成分が配  
2939 合されている場合が多く、他のアレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）、抗ヒスタミン成分、  
2940 アドレナリン作動成分又は抗コリン成分が配合された医薬品（かぜ薬、睡眠補助薬、乗物酔い  
2941 防止薬、<sup>がい たん</sup>鎮咳去痰薬、<sup>くう</sup>口腔咽喉薬、胃腸鎮痛<sup>けい</sup>鎮痙薬等）などが併用された場合、同じ成分又は  
2942 同種の作用を有する成分が重複摂取となり、効き目が強すぎたり、副作用が起こりやすくなる  
2943 おそれがある。一般の生活者においては、「鼻炎の薬」と「<sup>じんしん</sup>蕁麻疹の薬」等は影響し合わない  
2944 の誤った認識がなされることも考えられるので、医薬品の販売等に従事する専門家において適  
2945 宜注意を促していくことが重要である。

2946 また、アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）と鼻炎用点鼻薬（Ⅷ（鼻に用いる薬）参照。）  
 2947 のように、内服薬と外用薬でも同じ成分又は同種の作用を有する成分が重複することもあり、  
 2948 それらは相互に影響し合わないとの誤った認識に基づいて、併用されることのないよう注意が  
 2949 必要である。

2950 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な事項につい  
 2951 ては、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

2952  
 2953 【受診勧奨】 蕁麻疹<sup>じんしん</sup>や鼻炎等のアレルギー症状に対する医薬品の使用は、基本的に対症療法で  
 2954 ある。一般用医薬品のアレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）は、一時的な症状の緩和に用い  
 2955 られるものであり、長期の連用は避け、5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合に  
 2956 は、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

2957 アレルギー症状を軽減するには、日常生活におけるアレルゲンの除去・回避といった根源的  
 2958 な対応が図られることが重要であり、何がアレルゲンとなって症状が生じているのかが見極め  
 2959 られることが重要である。アレルゲンを厳密に特定するには医療機関における検査を必要とし、  
 2960 その上で、アレルゲンに対して徐々に体を慣らしていく治療法（減感作療法<sup>cxxxviii</sup>）等もある。

2961 皮膚症状が治まると喘息<sup>ぜん</sup>が現れるというように、種々のアレルギー症状が連鎖的に現れるこ  
 2962 とがある。このような場合、一般用医薬品によって一時的な対処を図るよりも、医療機関で総  
 2963 合的な診療を受けた方がよい。

2964 ~~なお、アレルギー症状が現れる前から予防的に一般用医薬品のアレルギー用薬（鼻炎用内服~~  
 2965 ~~薬を含む。）を使用することは適当でない。アレルギー症状に対する医薬品の予防的使用は、医~~  
 2966 ~~師の診断や指導の下で行われる必要がある。~~

2967 また、一般用医薬品（漢方処方製剤を含む。）には、アトピー性皮膚炎<sup>cxxxix</sup>による慢性湿疹<sup>しん</sup>等  
 2968 の治療に用いることを目的とするものはないことから、アトピー性皮膚炎が疑われる場合やそ  
 2969 の診断が確定している場合は、医師の受診を勧めることが重要である。

2970 皮膚感染症（たむし<sup>かいせん</sup>、疥癬<sup>せいせん</sup><sup>oxl</sup>等）により、湿疹<sup>しん</sup>やかぶれ等に似た症状が現れることがある。そ  
 2971 の場合、アレルギー用薬によって一時的に痒み<sup>かゆ</sup>等の緩和を図ることは適当でなく、皮膚感染症  
 2972 そのものに対する対処を優先する必要がある。

2973 医薬品が原因となってアレルギー症状を生じることもあり、使用中に症状が悪化・拡大した  
 2974 ような場合には、医薬品の副作用である可能性を考慮し、その医薬品の服用を中止して、医療  
 2975 機関を受診するなどの対応が必要である。特に、アレルギー用薬の場合、一般の生活者では、

cxxxviii 減感作療法については医師の指導の下に行われるべきものであり、一般の生活者が自己判断によりアレルギーの治療目的でアレルゲンを含む食品を摂取して行うことは、症状の悪化や重篤なアレルギー症状（血圧低下、呼吸困難、意識障害等）を引き起こすおそれがあり、避ける必要がある。

cxxxix 増悪と寛解を繰り返しながら慢性に経過する湿疹<sup>しん</sup>で、多くの場合、気管支喘息<sup>ぜん</sup>、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎等の病歴又は家族歴がある。

oxl ヒゼンダニというダニの一種が皮膚に感染することによって起こる皮膚疾患で、激しい痒み<sup>かゆ</sup>を伴う皮疹<sup>しん</sup>を生じる。

2976 使用目的となる症状（蕁麻疹等）と副作用の症状（皮膚の発疹・発赤等の薬疹）が見分けにく  
2977 いことがあり、医薬品の販売等に従事する専門家において適宜注意を促していくことが重要で  
2978 ある。

2979 鼻炎症状はかぜの随伴症状として現れることも多いが、高熱を伴っている場合には、かぜ以  
2980 外のウイルス感染症やその他の重大な病気である可能性があり、医療機関を受診するなどの対  
2981 応が必要である。

2982

## 2983 VIII 鼻に用いる薬

2984 急性鼻炎は、鼻腔内に付着したウイルスや細菌が原因となって生じる鼻粘膜の炎症で、かぜの  
2985 随伴症状として現れることが多い。アレルギー性鼻炎は、ハウスダストや花粉等のアレルゲンに  
2986 対する過敏反応によって引き起こされる鼻粘膜の炎症で、スギ等の花粉がアレルゲンとなって生  
2987 じるものは一般に「花粉症」と呼ばれる。副鼻腔炎は、こうした鼻粘膜の炎症が副鼻腔にも及ん  
2988 だもので、慢性のものは一般に「蓄膿症」と呼ばれる。

2989 鼻炎用点鼻薬は、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による諸症状のうち、鼻づまり、  
2990 鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）の緩和を目的として、鼻腔内に適用される外用  
2991 液剤である。鼻炎用内服薬との主な違いとしては、鼻粘膜の充血を和らげる成分（アドレナリン  
2992 作動成分）が主体となり、抗ヒスタミン成分や抗炎症成分を組み合わせられても、そ  
2993 れらは鼻腔内における局所的な作用を目的とし、外用痔疾用薬（V-1（痔の薬）参照。）や外皮  
2994 用薬（X（皮膚に用いる薬）参照。）で配合されている場合と同様である。

2995 剤形はスプレー式で鼻腔内に噴霧するものが多い。

2996

2997 【スプレー式鼻炎用点鼻薬に関する一般的な注意事項】 噴霧後に鼻汁とともに逆流する場合が  
2998 あるので、使用前に鼻をよくかんでおくことのほか、使用後には鼻に接した部分を清潔なティ  
2999 ッシュペーパー等で拭き、必ずキャップを閉めた状態で保管し清潔に保っておく必要がある。

3000 また、汚染を防ぐために容器はなるべく直接鼻に触れないようにするほか、他人と点鼻薬を  
3001 共有しないようにする必要がある。

3002

### 3003 1) 代表的な配合成分、主な副作用

#### 3004 (a) アドレナリン作動成分

3005 交感神経系を刺激して鼻粘膜を通っている血管を収縮させることにより、鼻粘膜の充血や  
3006 腫れを和らげることを目的として、ナファゾリン塩酸塩、フェニレフリン塩酸塩、テトラヒ  
3007 ドロゾリン塩酸塩等のアドレナリン作動成分が用いられる。アドレナリン作動成分が配合さ  
3008 れた点鼻薬は、過度に使用されると鼻粘膜の血管が反応しなくなり、逆に血管が拡張して二  
3009 次充血を招き、鼻づまり（鼻閉）がひどくなりやすい。

3010 点鼻薬は局所（鼻腔<sup>くう</sup>内）に適用されるものであるが、成分が鼻粘膜を通っている血管から  
 3011 吸収されて循環血液中に入りやすく、全身的な影響を生じることがある。交感神経系に対す  
 3012 る刺激作用に伴う留意事項等に関する出題については、Ⅱ－1（咳止め・痰<sup>たん</sup>を出しやすくす  
 3013 る薬）を参照して作成のこと。

3014 (b) 抗ヒスタミン成分

3015 アレルギー性鼻炎の発生には、生体内の伝達物質であるヒスタミンが関与している（Ⅶ（内  
 3016 服アレルギー用薬）参照）。また、急性鼻炎の場合も、鼻粘膜が刺激に対して敏感になること  
 3017 から、肥満細胞からヒスタミンが遊離してくしゃみや鼻汁等の症状を生じやすくなる。

3018 ヒスタミンの働きを抑えることにより、それらの症状の緩和することを目的として、クロ  
 3019 ロルフェニラミンマレイン酸塩、ケトチフェンフマル酸塩等の抗ヒスタミン成分が配合されて  
 3020 いる場合がある。

3021 外用薬で用いられる抗ヒスタミン成分に関する出題については、Ⅹ（皮膚に用いる薬）を  
 3022 参照して作成のこと。

3023 (c) ヒスタミンの遊離を抑える成分（抗アレルギー成分）

3024 クロモグリク酸ナトリウムは、肥満細胞からヒスタミンの遊離を抑える作用を示し、花粉、  
 3025 ハウスダスト（室内塵<sup>じん</sup>）等による鼻アレルギー症状の緩和を目的として、通常、抗ヒスタミ  
 3026 ン成分と組み合わせて配合される。

3027 アレルギー性でない鼻炎や副鼻腔炎<sup>くう</sup>に対しては無効であり、アレルギーによる症状か他の  
 3028 原因による症状かはっきりしない人では、使用する前にその適否につき、専門家に相談する  
 3029 等、慎重な考慮がなされるべきである。3日間使用して症状の改善がみられないような場合  
 3030 には、アレルギー以外の原因による可能性が考えられる。

3031 医療機関において減感作療法等のアレルギーの治療を受けている人では、その妨げとなる  
 3032 おそれがあるので、使用前に治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談  
 3033 がなされるなどの対応が必要である。

3034 まれに重篤な副作用として、アナフィラキシーを生じることがある。その他の副作用とし  
 3035 て、鼻出血や頭痛が現れることがある。

3036 なお、症状の改善がみられた場合であっても、2週間を超えて使用した場合の有効性、安  
 3037 全性に関する科学的データは限られていること<sup>exli</sup>、また、鼻アレルギーの要因に対する改善  
 3038 策（花粉、ハウスダスト等のアレルゲンの除去・回避）を講じることも重要であることから、  
 3039 使用の適否につき専門家に相談しながら慎重な判断がなされるべきである。

3040 (d) 局所麻酔成分

3041 鼻粘膜の過敏性や痛みや痒み<sup>かゆ</sup>を抑えることを目的として、リドカイン、リドカイン塩酸塩

<sup>exli</sup> 連用に伴って、他の配合成分（特にアドレナリン作動成分）による影響が生じることも考えられる。



3042 等の局所麻酔成分が配合されている場合がある。

3043 局所麻酔成分に関する出題については、V-1（痔の薬）を参照して作成のこと。

3044 (e) 殺菌消毒成分

3045 鼻粘膜を清潔に保ち、細菌による二次感染を防止することを目的として、ベンザルコニウ  
3046 ム塩化物、ベンゼトニウム塩化物、セチルピリジニウム塩化物のような殺菌消毒成分が配合  
3047 されている場合がある。いずれも陽性界面活性成分で、黄色ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌又  
3048 はカンジダ等の真菌類に対する殺菌消毒作用を示す。結核菌やウイルスには効果がない。

3049 (f) 抗炎症成分

3050 鼻粘膜の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウムが配合されてい  
3051 る場合がある。グリチルリチン酸二カリウムに関する出題については、I-1（かぜ薬）を  
3052 参照して作成のこと。

3053

3054 2) 相互作用、受診勧奨

3055 【相互作用】 アドレナリン作動成分は、鎮咳去痰薬に気管支拡張成分として配合されているほ  
3056 か、外用痔疾用薬に止血成分として配合されていたり、点眼薬にも結膜の充血を取り除く目的  
3057 で配合されている場合もある。また、抗ヒスタミン成分は、かぜ薬の鼻汁止めや睡眠改善薬又  
3058 は乗車酔い防止薬の成分としても配合されている。これらの医薬品との併用がなされた場合、  
3059 同種の作用を有する成分が重複し、効き目が強すぎたり、副作用が現れやすくなるおそれがあ  
3060 る。

3061

3062 【受診勧奨】 一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬の対応範囲は、急性又はアレルギー性の鼻炎及びそ  
3063 れに伴う副鼻腔炎であり、蓄膿症などの慢性のもの<sup>cxlii</sup>は対象となっていない。鼻炎用点鼻薬に  
3064 は、それらの症状を緩和する働きはあるが、その原因そのものを取り除くわけではない。また、  
3065 アドレナリン作動成分のように、鼻以外の器官や臓器に影響を及ぼすおそれがある成分も配合  
3066 されていることから、長期連用は避けることとされており、3日位使用しても症状の改善がみ  
3067 られない場合には、漫然と使用を継続せずに医療機関（耳鼻科）を受診するなどの対応が必要  
3068 である。

3069 かぜ症候群等に伴う鼻炎症状の場合、鼻炎が続くことで副鼻腔炎や中耳炎などにつながるこ  
3070 ともあるため、そのような症状の徴候に対しても注意を促すとともに、中耳炎が発生した場合  
3071 などは医療機関を受診するよう勧めるべきである。

3072 鼻粘膜が腫れてポリープ（鼻茸）<sup>たけ</sup>となっている場合には、一般用医薬品により対処を図るこ  
3073 とは適当でなく、医療機関における治療（ステロイド性抗炎症成分を含む点鼻薬の処方等）が

<sup>cxlii</sup> 蓄膿症、慢性鼻炎等の機能を有する一般用医薬品に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）の漢方処方製剤を参照して作成のこと。

3074 必要となる。

3075

3076 **Ⅸ 眼科用薬**

3077 眼の不調は、一般的に自覚されるものとして、目の疲れやかすみ、<sup>かゆ</sup>痒みなどがある。眼科用薬  
 3078 は、これらの症状の緩和を目的として、結膜囊<sup>のう</sup>（結膜で覆われた<sup>けん</sup>眼瞼（まぶた）の内側と眼球の  
 3079 間の空間）に適用する外用薬（点眼薬、洗眼薬、コンタクトレンズ装着液）である。なお、コンタ  
 3080 クトレンズ装着液については、配合成分としてあらかじめ定められた範囲内の成分<sup>cxliii</sup>のみを含む  
 3081 等の基準に当てはまる製品については、医薬部外品として認められている。

3082 一般用医薬品の点眼薬は、その主たる配合成分から、人工涙液、一般点眼薬、抗菌性点眼薬、  
 3083 アレルギー用点眼薬に大別される。

3084 人工涙液は、涙液成分を補うことを目的とするもので、目の疲れや乾き、コンタクトレンズ装  
 3085 着時の不快感等に用いられる。一般点眼薬は、目の疲れや<sup>かゆ</sup>痒み、結膜充血等の症状を抑える成分  
 3086 が配合されているものである。アレルギー用点眼薬は、花粉、ハウスダスト等のアレルゲンによ  
 3087 る目のアレルギー症状（流涙、目の<sup>かゆ</sup>痒み、結膜充血等）の緩和を目的とし、抗ヒスタミン成分や  
 3088 抗アレルギー成分が配合されているものである。抗菌性点眼薬は、抗菌成分が配合され、結膜炎  
 3089 （はやり目）やものもらい（麦粒腫）、<sup>けん</sup>眼瞼炎（まぶたのただれ）等に用いられるものである。

3090 洗眼薬は、目の洗浄、眼病予防（水泳のあと、<sup>ほこり</sup>埃や汗が目に入ったとき等）に用いられるもの  
 3091 で、主な配合成分として涙液成分のほか、抗炎症成分、抗ヒスタミン成分等が用いられる。

3092

3093 **【点眼薬における一般的な注意】** 点眼薬の使用にあたっての一般的な注意に関する出題につい  
 3094 ては、以下の内容から作成のこと。

3095 ① 点眼方法

3096 点眼薬は、結膜囊<sup>のう</sup>に適用するものであるため、通常、無菌的に製造されている。

3097 点眼の際に容器の先端が<sup>けん</sup>眼瞼（まぶた）や<sup>しやう</sup>睫毛（まつげ）に触れると、雑菌が薬液に混入  
 3098 して汚染を生じる原因となるため、触れないように注意しながら1滴ずつ正確に点眼する。

3099 1滴の薬液の量は約50μL であるのに対して、結膜囊<sup>のう</sup>の容積は30μL 程度とされてお  
 3100 り、一度に何滴も点眼しても効果が増すわけではなく、むしろ薬液が鼻腔内へ流れ込み、鼻  
 3101 粘膜や喉から吸収されて、副作用を起こしやすくなる。

3102 点眼後は、しばらく数秒間、<sup>けん</sup>眼瞼（まぶた）を閉じて、薬液を結膜囊<sup>のう</sup>内に行き渡らせる。そ  
 3103 の際、目頭を押さえると、薬液が鼻腔内へ流れ込むのを防ぐことができ、効果的とされる。

3104 ② 保管及び取扱い上の注意

3105 別の人が使用している点眼薬は、容器の先端が<sup>しやう</sup>睫毛（まつげ）等に触れる等して中身が汚

cxliii アスパラギン酸カリウム、アミノエチルスルホン酸、塩化ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン

3106 染されている可能性があり、共用することは避けることとされている。

3107 また、点眼薬の容器に記載されている使用期限は、未開封の状態におけるものであり、容  
3108 器が開封されてから長期間を経過した製品は、使用を避けるべきである。

3109 ③ コンタクトレンズ使用時の点眼法

3110 コンタクトレンズをしたままでの点眼は、ソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレ  
3111 ンズに関わらず、添付文書に使用可能と記載されてない限り行うべきでない。

3112 通常、ソフトコンタクトレンズは水分を含みやすく、防腐剤（ベンザルコニウム塩化物、  
3113 パラオキシ安息香酸ナトリウム等）などの配合成分がレンズに吸着されて、角膜に障害を引  
3114 き起こす原因となるおそれがあるため、装着したままの点眼は避けることとされている製品  
3115 が多い。ただし、1回使い切りタイプとして防腐剤を含まない製品では、ソフトコンタクト  
3116 レンズ装着時にも使用できるものがある。

3117

3118 【眼科用薬に共通する主な副作用】 局所性の副作用として、目の充血や痒み、腫れがあらわれ  
3119 ることがある。これらの副作用は、点眼薬が適応とする症状と区別することが難しい場合があ  
3120 り、点眼用薬を一定期間使用して症状の改善がみられない場合には、副作用の可能性も考慮し、  
3121 漫然と使用を継続せずに、専門家に相談がなされることが重要である。

3122 全身性の副作用としては、皮膚に発疹、発赤、痒み等が現れることがある。この場合、一般  
3123 の生活者においては、原因が眼科用薬によるものと思わず、アレルギー用薬や外皮用薬が  
3124 使用されることがあるので、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して  
3125 適切な助言を行っていくことが重要である。

3126

3127 【相互作用】 医師から処方された点眼薬を使用している場合には、一般用医薬品の点眼薬を併  
3128 用すると、治療中の疾患に悪影響を生じることがあり、また、目のかすみや充血等の症状が、  
3129 治療中の疾患に起因する可能性や、処方された薬剤の副作用である可能性も考えられる。医師  
3130 の治療を受けている人では、一般用医薬品の点眼薬を使用する前に、その適否につき、治療を  
3131 行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

3132

3133 【受診勧奨】 一般用医薬品の点眼薬には、緑内障の症状を改善できるものはなく、目のかすみ  
3134 が緑内障による症状であった場合には効果が期待できないばかりでなく、配合されている成分  
3135 によっては、緑内障の悪化につながるおそれがある場合がある。

3136 また、目の痛みが激しい場合には、急性緑内障、角膜潰瘍、眼球への外傷等を生じている可  
3137 能性があり、その場合、すみやかに眼科専門医による適切な処置が施されなければ、視力障害  
3138 等の後遺症を生じるおそれがある。

3139 目の症状には、視力の異常、目（眼球、眼瞼等）の外観の変化、目の感覚の変化等がある。こ

3140 れらの症状が現れた時、目そのものが原因であることが多いが、目以外の病気による可能性も  
3141 あり、特に脳が原因であることが多く知られている。

3142 医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して、目に何らかの異常が現れ  
3143 たときには医療機関を受診し、専門医の診療を受けるように促すべきである。

3144

3145 1) 目の調節機能を改善する配合成分

3146 自律神経系の伝達物質であるアセチルコリンは、水晶体の周りを囲んでいる毛様体に作用して、  
3147 目の調節機能に関与している。目を酷使すると、アセチルコリンを分解する酵素（コリンエステ  
3148 ラーゼ）の働きが活発になり、目の調節機能が低下し、目の疲れやかすみといった症状を生じる。

3149 ネオスチグミンメチル硫酸塩は、コリンエステラーゼの働きを抑える作用を示し、毛様体にお  
3150 けるアセチルコリンの働きを助けることで、目の調節機能を改善する効果を目的として用いられ  
3151 る。

3152

3153 2) 目の充血、炎症を抑える配合成分

3154 (a) アドレナリン作動成分

3155 結膜を通っている血管を収縮させて目の充血を除去することを目的として、ナファゾリン  
3156 塩酸塩、ナファゾリン硝酸塩、エフェドリン塩酸塩、テトラヒドロゾリン塩酸塩等のアドレ  
3157 ナリン作動成分が配合されている場合がある。

3158 緑内障と診断された人では、眼圧の上昇をまねき、緑内障を悪化させたり、その治療を妨  
3159 げるおそれがあるため、使用前にその適否につき、治療を行っている医師又は治療薬の調剤  
3160 を行った薬剤師に相談がなされるべきである。

3161 連用又は頻回に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがある。  
3162 また、長引く目の充血症状は、目以外の異変を含む、重大な疾患による可能性も考えられる  
3163 ため、5～6日間使用して症状の改善がみられない場合には、漫然と使用を継続することな  
3164 く、医療機関（眼科）を受診する必要性を含め、専門家に相談がなされるべきである。

3165 (b) 抗炎症成分

3166 ① ~~リゾチーム塩酸塩~~、グリチルリチン酸二カリウム、~~ベルベリン硫酸塩~~

3167 比較的緩和な抗炎症作用を示す成分として、~~リゾチーム塩酸塩~~やグリチルリチン酸二カ  
3168 リウムが用いられる。これら成分の働き等に関する出題については、I-1（かぜ薬）を  
3169 参照して作成のこと。また、ベルベリンによる抗炎症作用を期待して、ベルベリン硫酸塩  
3170 が配合されている場合もある。

3171 ~~リゾチーム塩酸塩については、点眼薬の配合成分として使用された場合であっても、ま  
3172 れにショック（アナフィラキシー）のような全身性の重大な副作用を生じることがある。  
3173 リゾチーム塩酸塩が配合された医薬品や鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある~~

3174 ~~人では、使用を避ける必要がある。~~

3175 ② イブシロン-アミノカプロン酸

3176 炎症の原因となる物質の生成を抑える作用を示し、目の炎症を改善する効果を期待して  
3177 用いられる。

3178 ③ プラノプロフェン

3179 非ステロイド性抗炎症成分（X-2）-（b）参照。）であり、炎症の原因となる物質の生  
3180 成を抑える作用を示し、目の炎症を改善する効果を期待して用いられる。

3181  
3182 (c) 組織修復成分

3183 炎症を生じた眼粘膜の組織修復を促す作用を期待して、アズレンスルホン酸ナトリウム（水  
3184 溶性アズレン）やアラントインが配合されている場合がある。

3185 (d) 収斂成分<sup>れん</sup>

3186 眼粘膜のタンパク質と結合して皮膜を形成し、外部の刺激から保護する作用を期待して、  
3187 硫酸亜鉛水和物が配合されている場合がある。

3188  
3189 3) 目の乾きを改善する配合成分

3190 ~~結膜や角膜の乾燥を防ぐことを目的として、コンドロイチン硫酸ナトリウムや精製ヒアルロン~~  
3191 ~~酸ナトリウムが用いられる。同様の効果を期待して、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポ~~  
3192 ~~リビニルアルコール（部分けん<sup>けん</sup>酸化物）が配合されている場合もある。~~

3193 ~~ヒアルロン酸ナトリウムは、有効成分としてではなく添加物（粘<sup>ちゆう</sup>稠化剤）として用いられ、コ~~  
3194 ~~ンドロイチン硫酸ナトリウムと結合することにより、その粘<sup>ちゆう</sup>稠性を高める。~~

3195  
3196 4) 目の痒み<sup>かゆ</sup>を抑える配合成分

3197 (a) 抗ヒスタミン成分

3198 アレルギーによる目の痒み<sup>かゆ</sup>の発生には、生体内の伝達物質であるヒスタミンが関与してい  
3199 る（Ⅶ（内服アレルギー用薬）参照）。また、結膜に炎症を生じたような場合も、眼粘膜が刺  
3200 激に対して敏感になり、肥満細胞からヒスタミンが遊離<sup>かゆ</sup>して痒みの症状を生じやすくなる。

3201 ヒスタミンの働きを抑えることにより、目の痒み<sup>かゆ</sup>を和らげることを目的として、ジフェン  
3202 ヒドラミン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ケトチフェンフマル酸塩等の抗ヒス  
3203 タミン成分が配合されている場合がある。鼻炎用点鼻薬と併用した場合には、眠気が現れる  
3204 ことがあるため、乗物又は機械類の運転操作を避ける必要がある。

3205 その他、外用薬で用いられる抗ヒスタミン成分に関する出題については、X（皮膚に用い  
3206 る薬）を参照して作成のこと。

3207 (b) 抗アレルギー成分

3208 クロモグリク酸ナトリウムは、肥満細胞からのヒスタミン遊離を抑える作用を示し（Ⅷ（鼻  
3209 に用いる薬）参照。）、花粉、ハウスダスト（室内塵）等による目のアレルギー症状（結膜充  
3210 血、<sup>かゆ</sup>痒み、かすみ、流涙、異物感）の緩和を目的として、通常、抗ヒスタミン成分と組み合わ  
3211 せて配合される。

3212 アレルギー性でない結膜炎等に対しては無効であり、アレルギーによる症状か他の原因に  
3213 よる症状かはっきりしない人（特に、片方の目だけに症状がみられる場合や、目の症状のみ  
3214 で鼻には症状がみられない場合、視力の低下を伴うような場合）では、使用する前にその適  
3215 否につき、専門家に相談する等、慎重な考慮がなされるべきである。2日間使用して症状の  
3216 改善がみられないような場合にも、アレルギー以外の原因による可能性が考えられる。

3217 点眼薬の配合成分として使用された場合であっても、まれに重篤な副作用として、アナフ  
3218 ィラキシーを生じることがある。

3219 その他、クロモグリク酸ナトリウムに関する出題については、Ⅷ（鼻に用いる薬）を参照  
3220 して作成のこと。

3221

3222 5) 抗菌作用を有する配合成分

3223 (a) サルファ剤

3224 細菌感染（ブドウ球菌や連鎖球菌）による結膜炎やものもらい（麦粒腫）、<sup>けん</sup>眼瞼炎などの化  
3225 膿性の症状の改善を目的として、スルファメトキサゾール、スルファメトキサゾールナトリ  
3226 ウム等のサルファ剤が用いられる。なお、すべての細菌に対して効果があるというわけでは  
3227 なく、また、ウイルスや真菌の感染に対する効果はないので、3～4日使用しても症状の改  
3228 善がみられない場合には、眼科専門医の診療を受けるなどの対応が必要である。

3229 サルファ剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人では、使用を避けるべきである。

3230 (b) ホウ酸

3231 洗眼薬として用時水に溶解し、結膜囊<sup>のう</sup>の洗浄・消毒に用いられる。また、その抗菌作用に  
3232 よる防腐効果を期待して、点眼薬の添加物（防腐剤）として配合されていることもある。

3233

3234 6) その他の配合成分（無機塩類、ビタミン類、アミノ酸）と配合目的

3235 (a) 無機塩類

3236 涙液の主成分はナトリウムやカリウム等の電解質であるため、配合成分として塩化カリウ  
3237 ム、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、硫酸マグネシウム、リン酸水素ナトリウム、リン酸二  
3238 水素カリウム等が用いられる。

3239 (b) ビタミン成分

3240 ① ビタミンA（パルミチン酸レチノール、酢酸レチノール等）

3241 ビタミンAは、視細胞が光を感受する反応に関与していることから、視力調整等の反応を

3242 改善する効果を期待して用いられる。

3243 ② ビタミンB2（フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム等）

3244 リボフラビンの活性体であるフラビンアデニンジヌクレオチドは、角膜の酸素消費能を  
3245 増加させ組織呼吸を亢進し、ビタミンB2欠乏が関与する角膜炎に対して改善効果を期待  
3246 して用いる。

3247 ③ パンテノール、パントテン酸カルシウム等

3248 パンテノール、パントテン酸カルシウム等は、自律神経系の伝達物質の産生に重要な成分  
3249 であり、目の調節機能の回復を促す効果を期待して用いられる。

3250 ④ ビタミンB6（ピリドキシン塩酸塩等）

3251 ビタミンB6は、アミノ酸の代謝や神経伝達物質の合成に関与していることから、目の疲  
3252 れ等の症状を改善する効果を期待して用いられる。

3253 ⑤ ビタミンB12（シアノコバラミン等）

3254 目の調節機能を助ける作用を期待して用いられる。

3255 ⑥ ビタミンE（トコフェロール酢酸エステル等）

3256 末梢の微小循環を促進させることにより、結膜充血、疲れ目等の症状を改善する効果を期  
3257 待して用いられる。

3258 (c) アミノ酸成分

3259 新陳代謝を促し、目の疲れを改善する効果を期待して、アスパラギン酸カリウム、アスパラ  
3260 ギン酸マグネシウム等が配合されている場合がある。

3261

## 3262 X 皮膚に用いる薬

3263 外皮用薬は、皮膚表面に生じた創傷や症状、又は皮膚の下にある毛根、血管、筋組織、関節等  
3264 の症状を改善・緩和するため、外用局所に直接適用される医薬品である。

3265 外皮用薬を使用する際には、適用する皮膚表面に汚れや皮脂が多く付着していると有効成分の  
3266 浸透性が低下するため、患部を清浄にしてから使用することが重要である（水洗に限らず、清浄  
3267 綿を用いて患部を清拭する等の方法でもよい）。また、表皮の角質層が柔らかくなることで有効成  
3268 分が浸透しやすくなることから、入浴後に用いるのが効果的とされる。

3269

3270 【剤形による取扱い上の注意】 剤形による取扱い上の注意事項に関する出題については、以下  
3271 の内容から作成のこと。

3272 ① 塗り薬（軟膏剤、クリーム剤）

3273 薬剤を容器から直接指に取り、患部に塗布したあと、また指に取ることを繰り返すと、容  
3274 器内に雑菌が混入するおそれがある。いったん手の甲などに必要量を取ってから患部に塗布  
3275 することが望ましい。

3276 また、塗布したあと手に薬剤が付着したままにしておくと、薬剤が目や口の粘膜等に触れ  
3277 て刺激感等を生じるおそれがあるため、手についた薬剤を十分に洗い流すべきである。

3278 ② 貼付剤（テープ剤、パップ剤）

3279 患部やその周囲に汗や汚れ等が付着した状態で貼付すると、有効成分の浸透性が低下する  
3280 ほか、剥がれやすくなるため十分な効果が得られない。

3281 同じ部位に連続して貼付すると、かぶれ等を生じやすくなる。

3282 ③ スプレー剤、エアゾール剤

3283 強い刺激を生じるおそれがあるため、目の周囲や粘膜（口唇等）への使用は避けることと  
3284 されている。それ以外の部位でも、至近距離から噴霧したり、同じ部位に連続して噴霧する  
3285 と、凍傷を起こすことがある。使用上の注意に従い、患部から十分離して噴霧し、また、連  
3286 続して噴霧する時間は3秒以内とすることが望ましい。使用時に振盪が必要な製品では、容  
3287 器を振ってから噴霧する。

3288 吸入によりめまいや吐きけ等を生じることがあるので、できるだけ吸入しないよう、また、  
3289 周囲の人にも十分注意して使用する必要がある。

3290

3291 【外皮用薬に共通する主な副作用】 局所性の副作用として、適用部位に発疹・発赤、痒み等が  
3292 現れることがある。これらの副作用は、外皮用薬が適応とする症状と区別することが難しい場  
3293 合があり、外皮用薬を一定期間使用しても症状の改善がみられない場合には、漫然と使用を継  
3294 続することなく、副作用の可能性も考慮して、専門家に相談することが重要である。

3295

3296 1) きず口等の殺菌消毒成分

3297 殺菌消毒薬は、日常の生活において生じる、比較的小さなきり傷、擦り傷、掻き傷等の創傷面  
3298 の化膿を防止すること、又は手指・皮膚の消毒を目的として使用される一般用医薬品である。

3299 殺菌消毒薬のうち、配合成分やその濃度、効能・効果等があらかじめ定められた範囲内である  
3300 製品については、医薬部外品（きず消毒保護剤等）として製造販売されているが、火傷（熱傷）  
3301 や化膿した創傷面の消毒、口腔内の殺菌・消毒などを併せて目的とする製品については、医薬品  
3302 としてのみ認められている。

3303 手指・皮膚の消毒のほか、器具等の殺菌・消毒を目的とする製品に関する出題については、X  
3304 V-1（消毒薬）を参照して作成のこと。

3305 (a) アクリノール

3306 黄色の色素で、一般細菌類の一部（連鎖球菌、黄色ブドウ球菌などの化膿菌）に対する殺  
3307 菌消毒作用を示すが、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない。

3308 比較的刺激性が低く、創傷患部にしみにくい。衣類等に付着すると黄色く着色し、脱色し  
3309 にくくなることもある。



3310 腸管内における殺菌消毒作用を期待して、内服薬（止瀉薬）で用いられるアクリノールに  
 3311 関する出題については、Ⅲ－2（腸の薬）を参照して作成のこと。

3312 (b) オキシドール（過酸化水素水）

3313 一般細菌類の一部（連鎖球菌、黄色ブドウ球菌などの化膿菌）に対する殺菌消毒作用を示  
 3314 す~~が、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない~~。オキシドールの作用は、過酸化水素  
 3315 の分解に伴って発生する活性酸素による酸化、及び発生する酸素による泡立ちによる物理的  
 3316 な洗浄効果であるため、作用の持続性は乏しく、また、組織への浸透性も低い。

3317 刺激性があるため、目の周りへの使用は避ける必要がある。

3318 (c) ヨウ素系殺菌消毒成分

3319 ヨウ素による酸化作用により、結核菌を含む一般細菌類、真菌類、ウイルスに対して殺菌  
 3320 消毒作用を示す。ヨウ素の殺菌力はアルカリ性になると低下するため、石けん~~等~~と併用す  
 3321 る場合には、石けん~~成分~~をよく洗い落としてから使用するべきである。

3322 外用薬として用いた場合でも、まれにショック（アナフィラキシー）のような全身性の重  
 3323 篤な副作用を生じることがある。ヨウ素に対するアレルギーの既往がある人<sup>cxliv</sup>では、使用を  
 3324 避ける必要がある。

3325 ① ポビドンヨード

3326 ヨウ素をポリビニルピロリドン（PVP）と呼ばれる担体に結合させて水溶性とし、  
 3327 徐々にヨウ素が遊離して殺菌作用を示すように工夫されたもの。

3328 口腔咽喉薬や含嗽薬として用いられる場合より高濃度で配合されているため、誤って  
 3329 原液を口腔粘膜に適用しないよう注意する必要がある。

3330 ② ヨードチンキ

3331 ヨウ素及びヨウ化カリウムをエタノールに溶解させたもので、皮膚刺激性が強く、粘  
 3332 膜（口唇等）や目の周りへの使用は避ける必要がある。また、化膿している部位では、  
 3333 かって症状を悪化させるおそれがある。

3334 ~~マーキュロクロム液と混ぜると不溶性沈殿を生じて殺菌作用が低下するため、マーキ  
 3335 ュロクロム液と同時に使用しないこととされている。~~

3336 (d) ベンザルコニウム塩化物、ベンゼトニウム塩化物、セチルピリジニウム塩化物

3337 これら成分に関する出題については、Ⅷ（鼻に用いる薬）を参照して作成のこと。これら  
 3338 と同種の成分（陽性界面活性成分）として、セトリミドが配合されている場合もある。

3339 いずれも石けん~~と~~の混合によって殺菌消毒効果が低下するので、石けん~~で~~洗浄した後  
 3340 に使用する場合には、石けん~~を~~十分に洗い流す必要がある。

3341 (e) クロルヘキシジングルコン酸塩、クロルヘキシジン塩酸塩

<sup>cxliv</sup> 医療用の造影剤などにもヨウ素が含まれているものが多いことから、造影剤によるアレルギーがある場合にもヨウ素を含むものの使用は避けることを考慮すべきである。

3342 一般細菌類、真菌類に対して比較的広い殺菌消毒作用を示すが、結核菌やウイルスに対す  
3343 る殺菌消毒作用はない。

3344 ~~(f) マーキュロクロム~~

3345 ~~一般細菌類の一部（連鎖球菌、黄色ブドウ球菌などの化膿菌<sup>のう</sup>）に対する殺菌消毒作用を示~~  
3346 ~~すが、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない。有機水銀の一種であるが、皮膚浸透~~  
3347 ~~性が低く、通常の使用において水銀中毒を生じることはない。ただし、口の周りや口が触れ~~  
3348 ~~る部位（乳頭等）への使用は避ける必要がある。~~

3349 ~~ヨードチンキと混合すると不溶性沈殿を生じて殺菌作用が低下するため、ヨードチンキと~~  
3350 ~~同時に使用しないこととされている。~~

3351 ~~(g) (f)~~ エタノール（消毒用エタノール）

3352 手指・皮膚の消毒、器具類の消毒のほか、創傷面の殺菌・消毒にも用いられることがある。  
3353 皮膚刺激性が強いため、患部表面を軽く清拭するにとどめ、脱脂綿やガーゼに浸して患部に  
3354 貼付することは避けるべきとされている。また、粘膜（口唇等）や目の周りへの使用は避け  
3355 る必要がある。

3356 その他、エタノール（消毒用エタノール）に関する出題については、X V（公衆衛生用薬）  
3357 を参照して作成のこと。

3358 ~~(h) (g)~~ その他

3359 イソプロピルメチルフェノール、チモール、フェノール（液状フェノール）、レゾルシンは、  
3360 細菌や真菌類のタンパク質を変性させることにより殺菌消毒作用を示し、患部の化膿<sup>のう</sup>を防ぐ  
3361 ことを目的として用いられる。

3362 レゾルシンについては、角質層を軟化させる作用もあり、にきび用薬やみずむし・たむし  
3363 用薬などに配合されている場合がある。

3364 【一般的な創傷への対応】 出血しているときは、創傷部に清潔なガーゼやハンカチ等を当てて  
3365 圧迫し、止血する（5分間程度は圧迫を続ける）。このとき、創傷部を心臓より高くして圧迫す  
3366 ると、止血効果が高い。

3367 火傷（熱傷）の場合は、できるだけ早く、水道水などで熱傷部を冷やすことが重要である。  
3368 軽度の熱傷であれば、痛みを感じなくなるまで（15～30分間）冷やすことで、症状の悪化  
3369 を防ぐことができる。冷やした後は、水疱<sup>ほう</sup>（水ぶくれ）を破らないように<sup>exlv</sup>ガーゼ等で軽く覆  
3370 うとよいとされている。

3371 創傷面が汚れているときには、水道水などきれいな水でよく洗い流し、汚れた手で直接触れ  
3372 ないようにするべきである。水洗が不十分で創傷面の内部に汚れが残ったまま、創傷表面を乾  
3373 燥させるタイプの医薬品を使用すると、内部で雑菌が増殖して化膿<sup>のう</sup>することがある。

<sup>exlv</sup> 水疱<sup>ほう</sup>が破れると、そこから感染を起こして化膿<sup>のう</sup>することがある。

3374 通常、人間の外皮表面には「皮膚常在菌」が存在しており、化膿<sup>のう</sup>の原因となる黄色ブドウ球  
3375 菌、連鎖球菌等の増殖を防いでいる。創傷部に殺菌消毒薬を繰り返し適用すると、皮膚常在菌  
3376 が殺菌されてしまい、また、殺菌消毒成分により組織修復が妨げられて、かえって治癒しにく  
3377 くなったり、状態を悪化させることがある。

3378 最近では、創傷面に浸出してきた液の中に表皮再生の元になる細胞を活性化させる成分が含  
3379 まれているため乾燥させない方が早く治癒するという考えも広まってきており、創傷面を乾燥  
3380 させない絆創膏<sup>ばんそうこう</sup>も販売されている。

3381

3382 【受診勧奨】 出血が止まらない又は著しい場合、患部が広範囲な場合、ひどい火傷の場合には、  
3383 状態が悪化するおそれがある。特に低温火傷は、表面上は軽症に見えても、組織の損傷が深部  
3384 に達している場合があり、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

3385 また、殺菌消毒成分はすべての細菌やウイルスに対して効果があるわけではなく、5～6日経  
3386 過して痛みが強くなってくる、又は傷の周囲が赤く、化膿<sup>のう</sup>しているような場合には、医療機関  
3387 （外科又は皮膚科）を受診するなどの対応が必要である。

3388

3389 2) 痒み<sup>かゆ</sup>、腫れ、痛み等を抑える配合成分

3390 (a) ステロイド性抗炎症成分

3391 副腎皮質ホルモン（ステロイドホルモン）の持つ抗炎症作用に着目し、それと共通する化  
3392 学構造（ステロイド骨格）を持つ化合物が人工的に合成され、抗炎症成分（ステロイド性抗  
3393 炎症成分）として用いられる。主なステロイド性抗炎症成分としては、デキサメタゾン、プ  
3394 レドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、プレドニゾロン酢酸エステル、ヒドロコルチゾ  
3395 ン、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ヒドロコルチゾン酢酸エステル等がある。外用の場合  
3396 はいずれも末梢組織（患部局所）における炎症を抑える作用を示し、特に、痒み<sup>かゆ</sup>や発赤など  
3397 の皮膚症状を抑えることを目的として用いられる。

3398 一方、好ましくない作用として末梢組織の免疫機能を低下させる作用も示し、細菌、真菌、  
3399 ウイルス等による皮膚感染（みずむし・たむし等の白癬症<sup>せん</sup>、にきび、化膿<sup>のう</sup>症状）や持続的な  
3400 刺激感の副作用が現れることがある。水痘<sup>とう</sup>（水疱瘡<sup>ぼうそう</sup>）、みずむし、たむし等又は化膿<sup>のう</sup>している  
3401 患部については症状を悪化させるおそ<sup>おそ</sup>恐れがあり、使用を避ける必要がある。

3402 外皮用薬で用いられるステロイド性抗炎症成分は、体の一部分に生じた湿疹<sup>しん</sup>、皮膚炎、か  
3403 ぶれ、あせも、虫さされ等の一時的な皮膚症状（ほてり・腫れ<sup>かゆ</sup>・痒み等）の緩和を目的とする  
3404 ものであり、広範囲に生じた皮膚症状や、慢性の湿疹<sup>しん</sup>・皮膚炎を対象とするものではない。

3405 ステロイド性抗炎症成分をコルチゾンに換算して1 g又は1 mL中0.025mgを超えて含有す  
3406 る製品では、特に長期連用を避ける必要がある。医薬品の販売等に従事する専門家において  
3407 は、まとめ買いや頻回に購入する購入者<sup>しん</sup>等に対して、注意を促していくことが重要である。

3408 短期間の使用であっても、患部が広範囲にわたっている人では、ステロイド性抗炎症成分  
 3409 を含有する医薬品が患部全体に使用されると、ステロイド性抗炎症成分の吸収量が相対的に  
 3410 多くなるため、適用部位を限る等、過度の使用を避けるべきである。

3411 (b) 非ステロイド性抗炎症成分

3412 分子内に~~ステロイド骨格副腎皮質ホルモン（ステロイドホルモン）と共通する化学構造を~~  
 3413 ~~持たず、プロスタグランジンの産生を抑える作用（抗炎症作用）を示す成分を非ステロイド~~  
 3414 ~~性抗炎症薬成分（NSAIDs）という。~~

3415 ① 皮膚の炎症によるほてりや<sup>かゆ</sup>痒み等の緩和を目的として用いられる成分

3416 ~~【ブフェキサマク<sup>exlvi</sup>】—湿疹、皮膚炎、かぶれ、日焼け、あせも等による皮膚症状の緩和~~  
 3417 ~~を目的として用いられる。まれに重篤な副作用として、接触皮膚炎を生じることがある。~~  
 3418 ~~その他の副作用として、腫れ、刺激感（ヒリヒリ感）、光線過敏症、しみ（色素沈着）、皮~~  
 3419 ~~膚乾燥が現れることがある。~~

3420 【ウフェナマート】 末梢組織（患部局所）におけるプロスタグランジンの産生を抑える  
 3421 作用については必ずしも明らかにされておらず、炎症を生じた組織に働いて、細胞膜の  
 3422 安定化、活性酸素の生成抑制などの作用により、抗炎症作用を示すと考えられている。

3423 湿疹<sup>しん</sup>、皮膚炎、かぶれ、あせも等による皮膚症状の緩和を目的として用いられる。副  
 3424 作用として、刺激感（ヒリヒリ感）、熱感、乾燥感が現れることがある。

3425 ② 筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫等による鎮痛等を目的として用いられる成分

3426 非ステロイド性抗炎症成分のうち、インドメタシン、ケトプロフェン、フェルビナク、  
 3427 ピロキシカム、ジクロフェナクナトリウムについては、皮膚の下層にある骨格筋や関節部  
 3428 まで浸透してプロスタグランジンの産生を抑える作用を示し、筋肉痛、関節痛、肩こりに  
 3429 伴う肩の痛み、腰痛、<sup>けんしやう</sup>腱鞘炎、肘の痛み（テニス肘等）、打撲、捻挫に用いられる。

3430 これらは過度に使用しても鎮痛効果が増すことはなく、また、その場合の安全性は確認  
 3431 されていないため、塗り薬又はエアゾール剤については1週間あたり50g（又は50mL）を  
 3432 超えての使用、貼付剤については連続して2週間以上の使用は避けることとされている製  
 3433 品が多い。いずれも長期連用を避ける必要があり、医薬品の販売等に従事する専門家にお  
 3434 いては、まとめ買いや頻回に購入する<sup>けんしやう</sup>購入者<sup>けんしやう</sup>に対して、注意を促していくことが重要であ  
 3435 る。また、殺菌作用はないため、皮膚感染症に対しては効果がなく、痛みや腫れを鎮める  
 3436 ことでかえって皮膚感染が自覚されにくくなる（不顕性化する）おそれがあるため、みず  
 3437 むし、たむし等又は化膿<sup>のう</sup>している患部への使用は避ける必要がある。

3438 内服で用いられる解熱鎮痛成分と同様、<sup>ぜん</sup>喘息<sup>ぜん</sup>の副作用（I-2（解熱鎮痛薬）参照。）を

<sup>exlvi</sup>—2010年4月に欧州医薬品庁の諮問委員会が、ブフェキサマクは重篤な接触性アレルギー反応のリスクが高く、本剤を使用する有益性が危険性を上回るものではないと結論付け、全てのブフェキサマク含有医薬品の販売承認を取り消すべきであることの勧告を出したことを受け、本国においては、自主的な取り組みとしてブフェキサマク製剤の販売は終了されている。

3439 引き起こす可能性があるため、喘息<sup>ぜんそく</sup>を起こしたことがある人では、使用を避ける必要がある。  
 3440 える。また、吸収された成分の一部が循環血液中に入る可能性があり、妊婦又は妊娠している  
 3441 と思われる女性では、胎児への影響<sup>exlvii</sup>を考慮して、使用を避けるべきである。

3442 小児への使用については有効性・安全性が確認されておらず、インドメタシンを主薬と  
 3443 する外皮用薬では、11歳未満の小児（インドメタシン含量1%の貼付剤では15歳未満  
 3444 の小児）、その他の成分を主薬とする外用鎮痛薬では、15歳未満の小児向けの製品はない。

3445 【インドメタシン】 適用部位の皮膚に、腫れ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感が現れること  
 3446 があるため、皮膚が弱い人がインドメタシン含有の貼付剤を使用する際には、あらかじめ  
 3447 1～2cm角の小片を腕の内側等の皮膚の薄い部位に半日以上貼ってみて、皮膚に異常  
 3448 を生じないことを確認することが推奨されている。

3449 【ケトプロフェン】 チアプロフェン酸、スプロフェン、フェノフィブラート（いずれも  
 3450 医療用医薬品の有効成分<sup>exlviii</sup>）又はオキシベンゾン、オクトクリレン（化粧品や医薬部外  
 3451 品に紫外線吸収剤として配合される化合物）のような物質でアレルギー感作<sup>cxlix</sup>された人  
 3452 は、それらと分子の化学構造が類似しているケトプロフェンでもアレルギーを起こすお  
 3453 それが大きいことから、これらの成分でアレルギー症状（発疹<sup>しん</sup>・発赤<sup>かゆみ</sup>、かぶれ等）  
 3454 を起こしたことがある人については、使用を避けることとされている。

3455 まれに重篤な副作用として、アナフィラキシー、接触皮膚炎、光線過敏症を生じること  
 3456 がある。紫外線により、使用中又は使用後しばらくしてから重篤な光線過敏症が現れ  
 3457 ることがあるため、ケトプロフェンが配合された外皮用薬を使用している間及び使用後  
 3458 も当分の間は、天候にかかわらず、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も塗布部  
 3459 を衣服、サポーター等で覆い、紫外線に当たるのを避ける必要がある。ただし、ラップ  
 3460 フィルム等の通気性の悪いもので覆うことは適当でない。

3461 その他の副作用として、腫れ、刺激感、水疱<sup>ほう</sup>・ただれ、色素沈着、皮膚乾燥が現れるこ  
 3462 とがある。

3463 【ピロキシカム】 今のところ重篤なものは知られていないが、光線過敏症の副作用を生  
 3464 じることがあり、野外活動が多い人では、他の抗炎症成分が配合された製品を選択する  
 3465 ことが望ましい。このほか、副作用として腫れ、かぶれ、水疱<sup>ほう</sup>、落屑<sup>せつ</sup>（皮膚片の細かい脱  
 3466 落）などが現れることがある。

### 3467 ③ その他

3468 【サリチル酸メチル、サリチル酸グリコール】 皮膚から吸収された後、サリチル酸に分

exlvii インドメタシン、ケトプロフェン、ピロキシカム等を、妊娠末期のラットに経口投与した実験において、胎児に高度～中等度の動脈管の収縮が見られたとの報告がある。

exlviii チアプロフェン酸は内服薬として用いられる非ステロイド性抗炎症成分、スプロフェンは外用薬として用いられる非ステロイド系抗炎症成分、フェノフィブラートは脂質異常症用薬（内服）の成分である。

cxlix その物質をアレルゲンとして免疫機構が認識することになること。

3469 解されて、末梢組織（患部局所）におけるプロスタグランジンの産生を抑える作用も期  
 3470 待されるが、主として局所刺激により患部の血行を促し、また、末梢の知覚神経に軽い  
 3471 麻痺<sup>ひ</sup>を起こすことにより、鎮痛作用をもたらすと考えられている。

3472 【イブプロフェンピコノール】 イブプロフェン（I-2（解熱鎮痛薬）参照。）の誘導体<sup>cl</sup>  
 3473 であるが、外用での鎮痛作用はほとんど期待されない。吹き出物に伴う皮膚の発赤や腫  
 3474 れを抑えるほか、吹き出物（面皰<sup>ほう</sup>）の拡張を抑える作用があるとされ、専らにきび治療  
 3475 薬として用いられる。

3476 (c) その他の抗炎症成分

3477 比較的穏やかな抗炎症作用を示す成分として、グリチルレチン酸、グリチルリチン酸ニカ  
 3478 リウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム等が配合されている場合がある。

3479 これら成分の抗炎症作用に関する出題については、I-1（かぜ薬）及びV-1（痔<sup>じ</sup>の薬）  
 3480 を参照して作成のこと。

3481 (d) 局所麻酔成分

3482 きり傷、擦り傷、掻き傷<sup>か</sup>等の創傷面の痛みや、湿疹<sup>しん</sup>、皮膚炎、かぶれ、あせも、虫さされ等  
 3483 による皮膚の痒み<sup>かゆ</sup>を和らげることを目的として、ジブカイン塩酸塩、リドカイン、アミノ安  
 3484 息香酸エチル、テシットデシチン等の局所麻酔成分が配合されている場合がある。局所麻酔  
 3485 成分に関する出題については、V-1（痔<sup>じ</sup>の薬）を参照して作成のこと。

3486 そのほか、皮下の知覚神経に麻痺<sup>ひ</sup>を起こさせる成分として、アンモニアが主に虫さされに  
 3487 による痒み<sup>かゆ</sup>に用いられる。皮膚刺激性が強いため、粘膜（口唇等）や目の周りへの使用は避け  
 3488 る必要がある。

3489 (e) 抗ヒスタミン成分

3490 湿疹<sup>しん</sup>、皮膚炎、かぶれ、あせも、虫さされ等による皮膚の痒み<sup>かゆ</sup>の発生には、生体内の伝達  
 3491 物質であるヒスタミンが関与している。外用薬で用いられる抗ヒスタミン成分は、適用部位  
 3492 の組織に浸透して、肥満細胞から遊離したヒスタミンとその受容体タンパク質との結合を妨  
 3493 げることにより、患部局所におけるヒスタミンの働きを抑える。

3494 湿疹<sup>しん</sup>、皮膚炎、かぶれ、あせも、虫さされ等による一時的かつ部分的な皮膚症状（ほてり・  
 3495 腫れ・痒み<sup>かゆ</sup>等）の緩和を目的として、ジフェンヒドラミン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、ク  
 3496 ロルフェニラミンマレイン酸塩、ジフェニルイミダゾール、イソチベンジル塩酸塩等の抗ヒ  
 3497 スタミン成分が用いられる。いずれも副作用として、患部の腫れが現れることがある。

3498 (f) 局所刺激成分

3499 いずれも目や目の周り、粘膜面には刺激が強すぎるため、使用を避けることとされている。

3500 ① 冷感刺激成分

<sup>cl</sup> その化合物の分子内の一部分が変化して生じた化合物。

3501 皮膚表面に冷感刺激を与え、軽い炎症を起こして反射的な血管の拡張による患部の血行  
 3502 を促す効果を期待して、また、知覚神経を麻痺させることによる鎮痛・鎮痒の効果を期待  
 3503 して、メントール、カンフル、ハッカ油、ユーカリ油等が配合されている場合がある。

3504 打撲や捻挫などの急性の腫れや熱感を伴う症状に対しては、冷感刺激成分が配合された  
 3505 外用鎮痛薬が適すとされる。

3506 ② 温感刺激成分

3507 皮膚に温感刺激を与え、末梢血管を拡張させて患部の血行を促す効果を期待して、カプ  
 3508 サイシン、ノニル酸ワニルルアミド、ニコチン酸ベンジルエステル等が配合されている場  
 3509 合がある。カプサイシンを含む生薬成分として、トウガラシ（ナス科のトウガラシの果実  
 3510 を基原とする生薬）も同様に用いられる。

3511 温感刺激成分は、人によっては刺激が強すぎて、副作用として痛みが現れることがある。  
 3512 特に、温感刺激成分を主薬とする貼付剤では、貼付部位をコタツや電気毛布等の保温器具  
 3513 で温めると強い痛みを生じやすくなるほか、いわゆる低温やけどを引き起こすおそれがあ  
 3514 るので、注意が必要である。入浴前後の使用も適当でなく、入浴1時間前には剥がし、入  
 3515 浴後は皮膚のほてりが鎮まってから貼付するべきである。

3516 このほか、皮膚に軽い灼熱感を与えることで痒みを感じにくくさせる効果を期待して、  
 3517 クロタミトンが配合されている場合もある。

3518 (g) 収斂・皮膚保護成分

3519 酸化亜鉛は、患部のタンパク質と結合して皮膜を形成し、皮膚を保護する作用を示す。

3520 創傷面に薄い皮膜を形成して保護することを目的として、ピロキシリン（ニトロセルロー  
 3521 ス）が用いられることもある。

3522 いずれも患部が浸潤又は化膿している場合、傷が深いときなどには、表面だけを乾燥させ  
 3523 てかえって症状を悪化させるおそれがあり、使用を避けることとされている。

3524 (h) 組織修復成分

3525 損傷皮膚の組織の修復を促す作用を期待して、アラントインやビタミンA油が配合されて  
 3526 いる場合がある。

3527 (i) 血管収縮成分

3528 きり傷、擦り傷、掻き傷等の創傷面からの出血を抑えることを目的として、ナファゾリン  
 3529 塩酸塩等のアドレナリン作動成分が配合されている場合がある。創傷面に浸透して、その部  
 3530 位を通っている血管を収縮させることによる止血効果を期待して用いられる。

3531 (j) 血行促進成分

3532 患部局所の血行を促すことを目的として、ヘパリン類似物質<sup>cli</sup>、ポリエチレンスルホン酸ナ

<sup>cli</sup> その構造中に硫酸基、カルボキシル基、水酸基などの多くの親水基を持ち、高い保湿能を有する。

3533 トリウム、ニコチン酸ベンジルエステル、ビタミンE（トコフェロール酢酸エステル、トコ  
3534 フェロール等）等が用いられる。ヘパリン類似物質については、抗炎症作用や保湿作用も期  
3535 待される。

3536 ヘパリン類似物質、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムには、血液凝固を抑える働きがあ  
3537 るため、出血しやすい人、出血が止まりにくい人、出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、  
3538 紫斑症など）の診断を受けた人では、使用を避ける必要がある。

3539

3540 ● 漢方処方製剤 等

3541 (a) 紫雲膏

3542 ひび、あかぎれ、しもやけ、うおのめ、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛  
3543 門裂傷、湿疹・皮膚炎に適すとされるが、湿潤、ただれ、火傷又は外傷のひどい場合、傷口が  
3544 化膿している場合、患部が広範囲の場合には不向きとされる。

3545 (b) 中黄膏

3546 急性化膿性皮膚疾患（腫れ物）の初期、打ち身、捻挫に適すとされるが、湿潤、ただれ、火  
3547 傷又は外傷のひどい場合、傷口が化膿している場合、患部が広範囲の場合には不向きとされ  
3548 る。捻挫、打撲、関節痛、腰痛、筋肉痛、肩こりに用いる貼り薬（パップ剤）とした製品もあ  
3549 る。

3550 (c) その他

3551 抗炎症、血行促進等の作用を期待して、アルニカ（キク科のアルニカを基原とする生薬）、  
3552 サンシシ（アカネ科のクチナシの果実で、ときには湯通し又は蒸したものを基原とする生薬）、  
3553 オウバク（Ⅲ－1（胃の薬）参照。）、セイヨウトチノミ（Ⅴ－1（痔の薬）参照。）等の生薬  
3554 成分が配合されている場合がある。

3555 日本薬局方収載のオウバク末は、健胃又は止瀉の作用を期待して内服で用いられる（Ⅲ－  
3556 1（胃の薬）参照。）が、外用では水で練って患部に貼り、打ち身、捻挫に用いられることが  
3557 ある。

3558

3559 【一般的な打撲、捻挫等への対応】 まず、患部を安静に保つことが重要とされる。特に、足や  
3560 脚部を痛めた場合は、なるべく歩いたり、走ったりすることを避けることが望ましい。

3561 次に、氷嚢などを用いて患部を冷やす。冷却することにより、内出血を最小限にし、痛みの  
3562 緩和が図られる。また、患部が腫れてくるのを抑えるため、弾性包帯やサポーターで軽く圧迫  
3563 し、患部を心臓よりも高くしておく効果的とされている。

3564

3565 【一般的な湿疹、皮膚炎等への対応】 皮膚を清浄に保つため、毎日の入浴やシャワーが推奨さ  
3566 れるが、こすり過ぎによる刺激や、洗浄力の強い石けんや全身洗浄剤、シャンプー等の使用



3567 は避けることが望ましい。

3568 生活環境の改善としては、患部を搔かないようにする、紫外線やストレス、発汗を避ける等、  
3569 皮膚への刺激を避けることが重要とされる。

3570

3571 【受診勧奨】 一般用医薬品の使用による対処は、痒みや痛み等の症状を一時的に抑える対症療  
3572 法である。5～6日間使用して症状が治まらない場合には、医師の診療を受けるなどの対応が  
3573 必要であり、また、一般用医薬品の使用で症状が抑えられた場合でも、ステロイド性抗炎症成  
3574 分や、インドメタシン、ケトプロフェン、フェルビナク、ピロキシカム等の非ステロイド性抗  
3575 炎症成分が配合された医薬品では、長期間にわたって使用することは適切でない。

3576 痛みが著しい、又は長引く、脱臼や骨折が疑われる場合には、一般用医薬品を継続的に使用  
3577 するのではなく、医療機関（整形外科又は外科）を受診するなどの対応が必要である。

3578 慢性の湿疹や皮膚炎、又は皮膚症状が広範囲にわたって生じているような場合には、感染症  
3579 や内臓疾患、又は免疫機能の異常等による可能性もあり、医療機関を受診するなどの対応が必  
3580 要である。特にアトピー性皮膚炎は、一般の生活者が自己判断で対処を図ろうとすることがし  
3581 ばしばあるが、医師による専門的な治療を要する疾患であり、一般用医薬品の使用によって対  
3582 処できる範囲を超えているので、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対  
3583 して、その旨を説明し医療機関の受診を促すことが重要である。

3584 なお、異常を生じている部位と皮膚に痒みや痛みが現れる部位とは必ずしも近接していない  
3585 こともあり、原因がはっきりしない痒みや痛みについて、安易に一般用医薬品による症状の緩  
3586 和（対症療法）を図ることは適当でない。

3587

3588 3) 肌の角質化、かさつき等を改善する配合成分

3589 (a) 角質軟化成分

3590 うおのめ（鶏眼）、たこ（胼胝）は、皮膚の一部に機械的刺激や圧迫が繰り返し加わったこ  
3591 とにより、角質層が部分的に厚くなったものである。うおのめは、角質の芯が真皮にくい込  
3592 んでいるため、圧迫されると痛みを感じるのに対し、たこは、角質層の一部が単純に肥厚し  
3593 たもので芯がなく、通常、痛みは伴わない。いぼ（疣贅）は、表皮が隆起した小型の良性の腫  
3594 瘍で、ウイルス性のいぼと老人性のいぼに大別される。足の裏にできた場合、たこと間違え  
3595 られやすい。ウイルス性のいぼは1～2年で自然寛解することが多い。

3596 角質軟化薬のうち、配合成分やその濃度等があらかじめ定められた範囲内である製品につ  
3597 いては、医薬部外品（うおのめ・たこ用剤）として製造販売されているが、いぼに用いる製  
3598 品については、医薬品としてのみ認められている。ただし、いぼの原因となるウイルスに対  
3599 する抑制作用はなく、いぼが広範囲にわたって生じたり、外陰部や肛門周囲に生じたような  
3600 場合には、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

3601 ① サリチル酸  
 3602 角質成分を溶解することにより角質軟化作用を示す。併せて抗菌、抗真菌、抗炎症作用  
 3603 も期待され、にきび用薬等に配合されている場合もある。

3604 頭皮の落屑（ふけ）を抑える効果を期待して、毛髪用薬に配合されている場合もある。

3605 ② イオウ

3606 皮膚の角質層を構成するケラチンを変質させることにより、角質軟化作用を示す。併せ  
 3607 て抗菌、抗真菌作用も期待され、にきび用薬等に配合されている場合もある。

3608 (b) 保湿成分

3609 皮膚の乾燥は、角質層の細胞間脂質や角質層中に元来存在するアミノ酸、尿素、乳酸等の  
 3610 保湿因子が減少したり、また、皮脂の分泌が低下する等により、角質層の水分保持量が低下  
 3611 することによって生じる。

3612 角質層の水分保持量を高め、皮膚の乾燥を改善することを目的として、グリセリン、尿素、  
 3613 白色ワセリン、オリーブ油（モクセイ科の *Olea europaea* Linné オリーブの果実を圧搾して得  
 3614 た脂肪油）、ヘパリン類似物質等が用いられる。

3615

3616 4) 抗菌作用を有する配合成分

3617 (a) にきび、吹き出物等の要因と基礎的なケア

3618 にきび、吹き出物は、最も一般的に生じる化膿性皮膚疾患（皮膚に細菌が感染して化膿す  
 3619 る皮膚疾患）である。その発生要因としては、i) ストレス、食生活の乱れ、睡眠不足など、  
 3620 様々な要因によって肌の新陳代謝機能が低下し、毛穴の皮脂や古い角質が溜まる。ii) 老廃物  
 3621 がつままった毛穴の中で皮膚常在菌であるにきび桿菌（アクネ菌）が繁殖する。iii) にきび桿菌  
 3622 が皮脂を分解して生じる遊離脂肪酸によって毛包周囲に炎症を生じ、さらに他の細菌の感染  
 3623 を誘発して膿疱や膿腫ができる。これらがひどくなると色素沈着を起こして赤くしみが残っ  
 3624 たり、クレーター状の癬痕が残ったりする。

3625 洗顔等により皮膚を清浄に保つことが基本とされる。吹き出物を潰したり無理に膿を出そ  
 3626 うとすると、炎症を悪化させて皮膚の傷を深くして跡が残りやすくなる。

3627 ストレス等を取り除き、バランスの取れた食習慣、十分な睡眠等、規則正しい生活習慣を  
 3628 心がけることも、にきびや吹き出物ができやすい体質の改善につながる。油分の多い化粧品  
 3629 はにきびを悪化させることがあり、水性成分主体のものを選択することが望ましい。

3630 皮膚常在菌であるにきび桿菌（アクネ菌）でなく、黄色ブドウ球菌などの化膿菌が毛穴か  
 3631 ら侵入し、皮脂腺、汗腺で増殖して生じた吹き出物を毛囊炎（疔）といい、にきびに比べて  
 3632 痛みや腫れが顕著となる。毛囊炎が顔面に生じたものを面疔という。

3633 とびひ（伝染性膿痂疹）は毛穴を介さずに、虫さされやあせも、掻き傷などから化膿菌が  
 3634 侵入したもので、水疱やかさぶた（痂皮）、ただれ（糜爛）を生じる。小児に発症することが

3635 多い。水疱が破れて分泌液が付着すると、皮膚の他の部分や他人の皮膚に拡がることもある。

3636 (b) 代表的な抗菌成分

3637 ① サルファ剤

3638 スルファジアジン、ホモスルファミン、スルフイソキサゾール等のサルファ剤は、細菌  
3639 のDNA合成を阻害することにより抗菌作用を示す。

3640 ② バシトラシン

3641 細菌の細胞壁合成を阻害することにより抗菌作用を示す。

3642 ③ 硫酸フラジオマイシン硫酸塩、クロラムフェニコール

3643 いずれも細菌のタンパク質合成を阻害することにより抗菌作用を示す。

3644 (c) 主な副作用、受診勧奨

3645 患部が広範囲である場合、患部の湿潤やただれがひどい場合には、一般用医薬品の使用に  
3646 よって対処を図るよりも、医療機関を受診するなどの対応が必要である。

3647 化膿性皮膚疾患用薬を漫然と使用していると、皮膚常在菌が静菌化される一方で、連鎖球  
3648 菌、黄色ブドウ球菌などの化膿菌は耐性を獲得するおそれがある。また、通常であれば、生  
3649 体に元来備わっている免疫機能の働きによって、化膿菌は自然に排除される。化膿性皮膚疾  
3650 患用薬を5～6日間使用して症状の改善がみられない場合には、免疫機能の低下等の重大な  
3651 疾患の可能性も考えられ、使用を中止して医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

3652

3653 5) 抗真菌作用を有する配合成分

3654 (a) みずむし・たむし等の要因と基礎的なケア

3655 みずむし、たむし等は、皮膚糸状菌（白癬菌）という真菌類の一種が皮膚に寄生すること  
3656 によって起こる疾患（表在性真菌感染症）である。スリッパやタオルなどを介して、他の保  
3657 菌者やペットから皮膚糸状菌が感染することも多い。発生する部位によって呼び名が変わる。

3658 ○ みずむし：手足の白癬

3659 ほとんどの場合は足に生じるが、まれに手に生じることもある。病型により3つに分類  
3660 される。i) 趾間型：指の間の鱗屑（皮が剥ける）、浸軟（ふやけて白くなる）、亀裂、ただ  
3661 れ（糜爛）を主症状とする。ii) 小水疱型：足底に小さな水疱や鱗屑を生じ、ときに膿疱、  
3662 ただれ（糜爛）が混じることもある。iii) 角質増殖型：足底全体に瀰漫性紅斑と角質の増  
3663 殖を生じる。皮膚糸状菌の感染巣は硬く、亀裂ができることがある。強い痒みはなく、み  
3664 ずむしとして自覚されていない場合もある。

3665 ○ ぜにたむし：体部白癬

3666 輪状の小さな丸い病巣が胴や四肢に発生し、発赤と鱗屑、痒みを伴う。

3667 ○ いんきんたむし：頑癬（内股・尻・陰囊付近の白癬）

3668 ぜにたむしと同様の病巣が内股にでき、尻や陰囊付近に広がっていくもの。

3669 ○ このほか、爪に発生する白癬（爪白癬）や、頭部に発生する白癬（しらくも）がある。  
 3670 頭部白癬は小児に多く、清浄に保てば自然治癒することが多いが、炎症が著しい場合に  
 3671 は医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

3672 爪白癬は、爪内部に薬剤が浸透しにくいいため難治性で、医療機関（皮膚科）における全  
 3673 身的な治療（内服抗真菌薬の処方）を必要とする場合が少なくない。

3674  
 3675 【みずむし等に対する基礎的なケア】 みずむしの場合、足（特に、指の間）を毎日石けん  
 3676 で洗う等して清潔に保ち、なるべく通気性を良くしておくことが重要である。靴下は毎日履  
 3677 き替え、洗濯後は日光に当てて干す、また、靴も通気性の良いものを選び、連日同じものを  
 3678 履くことは避ける等の対処も、みずむしが発生しにくい環境作りにつながる。

3679 みずむし、たむしは古くから知られている皮膚疾患のひとつであり、様々な民間療法が存在  
 3680 するが、それらの中には科学的根拠が見出されないものも多く、かえって症状を悪化させ  
 3681 る場合がある。

3682  
 3683 【剤形の選択】 一般的に、じゅくじゅくと湿潤している患部には、軟膏又はクリームが適す  
 3684 とされる。液剤は有効成分の浸透性が高いが、患部に対する刺激が強い。皮膚が厚く角質化  
 3685 している部分には、液剤が適している。

3686 湿疹とみずむし等の初期症状は類似していることが多く、湿疹に抗真菌作用を有する成分  
 3687 を使用すると、かえって湿疹の悪化を招くことがある。陰囊に痒み・ただれ等の症状がある  
 3688 場合は、湿疹等の他の原因による場合が多い。湿疹か皮膚糸状菌による皮膚感染かはっきり  
 3689 しない場合に、抗真菌成分が配合された医薬品を使用することは適当でない。

3690  
 3691 (b) 代表的な抗真菌成分、主な副作用、受診勧奨

3692 強い刺激を生じたり、症状が悪化する可能性があるため、膣、陰囊、外陰部等、湿疹、湿  
 3693 潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部、化膿している患部には使用を避ける必要がある。

3694 患部が化膿している場合には、抗菌成分を含んだ外用剤を使用する等、化膿が治まってか  
 3695 ら使用することが望ましい。

3696 ① イミダゾール系抗真菌成分

3697 オキシコナゾール硝酸塩、ネチコナゾール塩酸塩、ビホナゾール、スルコナゾール硝酸  
 3698 塩、エコナゾール硝酸塩、クロトリマゾール、ミコナゾール硝酸塩、チオコナゾール等は、  
 3699 イミダゾール系の抗真菌薬と呼ばれ、皮膚糸状菌の細胞膜を構成する成分の産生を妨げたり、  
 3700 細胞膜の透過性を変化させることにより、その増殖を抑える。

3701 副作用としてかぶれ、腫れ、刺激感等が現れることがある。あるイミダゾール系成分が  
 3702 配合されたみずむし薬でかぶれたことがある人は、他のイミダゾール系成分が配合された

3703 製品も避けるべきである。

3704 ② アモロルフィン塩酸塩、ブテナフィン塩酸塩、テルビナフィン塩酸塩

3705 皮膚糸状菌の細胞膜を構成する成分の産生を妨げることにより、その増殖を抑える。

3706 ③ シクロピロクスオラミン

3707 皮膚糸状菌の細胞膜に作用して、その増殖・生存に必要な物質の輸送機能を妨げ、その  
3708 増殖を抑える。

3709 ④ ウンデシレン酸、ウンデシレン酸亜鉛

3710 患部を酸性にすることで、皮膚糸状菌の発育を抑える。

3711 ⑤ ピロールニトリン

3712 菌の呼吸や代謝を妨げることにより、皮膚糸状菌の増殖を抑える。単独での抗真菌作用  
3713 は弱いため、他の抗真菌成分と組み合わせて配合される。

3714 ⑥ その他

3715 抗真菌成分としてトルナフタート、エキサラミドが配合されている場合がある。

3716 また、生薬成分として、モクキンピ（アオイ科のムクゲの幹皮を基原とする生薬）のエ  
3717 キスも皮膚糸状菌の増殖を抑える作用を期待して用いられる。

3718

3719 【受診勧奨】 ぜにたむしやいんきんたむしで患部が広範囲に及ぶ場合は、自己治療の範囲を  
3720 超えており、また、内服抗真菌薬の処方による全身的な治療が必要な場合もあるので、医療  
3721 機関（皮膚科）を受診するなどの対応が必要である。

3722 みずむしやたむしに対する基礎的なケアと併せて、みずむし・たむし用薬を2週間位使用  
3723 しても症状が良くならない場合には、抗真菌成分に耐性を生じている可能性や、皮膚糸状菌  
3724 による皮膚感染でない可能性もある。また、配合成分によっては、痒み、落屑、ただれ、水疱  
3725 など、みずむし・たむしの症状と判別しにくい副作用が現れるものもある。症状が改善しな  
3726 い場合には、他のみずむし・たむし用薬に切り換えるようなことはせず、いったん使用を中  
3727 止して、医療機関（皮膚科）を受診するなどの対応が必要である。

3728

3729 6) 頭皮・毛根に作用する配合成分

3730 毛髪用薬は、脱毛の防止、育毛、ふけや痒み<sup>かゆ</sup>を抑えること等を目的として、頭皮に適用する医  
3731 薬品である。

3732 毛髪用薬のうち、配合成分やその分量等にかんがみて人体に対する作用が緩和なものについて  
3733 は、医薬部外品（育毛剤、養毛剤）として製造販売されているが、「壮年性脱毛症」「円形脱毛  
3734 症」「<sup>ひこう</sup>乾性脱毛症」「<sup>び</sup>瀰漫性脱毛症」等の疾患名を掲げた効能・効果は、医薬品においてのみ認  
3735 められている。

3736 (a) カルプロニウム塩化物

3737 末梢組織（適用局所）においてアセチルコリンに類似した作用（コリン作用）を示し、頭  
3738 皮の血管を拡張、毛根への血行を促すことによる発毛効果を期待して用いられる。

3739 アセチルコリンと異なり、コリンエステラーゼ（IX（眼科用薬）参照。）による分解を受け  
3740 にくく、作用が持続するとされる。副作用として、コリン作用による局所又は全身性の発汗、  
3741 それに伴う寒気、震え、吐きけが現れることがある。

3742 (b) エストラジオール安息香酸エステル

3743 脱毛は男性ホルモンの働きが過剰であることも一因とされているため、女性ホルモンによ  
3744 る脱毛抑制効果を期待して、女性ホルモン成分（VI（婦人薬）参照。）の一種であるエストラ  
3745 ジオール安息香酸エステルが配合されている場合がある。

3746 毛髪用薬は頭皮における局所的な作用を目的とする医薬品であるが、女性ホルモン成分に  
3747 ついては、頭皮から吸収されて循環血流中に入る可能性を考慮し、妊婦又は妊娠していると  
3748 思われる女性では使用を避けるべきである。

3749 (c) 生薬成分

3750 ① カシュウ

3751 タデ科のツルドクダミの塊根を基原とする生薬で、頭皮における脂質代謝を高めて、余  
3752 分な皮脂を取り除く作用を期待して用いられる。

3753 ② チクセツニンジン

3754 ウコギ科のトチバニンジンの根茎を、通例、湯通ししたものを基原とする生薬で、血行  
3755 促進、抗炎症などの作用を期待して用いられる。

3756 ③ ヒノキチオール

3757 ヒノキ科のタイワンヒノキ、ヒバ等から得られた精油成分で、抗菌、~~血行促進~~、抗炎症  
3758 などの作用を期待して用いられる。

3759

## 3760 X I 歯や口中に用いる薬

3761 1 歯痛・<sup>のう</sup>歯槽膿漏薬

3762 1) 代表的な配合成分、主な副作用

3763 ● 歯痛薬（外用）

3764 歯痛は、多くの場合、<sup>うしよく</sup>歯の齧蝕（むし歯）とそれに伴う歯髄炎によって起こる。歯痛薬は、<sup>うしよく</sup>歯  
3765 の齧蝕による歯痛を応急的に鎮めることを目的とする一般用医薬品であり、<sup>うしよく</sup>歯の齧蝕が修復  
3766 されることはなく、早めに医療機関（歯科）を受診して治療を受けることが基本となる。

3767 (a) 局所麻酔成分

3768 <sup>うしよく</sup>齧蝕により露出した歯髄を通っている知覚神経の伝達を遮断して痛みを鎮めることを  
3769 目的として、アミノ安息香酸エチル、ジブカイン塩酸塩、テーカイン等の局所麻酔成分が用  
3770 いられる。

3771 冷感刺激を与えて知覚神経を麻痺させることによる鎮痛・鎮痒の効果を期待して、メント  
3772 ール、カンフル、ハッカ油、ユーカリ油等の冷感刺激成分が配合されている場合もある。

3773 (b) 殺菌消毒成分

3774 ~~齧蝕蝕~~を生じた部分における細菌の繁殖を抑えることを目的として、フェノール、歯科用  
3775 フェノールカンフル、~~モク~~タレオソート、オイゲノール、セチルピリジニウム塩化物等の殺菌  
3776 消毒成分が用いられる。粘膜刺激を生じることがあるため、歯以外の口腔粘膜や唇に付着し  
3777 ないように注意が必要である。

3778 ~~モク~~タレオソートについては、殺菌作用のほか、局所麻酔作用もあるとされる。殺菌作用に  
3779 関する注意等の出題についてはⅢ-2（腸の薬）を参照して作成のこと。

3780 (c) 生薬成分

3781 サンシシはアカネ科のクチナシの果実を基原とする生薬で、抗炎症作用を期待して用いら  
3782 れる。

3783

3784 ● 歯槽膿漏薬

3785 歯と歯肉の境目にある溝（歯肉溝）では細菌が繁殖しやすく、歯肉に炎症を起こすことがある。

3786 歯肉炎が重症化して、炎症が歯周組織全体に広がると歯周炎（歯槽膿漏）となる。

3787 歯槽膿漏薬は、歯肉炎、歯槽膿漏の諸症状（歯肉からの出血や膿、歯肉の腫れ、むずがゆさ、口  
3788 臭、口腔内の粘り等）の緩和を目的とする医薬品である。患部局所に適用する外用薬のほか、内  
3789 服で用いる歯槽膿漏薬もある。内服薬は、抗炎症成分、ビタミン成分等が配合されたもので、外  
3790 用薬と併せて用いると効果的である。

3791 (a) 外用薬

3792 ① 殺菌消毒成分

3793 歯肉溝での細菌の繁殖を抑えることを目的として、セチルピリジニウム塩化物、クロル  
3794 ヘキシジングルコン酸塩、イソプロピルメチルフェノール、チモール等の殺菌消毒成分が  
3795 配合されている場合がある。これら成分の殺菌消毒作用に関する出題については、Ⅹ（皮  
3796 膚に用いる薬）を参照して作成のこと。

3797 クロルヘキシジングルコン酸塩が口腔内に適用される場合、まれに重篤な副作用として  
3798 ショック（アナフィラキシー）を生じることがある。（Ⅱ-2（口腔咽喉薬、うがい薬）参  
3799 照。）

3800 殺菌消毒作用のほか、抗炎症作用なども期待して、ヒノキチオール（Ⅹ（皮膚に用いる  
3801 薬）参照。）やチョウジ油（フトモモ科のチョウジの蕾又は葉を水蒸気蒸留して得た精油）  
3802 が配合されている場合もある。

3803 ② 抗炎症成分

3804 歯周組織の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウム、グリチル

3805 レチン酸等が配合されている場合がある。これら成分の抗炎症作用等に関する出題について  
3806 ては、I-1（かぜ薬）及びV-1（痔の薬）を参照して作成のこと。

3807 ステロイド性抗炎症成分が配合されている場合における留意点等に関する出題について  
3808 は、X（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。なお、口腔内に適用されるため、ステロ  
3809 イド性抗炎症成分が配合されている場合には、その含有量によらず長期連用を避ける必要  
3810 がある。

3811 ③ 止血成分

3812 炎症を起こした歯周組織からの出血を抑える作用を期待して、カルバゾクロム（V-1  
3813 （痔の薬）参照。）が配合されている場合がある。

3814 ④ 組織修復成分

3815 炎症を起こした歯周組織の修復を促す作用を期待して、アラントインが配合されている  
3816 場合がある。

3817 ⑤ 生薬成分

3818 カミツレ、ラタニア、ミルラ等の生薬成分が配合されている場合がある。

3819 カミツレはキク科のカミツレの頭花を基原とする生薬で、抗炎症、抗菌などの作用を期  
3820 待して用いられる。ラタニア、ミルラに関する出題については、II-2（口腔咽喉薬、う  
3821 がい薬）を参照して作成のこと。

3822 (b) 内服薬

3823 ① 抗炎症成分

3824 歯周組織の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウムサゾチーム  
3825 塩酸塩が用いられる。

3826 ② 止血成分

3827 炎症を起こした歯周組織からの出血を抑える作用を期待して、カルバゾクロム（V-1  
3828 （痔の薬）参照。）や、血液の凝固機能を正常に保つ働きがあるフィトナジオン（ビタミン  
3829 K1<sub>1</sub>）や、カルバゾクロム（V-1（痔の薬）参照。）が配合されている場合がある。

3830 ③ 組織修復成分

3831 炎症を起こした歯周組織の修復を促す作用のほか、歯肉炎に伴う口臭を抑える効果も期  
3832 待して、銅クロロフィリンナトリウムが配合されている場合がある。

3833 ④ ビタミン成分

3834 コラーゲン代謝を改善して炎症を起こした歯周組織の修復を助け、また、毛細血管を強  
3835 化して炎症による腫れや出血を抑える効果を期待して、ビタミンC（アスコルビン酸、ア  
3836 スコルビン酸カルシウム等）が配合されている場合がある。

3837 歯周組織の血行を促す効果を期待して、ビタミンE（トコフェロールコハク酸エステル  
3838 カルシウム、トコフェロール酢酸エステル等）が配合されている場合がある。



3839

## 3840 2) 相互作用、受診勧奨

3841 【相互作用】 外用薬の場合、歯痛薬、歯槽膿漏薬のいずれについても、口腔内に食べ物のかす  
3842 などが残っている状態のままでは十分な効果が期待できず、口腔内を清浄にしてから使用する  
3843 ことが重要である。また、口腔咽喉薬、含嗽薬などを使用する場合には、十分な間隔を置くこ  
3844 とべきである。

3845 内服で用いる歯槽膿漏薬については、同じ又は同種の成分が配合された医薬品（かぜ薬、鎮  
3846 咳去痰薬、胃腸薬等）が併用された場合、作用が強すぎたり、副作用が現れやすくなるおそれ  
3847 がある。

3848

3849 【受診勧奨】 歯痛は歯の齲蝕<sup>clii</sup>等に対する生体の警告信号であり、歯痛薬の使用によって一  
3850 時的に和らげることができたとしても、その繰り返しによってやがて歯髓組織が壊死し、状態  
3851 の悪化につながるおそれがある。

3852 歯痛は基本的に歯科診療を受けることが優先され、歯痛薬による対処は最小限（旅行中や夜  
3853 間など、歯科診療を受けることが困難な場合）にとどめる必要がある。

3854 歯周病（歯肉炎・歯槽膿漏）については、状態が軽いうちは自己治療が可能とされるが、日  
3855 頃の十分な歯磨き等によって歯肉溝での細菌の繁殖を抑えることが重要である。ただし、一般  
3856 の生活者においては、十分な歯磨きがされたかどうかの判断は必ずしも容易でなく、また、歯  
3857 石の沈着等によって歯周病が慢性化しやすくなっている場合もある。歯槽膿漏薬の使用により  
3858 症状を抑えられても、しばらくすると症状が繰り返し現れるような場合には、医療機関を受診  
3859 するなどの対応が必要である。

3860

## 3861 2 口内炎用薬

3862 口内炎用薬は、口内炎、舌炎の緩和を目的として口腔内局所に適用される外用薬である。

3863 口内炎や舌炎は、いずれも口腔粘膜に生じる炎症で、代表的な口腔疾患である。口腔の粘膜上  
3864 皮に水疱や潰瘍ができて痛み、ときに口臭を伴う。発生の仕組みは必ずしも解明されていないが、  
3865 栄養摂取の偏り、ストレスや睡眠不足、唾液分泌の低下、口腔内の不衛生などが要因となって生  
3866 じることが多いとされる。また、疱疹ウイルスの口腔内感染による場合や、医薬品の副作用とし  
3867 て口内炎を生じる場合もある。

## 3868 1) 代表的な配合成分、主な副作用

## 3869 (a) 抗炎症成分

3870 口腔粘膜の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレ

<sup>clii</sup> 歯の齲蝕のほか、第三大臼歯（親知らず）の伸長による痛みも、歯痛として認識されることがある。第三大臼歯（親知らず）の伸長による痛みの場合、歯痛薬（外用）の効果は期待できない。

3871 チン酸等の抗炎症成分が用いられる。また、口腔粘膜の組織修復を促す作用を期待して、ア  
3872 ズレンスルホン酸ナトリウム（水溶性アズレン）が配合されている場合もある。

3873 ステロイド性抗炎症成分が配合されている場合における留意点等に関する出題については、  
3874 X（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。なお、口腔内に適用されるため、ステロイド  
3875 性抗炎症成分が配合されている場合には、その含有量によらず長期連用を避ける必要がある。

3876 (b) 殺菌消毒成分

3877 患部からの細菌感染を防止することを目的として、セチルピリジニウム塩化物、クロルヘ  
3878 キシジン塩酸塩、アクリノール、ポビドンヨード等が配合されている場合がある。

3879 (c) 生薬成分

3880 シコンは、ムラサキ科のムラサキの根を基原とする生薬で、組織修復促進、抗菌などの作  
3881 用を期待して用いられる。

3882

3883 ● 漢方処方製剤（内服）

3884 【茵陳蒿湯】 体力中等度以上で口渇があり、尿量少なく、便秘するものの蕁麻疹、口内炎、湿  
3885 疹・皮膚炎、皮膚のかゆみに適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い  
3886 人）、胃腸が弱く下痢しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向  
3887 きとされる。

3888 構成生薬としてダイオウを含む。ダイオウを含む漢方処方に共通する留意点に関する出題に  
3889 ついては、Ⅲ－2（腸の薬）を参照して作成のこと。

3890 まれに重篤な副作用として肝機能障害が起こることが知られている。

3891 短期間の使用に限られるものではないが、1週間位使用しても症状の改善がみられないとき  
3892 は、いったん使用を中止して専門家に相談するなどの対応が必要である。蕁麻疹に用いる場合  
3893 の留意点に関する出題については、Ⅶ（内服アレルギー用薬）を参照して作成のこと。

3894

3895 2) 相互作用、受診勧奨

3896 【相互作用】 口腔内を清浄にしてから使用することが重要であり、口腔咽喉薬、含嗽薬などを  
3897 使用する場合には、十分な間隔を置くべきである。

3898 内服して用いる漢方処方製剤における相互作用に関する一般的な事項については、XIV（漢  
3899 方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

3900

3901 【受診勧奨】 口内炎や舌炎は、通常であれば1～2週間で自然寛解するが、一度に複数箇所  
3902 発生して食事に著しい支障を来すほどの状態であれば、医療機関を受診するなどの対応が必要  
3903 である。

3904 口内炎や舌炎が長期間にわたって症状が長引いている場合には、口腔粘膜に生じた腫瘍であ

3905 る可能性もある。また、再発を繰り返す場合には、ペーチェット病<sup>cliii</sup>などの可能性も考えられ  
3906 るので、医療機関を受診するなどの対応が必要である。

3907 何らかの疾病のため医療機関で治療を受けている人では、処方された薬剤による副作用であ  
3908 る可能性も考慮し、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するなどの  
3909 対応が必要である。

3910 一般用医薬品にも副作用として口内炎等が現れることがあるものがあるが、一般の生活者に  
3911 おいては、それが副作用による症状と認識されずに、口内炎用薬による対処を図ろうとするこ  
3912 とも考えられる。医薬品の販売等に従事する専門家においては、口内炎用薬を使用しようとし  
3913 る人における状況の把握に努めることが重要である。

3914

## 3915 X II 禁煙補助剤

### 3916 1) 喫煙習慣とニコチンに関する基礎知識

3917 タバコの煙に含まれるニコチンは、肺胞の毛細血管から血液中に取り込まれると、すみやかに  
3918 脳内に到達し、脳の情動を司る部位に働いて覚醒、リラックス効果などをもたらす。

3919 習慣的な喫煙により、喫煙していないと次第に体の調子が悪く感じられるようになり、血中ニ  
3920 コチン濃度の低下によって、イライラ感、集中困難、落ち着かない等のニコチン離脱症状（禁断  
3921 症状）が現れ、喫煙習慣からの離脱（禁煙）が困難になる。

3922 禁煙を達成するには、本人の禁煙の意思に加えて、ニコチン離脱症状を軽減するニコチン置換  
3923 療法が有効とされる。ニコチン置換療法は、ニコチンの摂取方法を喫煙以外に換えて離脱症状の  
3924 軽減を図りながら徐々に摂取量を減らし、最終的にニコチン摂取をゼロにする方法である。

3925 禁煙補助剤は、ニコチン置換療法に使用される、ニコチンを有効成分とする医薬品である。嚙  
3926 むことにより口腔内でニコチンが放出され、口腔粘膜から吸収されて循環血液中に移行する咀嚼  
3927 剤と、1日1回皮膚に貼付することによりニコチンが皮膚を透過して血中に移行するパッチ製剤  
3928 がある。

3929 咀嚼剤は、菓子のガムのように嚙むと唾液が多く分泌され、ニコチンが唾液とともに飲み込ま  
3930 れてしまい、口腔粘膜からの吸収が十分なされず、また、吐きけや腹痛等の副作用が現れやす  
3931 なる<sup>cliv</sup>ため、ゆっくりと断続的に嚙むこととされている。なお、大量に使用しても禁煙達成が早  
3932 まるものでなく、かえってニコチン過剰摂取による副作用のおそれがあるため、1度に2個以上  
3933 の使用は避ける必要がある。

3934 顎の関節に障害がある人では、使用を避ける必要がある。口内炎や喉の痛み・腫れの症状があ  
3935 る場合には、口内・喉の刺激感等の症状が現れやすくなる。

<sup>cliii</sup> 口腔粘膜の潰瘍を初期症状とする全身性の疾患で、外陰部潰瘍、皮膚症状（全身の皮膚に湿疹や小膿疱ができる）、眼症状（炎症を起こし、最悪の場合失明に至る）等を引き起こす。

<sup>cliv</sup> 嚙みすぎて唾液が出過ぎたときは、飲み込まずにティッシュ等に吐き出すこととされている。

3936 脳梗塞・脳出血等の急性期脳血管障害、重い心臓病等の基礎疾患がある人（3ヶ月以内の心筋  
3937 梗塞発作がある人、重い狭心症や不整脈と診断された人）では、循環器系に重大な悪影響を及ぼ  
3938 すおそれがあるため、使用を避ける必要がある。

3939 うつ病と診断されたことのある人では、禁煙時の離脱症状により、うつ症状を悪化させること  
3940 があるため、使用を避ける必要がある。

3941 妊婦又は妊娠していると思われる女性、母乳を与える女性では、摂取されたニコチンにより胎  
3942 児又は乳児に影響が生じるおそれがあるため、使用を避ける必要がある。

3943 非喫煙者では、一般にニコチンに対する耐性がないため、吐きけ、めまい、腹痛などの症状が  
3944 現れやすく、誤って使用することのないよう注意する必要がある。

3945

3946 2) 主な副作用、相互作用、禁煙達成へのアドバイス・受診勧奨

3947 【主な副作用】 口内炎、喉の痛み、消化器症状（悪心・嘔吐、食欲不振、下痢）、皮膚症状（発  
3948 疹・発赤、掻痒感）、精神神経症状（頭痛、めまい、思考減退、眠気）、循環器症状（動悸）、そ  
3949 の他胸部不快感、胸部刺激感、顔面紅潮、顔面浮腫、気分不良などが現れることがある。

3950 【相互作用】 口腔内が酸性になるとニコチンの吸収が低下するため、コーヒーや炭酸飲料など  
3951 口腔内を酸性にする食品を摂取した後しばらくは使用を避けることとされている。

3952 ニコチンは交感神経系を興奮させる作用を示し、アドレナリン作動成分が配合された医薬品  
3953 （鎮咳去痰薬、鼻炎用薬、痔疾用薬等）との併用により、その作用を増強させるおそれがある。

3954 禁煙補助剤は、喫煙を完全に止めたうえ使用することとされており、特に、使用中又は使用  
3955 直後の喫煙は、血中のニコチン濃度が急激に高まるおそれがあり、避ける必要がある。また、  
3956 他のニコチン含有製剤が併用された場合も、同様にニコチンの過剰摂取となるおそれがある。

3957 心臓疾患（心筋梗塞、狭心症、不整脈）、脳血管障害（脳梗塞、脳出血時等）、バージャー病<sup>clv</sup>  
3958 （末梢血管障害）、高血圧、甲状腺機能障害、褐色細胞腫、糖尿病（インスリン製剤<sup>clvi</sup>を使用し  
3959 ている人）、咽頭炎、食道炎、胃・十二指腸潰瘍、肝臓病又は腎臓病の診断を受けた人では、使  
3960 用している治療薬の効果に影響を生じたり、症状を悪化させる可能性があるため、禁煙補助剤  
3961 を使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬を調剤した薬剤師に相談す  
3962 るなどの対応が必要である。

3963

3964 【禁煙達成へのアドバイス・受診勧奨】 禁煙に伴うイライラ感、集中困難、落ち着かないなど  
3965 のニコチン離脱症状は、通常、禁煙開始から1～2週間の間起きることが多い。日常生活の  
3966 中では、日々感じるストレスに対して、喫煙以外のリラックス法を実践すること、スポーツ、  
3967 散歩、趣味等のタバコを忘れる努力をすることなどが有益とされる。

<sup>clv</sup> 末梢動脈に炎症が生じて、末梢部に潰瘍や壊疽を引き起こす病気。

<sup>clvi</sup> ニコチンがインスリンの血糖降下作用に拮抗して、効果を妨げるおそれがある。

3968 禁煙補助剤によりニコチン離脱症状を軽減しながら、徐々にその使用量を減らしていくこと  
 3969 とし、初めから無理に減らそうとしないほうが、結果的に禁煙達成につながるとされる。ただ  
 3970 し、禁煙補助剤は長期間にわたって使用されるべきものでなく、添付文書で定められた期限を  
 3971 超える使用は避けるべきである。

3972 医薬品の販売等に従事する専門家においては、禁煙補助剤の使用により禁煙達成が困難なほ  
 3973 どの重度の依存を生じている場合には、ニコチン依存症の治療を行う禁煙外来の受診を勧める  
 3974 ことも考慮に入れるべきである。

3975

### 3976 XⅢ 滋養強壮保健薬

#### 3977 1) 医薬品として扱われる保健薬

3978 滋養強壮保健薬は、体調不良の不調を生じやすい状態や体質の改善、特定の栄養素の不足によ  
 3979 る症状の改善又は予防等を目的として、ビタミン成分、カルシウム、アミノ酸、生薬成分等が配  
 3980 合された医薬品である。

3981 同様にビタミン等の補給を目的とするものとして医薬部外品の保健薬があるが、それらの効能・  
 3982 効果の範囲は、滋養強壮、虚弱体質の改善、病中・病後の栄養補給等に限定されている。神経痛、  
 3983 筋肉痛、関節痛、しみ・そばかす等のような特定部位の症状に対する効能・効果については、医  
 3984 薬品においてのみ認められている。

3985 また、医薬部外品の保健薬は配合成分や分量は人体に対する作用が緩和なものに限られ、カシ  
 3986 ュウ、ゴオウ、ゴミシ、ジオウ、ロクジョウ等の生薬成分については、医薬品においてのみ認め  
 3987 られている。ビタミン成分に関しても、1日最大量が既定値を超えるものは、医薬品としてのみ  
 3988 認められている。

3989

#### 3990 2) ビタミン、カルシウム、アミノ酸等の働き、主な副作用

##### 3991 (a) ビタミン成分

3992 滋養強壮保健薬のうち、1種類以上のビタミンを主薬とし、そのビタミンの有効性が期待  
 3993 される症状及びその補給に用いられることを目的とする内服薬を、ビタミン主薬製剤（いわ  
 3994 ゆるビタミン剤）という。

3995 ビタミンは、「微量（それ自体エネルギー源や生体構成成分とならない）で体内の代謝に重  
 3996 要な働きを担うにもかかわらず、生体が自ら産生することができない、又は産生されても不  
 3997 十分であるため外部から摂取する必要がある化合物」と定義される。これに対し、不足した  
 3998 場合に欠乏症を生じるかどうか明らかにされていないが、微量でビタミンと同様に働く又は  
 3999 ビタミンの働きを助ける化合物については「ビタミン様物質」と呼ばれる。

4000 ビタミン成分等は、多く摂取したからといって適用となっている症状の改善が早まるもの  
 4001 でなく、むしろ脂溶性ビタミンでは、過剰摂取により過剰症を生じるおそれがある。

## 4002 ① ビタミンA

4003 ビタミンAは、夜間視力を維持したり、皮膚や粘膜の機能を正常に保つために重要な栄  
 4004 養素である。

4005 ビタミンA主薬製剤は、レチノール酢酸エステル、レチノールパルミチン酸エステル、  
 4006 ビタミンA油、肝油等が主薬として配合された製剤で、目の乾燥感、夜盲症（とり目、暗  
 4007 所での見えにくさ）の症状の緩和、また、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期等  
 4008 のビタミンAの補給に用いられる。

4009 一般用医薬品におけるビタミンAの1日分量は4000国際単位が上限となっているが、  
 4010 妊娠3ヶ月前から妊娠3ヶ月までの間にビタミンAを1日10000国際単位以上摂取し  
 4011 た妊婦から生まれた新生児において先天異常の割合が上昇したとの報告がある。そのため、  
 4012 妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる女性及び妊娠を希望する女性では、医薬  
 4013 品以外からのビタミンAの摂取<sup>clvii</sup>を含め、過剰摂取に留意する必要がある。

## 4014 ② ビタミンD

4015 ビタミンDは、腸管でのカルシウム吸収及び尿細管でのカルシウム再吸収を促して、骨  
 4016 の形成を助ける栄養素である。

4017 ビタミンD主薬製剤は、エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロールが主薬とし  
 4018 て配合された製剤で、骨歯の発育不良、くる病<sup>clviii</sup>の予防、また、妊娠・授乳期、発育期、  
 4019 老年期のビタミンDの補給に用いられる。

4020 ビタミンDの過剰症としては、高カルシウム血症、異常石灰化が知られている。高カル  
 4021 シウム血症は、血液中のカルシウム濃度が非常に高くなった状態で、自覚症状がないこと  
 4022 もあるが、初期症状としては、便秘、吐きけ、<sup>おう</sup>嘔吐、腹痛、食欲減退、多尿等が現れる。

## 4023 ③ ビタミンE

4024 ビタミンEは、体内の脂質を酸化から守り、細胞の活動を助ける栄養素であり、血流を  
 4025 改善させる作用もある。

4026 ビタミンE主薬製剤は、トコフェロール、トコフェロールコハク酸エステル、トコフェ  
 4027 ロール酢酸エステル等が主薬として配合された製剤で、末梢血管障害による肩・首すじの  
 4028 こり、手足のしびれ・冷え、しもやけの症状の緩和、更年期における肩・首すじのこり、冷  
 4029 え、手足のしびれ、のぼせ・ほてり、月経不順の症状の緩和、また、又は老年期におけるビ  
 4030 タミンEの補給に用いられる。

4031 ビタミンEは下垂体や副腎系に作用してホルモン分泌の調節に関与するとされており、  
 4032 ときに生理が早く来たり、経血量が多くなったりすることがある。この現象は内分泌のバ

<sup>clvii</sup> 人参などの野菜類に含まれるβ-カロテンは、体内に入ると、必要な分だけがビタミンAに転換されるため、ビタミンAの過剰摂取につながる心配はないとされる。

<sup>clviii</sup> ビタミンDの代謝障害によって、カルシウムやリンの吸収が進まなくなるために起こる乳幼児の骨格異常。

4033 ランス調整による一時的なものであるが、出血が長く続く場合には他の原因による不正出  
 4034 血（Ⅵ（婦人薬）参照。）も考えられるため、医療機関を受診して専門医の診療を受けるな  
 4035 どの対応が必要である。

4036 ④ ビタミンB1

4037 ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生に不可欠な栄養素で、神経の正常な働  
 4038 きを維持する作用がある。また、腸管運動を促進する働きもある。

4039 ビタミンB1主薬製剤は、チアミン塩化物塩酸塩、チアミン硝化物、ビスチアミン硝酸  
 4040 塩、チアミンジスルフィド、フルスルチアミン塩酸塩、ビスイブチアミン等が主薬として  
 4041 配合された製剤で、神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・痛、肘・膝痛、肩こり、五十肩な  
 4042 ど）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の  
 4043 奥の痛み）の症状の緩和、脚気の症状の緩和、また、肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後  
 4044 の体力低下時におけるビタミンB 1の補給に用いられる。

4045 ⑤ ビタミンB2

4046 ビタミンB2は、脂質の代謝に関与し、皮膚や粘膜の機能を正常に保つために重要な栄  
 4047 養素である。

4048 ビタミンB2主薬製剤は、リボフラビン酪酸エステル、フラビンアデニンジヌクレオチ  
 4049 ドナトリウム、リボフラビンリン酸エステルナトリウム等が主薬として配合された製剤で、  
 4050 口角炎（唇の両端の腫れ・ひび割れ）、口唇炎（唇の腫れ・ひび割れ）、口内炎、舌の炎症、  
 4051 湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび・吹き出物、肌あ荒れ、赤ら顔に伴う顔のほてり赤  
 4052 鼻、目の充血、目の痒みの症状の緩和、また、肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力  
 4053 低下時におけるビタミンB 2の補給に用いられる。ビタミンB 2の摂取により、尿が黄  
 4054 色になることがある。

4055 ⑥ ビタミンB6

4056 ビタミンB6は、タンパク質の代謝に関与し、皮膚や粘膜の健康維持、神経機能の維持  
 4057 に重要な栄養素である。

4058 ビタミンB6主薬製剤は、ピリドキシン塩酸塩又はピリドキサーリン酸エステルが主  
 4059 薬として配合された製剤で、口角炎（唇の両端の腫れ・ひび割れ）、口唇炎（唇の腫れ・ひ  
 4060 び割れ）、口内炎、舌の炎症、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび・吹き出物、肌あ荒  
 4061 れ、手足のしびれの症状の緩和、また、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時におけるビ  
 4062 タミンB 6の補給に用いられる。

4063 ⑦ ビタミンB12

4064 ビタミンB12は、赤血球の形成を助け、また、神経機能を正常に保つために重要な栄  
 4065 養素である。

4066 シアノコバラミン、ヒドロキソコバラミン塩酸塩等として、ビタミン主薬製剤、貧血用

4067 薬等に配合されている。

4068 ⑧ ビタミンC

4069 ビタミンCは、体内の脂質を酸化から守る作用（抗酸化作用）を示し、皮膚や粘膜の機  
4070 能を正常に保つために重要な栄養素である。メラニンの産生を抑える働きもあるとされる。

4071 ビタミンC主薬製剤は、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム又はアスコルビン  
4072 酸カルシウムが主薬として配合された製剤で、しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色  
4073 素沈着の症状の緩和、歯ぐきからの出血・鼻出血の予防、また、肉体疲労時、~~妊娠・授乳~~  
4074 ~~期~~、病中病後の体力低下時、老年期におけるビタミンCの補給に用いられる。

4075 ⑨ その他

4076 皮膚や粘膜などの機能を維持することを助ける栄養素として、ナイアシン（ニコチン酸  
4077 アミド、ニコチン酸）、パントテン酸カルシウム、ビオチン等が配合されている場合がある。

4078 (b) カルシウム成分

4079 カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素であり、筋肉の収縮、血液凝固、神経機能にも  
4080 関与する。

4081 カルシウム主薬製剤は、クエン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム、  
4082 沈降炭酸カルシウム等が主薬として配合された製剤で、虚弱体質、腺病質<sup>clix</sup>における骨歯の  
4083 発育促進、妊娠・授乳期の骨歯の脆弱<sup>ぜい</sup>予防に用いられる。

4084 カルシウムの過剰症としては、高カルシウム血症が知られている。カルシウムを含む成分  
4085 は、胃腸薬等、カルシウムの補給を目的としない医薬品においても配合されており、併用に  
4086 よりカルシウムの過剰摂取を生じることのないよう留意される必要がある。

4087 (c) アミノ酸成分等

4088 ① システイン

4089 髪や爪、肌などに存在するアミノ酸の一種で、皮膚におけるメラニンの生成を抑えると  
4090 ともに、皮膚の新陳代謝を活発にしてメラニンの排出を促す働き、また、肝臓においてア  
4091 ルコールを分解する酵素の働きを助け、アセトアルデヒドの~~と直接反応して~~代謝を促す働  
4092 きがあるとされる。

4093 システイン又はシステイン塩酸塩が主薬として配合された製剤は、しみ・そばかす・日  
4094 焼けなどの色素沈着症、全身倦怠<sup>けん</sup>、二日酔い、にきび、湿疹<sup>しん</sup>、蕁麻疹<sup>しんじん</sup>、かぶれ等の症状の緩  
4095 和に用いられる。

4096 ② アミノエチルスルホン酸（タウリン）

4097 筋肉や脳、心臓、目、神経等、体のあらゆる部分に存在し、細胞の機能が正常に働くた  
4098 めに重要な物質である。肝臓機能を改善する働きがあるとされ、滋養強壮保健薬等に配合

<sup>clix</sup> 貧血等になりやすい虚弱・無力体質。



4099 されている場合がある。

4100 ③ アスパラギン酸ナトリウム

4101 アスパラギン酸が生体におけるエネルギーの産生効率を高めるとされ、骨格筋に溜まっ  
4102 たの疲労の原因となる乳酸の分解を促す等の働きを期待して用いられる。

4103 (d) その他の成分

4104 ヘスペリジンはビタミン様物質のひとつで、ビタミンCの吸収を助ける等の作用があると  
4105 され、滋養強壮保健薬のほか、かぜ薬等にも配合されている場合がある。

4106 コンドロイチン硫酸は軟骨組織の主成分で、軟骨成分を形成及び修復する働きがあるとさ  
4107 れる。コンドロイチン硫酸ナトリウムとして関節痛、筋肉痛等の改善を促す作用を期待して  
4108 ビタミンB<sub>12</sub>等と組み合わせて配合されている場合がある。

4109 グルクロノラクトンは、肝臓の働きを助け、肝血流を促進する働きがあり、全身倦怠感や  
4110 疲労時の栄養補給を目的として配合されている場合がある。

4111 ガンマ-オリザノールは、米油及び米胚芽油から見出された抗酸化作用を示す成分で、ビタ  
4112 ミンE等と組み合わせて配合されている場合がある。

4113 カルニチン塩化物に関する出題については、Ⅲ（胃腸に作用する薬）を参照して作成のこ  
4114 と。

4115

4116 3) 代表的な配合生薬等、主な副作用

4117 ● 生薬成分

4118 ニンジン、ジオウ、トウキ、センキュウが既定値以上配合されている生薬主薬保健薬につい  
4119 ては、虚弱体質、肉体疲労、病中病後（又は、病後の体力低下）のほか、胃腸虚弱、食欲不振、  
4120 血色不良、冷え症における滋養強壯の効能が認められている。

4121 また、数種類の生薬をアルコールで抽出した薬用酒も、滋養強壯を目的として用いられる。  
4122 血行を促進させる作用があることから、手術や出産の直後等で出血しやすい人では使用を避け  
4123 る必要がある。また、アルコールを含有するため、服用後は乗り物又は機械類の運転操作等を  
4124 避ける必要がある。

4125 (a) ニンジン

4126 ウコギ科のオタネニンジンの細根を除いた根又はこれを軽く湯通ししたものを基原とする  
4127 生薬で、オタネニンジンの根を蒸したものを基原とする生薬をコウジンということもある。

4128 別名を高麗人参、朝鮮人参とも呼ばれる。神経系の興奮や副腎皮質の機能亢進等の作用によ  
4129 り、外界からのストレス刺激に対する抵抗力や新陳代謝を高めるとされる。

4130 (b) ジオウ、トウキ、センキュウ

4131 これら生薬成分に関する出題については、Ⅵ（婦人薬）を参照して作成のこと。

4132 (c) ゴオウ、ロクジョウ

4133 これら生薬成分に関する出題については、IV-1（強心薬）を参照して作成のこと。

4134 (d) インヨウカク、ハンピ

4135 インヨウカク（メギ科のキバナイカリソウ、イカリソウ、*Epimedium brevicornu Maximowicz*、  
4136 *Epimedium wushanense T. S. Ying*、ホザキイカリソウ又はトキワイカリソウエピメディウ  
4137 ム・ブレビコルヌム、ホザキイカリソウ、キバナイカリソウ、イカリソウ、トキワイカリソ  
4138 ウ等の地上部を基原とする生薬）、ハンピ（ニホンマムシ等の皮及び内臓を取り除いたもの  
4139 マムシを基原とする生薬）は、強壮、血行促進、強精（性機能の亢進）等の作用を期待して用  
4140 いられる。

4141 (e) ヨクイニン

4142 イネ科のハトムギの種皮を除いた種子を基原とする生薬で、肌荒れやいぼに用いられる。

4143 ビタミンB2主薬製剤やビタミンB6主薬製剤、瀉下薬等の補助成分として配合されてい  
4144 る場合もある。

4145 (f) その他

4146 主に強壮作用を期待して、以下のような生薬成分が配合されている場合もある。

4147 i) タイソウ：クロウメドキ科のナツメの果実を基原とする生薬

4148 ii) ゴミシ：マツブサ科のチョウセンゴミシの果実を基原とする生薬

4149 iii) サンシュユ：ミズキ科のサンシュユの偽果の果肉を基原とする生薬

4150 iv) サンヤク：ヤマノイモ科のヤマノイモ又はナガイモの周皮を除いた根茎（担根体）を基  
4151 原とする生薬

4152 v) オウギ：マメ科のキバナオウギ又は *Astragalus mongholicus Bunge* ナイモウオウギ等の  
4153 根を基原とする生薬

4154 vi) カシュウ：X（皮膚に用いる薬）参照。

4155

4156 ● 漢方処方製剤

4157 滋養強壮に用いられる主な漢方処方製剤として、十全大補湯、補中益気湯がある。いずれも  
4158 構成生薬としてカンゾウを含んでいる。カンゾウが含まれる漢方処方製剤に共通する留意点に  
4159 関する出題については、II-1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。

4160 漢方処方製剤は、症状の原因となる体質の改善を主眼としているため、比較的長期間（1ヶ  
4161 月位）服用されることがある。その場合に共通する留意点に関する出題については、XIV-1  
4162 （漢方処方製剤）を参照して作成のこと。

4163 (a) 十全大補湯

4164 体力虚弱なものの病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ寝汗、手足の冷え、  
4165 貧血に適すとされるが、胃腸の弱い人では、胃部不快感の副作用が現れやすい等、不向き  
4166 とされる。

4167 まれに重篤な副作用として、肝機能障害を生じることが知られている。

4168 (b) 補中益気湯

4169 体力虚弱で、元気がなく、胃腸の働きが衰えて、疲れやすいものの虚弱体質、疲労倦怠、病  
4170 後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ寝汗、感冒に適すとされる。

4171 まれに重篤な副作用として、間質性肺炎、肝機能障害を生じることが知られている。

4172

4173 4) 相互作用、受診勧奨

4174 【相互作用】 滋養強壮保健薬は、多く摂取したからといって適用となっている症状の改善が早  
4175 まるものでなく、また、滋養強壮の効果が高まるものでもない。

4176 漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な事項につい  
4177 ては、XIV（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。

4178

4179 【受診勧奨】 滋養強壮保健薬は、ある程度継続して使用されることによって効果が得られる性  
4180 質の医薬品であるが、1ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合には、栄養素の不足以  
4181 外の要因が考えられるため、漫然と使用を継続することなく、症状によっては医療機関を受診  
4182 する等、適切な対処が図られることが重要である。

4183 肩・首筋のこり、関節痛、筋肉痛、神経痛、手足のしびれについては、ナトリウムやカリウム  
4184 等の電解質バランスの乱れによっても生じる。また、痛み等を感じる部位が、問題のある部位  
4185 と必ずしも一致しない場合があり<sup>clx</sup>、症状が慢性化しているような場合には、医師の診療を受  
4186 けるなどの対応が必要である。その他、肩・首筋のこり、関節痛等の症状に対する受診勧奨に  
4187 関する出題については、I-2（解熱鎮痛薬）、X（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。

4188 目の乾燥感、眼精疲労、目の充血については、涙腺の異常、あるいはシェーグレン症候群<sup>clxi</sup>  
4189 のような涙腺に障害を及ぼす全身疾患によるものである場合があり、医療機関を受診して専門  
4190 医の診療を受けるなどの対応が必要である。

4191 口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎については、水痘・帯状疱疹<sup>ほうしん</sup>の感染が再燃・鎮静を繰り返して  
4192 いる場合があり、重症化した場合には、医師の診療を受ける必要がある。その他、口内炎等の  
4193 症状に対する受診勧奨に関する出題については、XI-2（口内炎用薬）を参照して作成のこ  
4194 と。

4195 肌荒れ、にきび、湿疹<sup>しん</sup>、皮膚炎、かぶれについては、それぞれの原因に対する防御策が図ら  
4196 れることが重要であり、X（皮膚に用いる薬）を参照して問題作成のこと。

4197 しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着については、皮膚にある色素の点（特に、黒

<sup>clx</sup> 体のいくつかの場所からの信号が同じ神経経路を通して脊髄から脳へと伝わるため、痛み等が離れた部位に感じられること  
がある。例えば、腎臓、膀胱<sup>ぼうこう</sup>、子宮、前立腺等の痛みが、腰痛として感じられることがある。

<sup>clxi</sup> 唾液腺や涙腺等の体液の分泌腺に白血球が浸潤して腺組織に障害を引き起こす病気。

4198 又は濃い色のもの）が次第に大きくなったり、形や色が変わってきたような場合には、悪性黒  
4199 色腫<sup>clxii</sup>のような重大な病気の可能性も考えられるので、早期に医療機関を受診して専門医の診  
4200 療を受けるなどの対応が必要である。その他、皮膚症状に対する受診勧奨に関する出題につい  
4201 ては、Ⅶ（内服アレルギー用薬）、Ⅹ（皮膚に用いる薬）を参照して作成のこと。

4202

#### 4203 **XIV 漢方処方製剤・生薬製剤**

##### 4204 1 漢方処方製剤

##### 4205 1) 漢方の特徴・漢方薬使用における基本的な考え方

4206 古来に中国から伝わり、日本において発展してきた日本の伝統医学が漢方医学であり、後ほど  
4207 西洋から日本に入ってきた蘭方（西洋医学）と区別するためにこの名前がつけられた。

4208 漢方薬は、漢方医学で用いる薬剤全体を概念的に広く表現する時に用いる言葉で、漢方医学の  
4209 考え方に沿うように、基本的に生薬を組み合わせる構成された漢方処方に基づく漢方処方製剤（漢  
4210 方方剤）として存在する。注意しなくてはならないのは、現代中国で利用されている中医学に基  
4211 づく薬剤は、漢方薬ではなく、中薬と呼ばれ、漢方薬とは明らかに別物であることである<sup>clxiii</sup>。ま  
4212 た、韓国の伝統医学は韓医学と呼ばれ、同様にそこで用いられている薬剤は、韓方薬で、これも  
4213 漢方薬とは区別されている。

4214 漢方処方方は、処方全体としての適用性等、その性質からみて処方自体が一つの有効成分として  
4215 独立したものという見方をすべきものである。漢方薬は、使用する人の体質や症状その他の状態  
4216 に適した処方を既成の処方の中から選択して用いられる。現代では、漢方処方製剤の多くは、処  
4217 方に基づく生薬混合物の浸出液を濃縮して調製された乾燥エキス製剤を散剤等に加工して市販さ  
4218 れているが、軟エキス剤、伝統的な煎剤用の刻み生薬の混合物、処方に基づいて調製された丸剤  
4219 等も存在する。なお、漢方医学の考え方に基づかない、生薬を使用した日本の伝統薬も存在し、  
4220 漢方処方製剤と合わせて、生薬製剤と呼ばれる。

4221 漢方薬を使用する場合、漢方独自の病態認識である「証」に基づいて用いることが、有効性及  
4222 び安全性を確保するために重要である。漢方の病態認識には虚実、陰陽、気血水、五臓などがあ  
4223 る。一般用に用いることが出来る漢方処方方は、現在 ~~300270~~ 処方程度であるが、平成20年の厚生  
4224 労働省医薬食品局審査管理課長通知により、医薬品の効能効果の表現に、この「証」の考え方を  
4225 盛り込んだ見直しが行われた。この見直しでは、一般用であることを考慮して、「証」という漢  
4226 方の専門用語を使用することを避け、「しぼり」（使用制限）として記載が行われている。例え  
4227 ば、虚実の概念は次のように表現してある。

clxii 皮膚癌<sup>がん</sup>の一種で、メラニン産生細胞（メラノサイト）由来の悪性腫瘍である。

clxiii 中医学は、日本において発展してきた漢方医学と基は同じであるが、中国において発展してきたものであり、漢方医学とは考え方が異なっている。中医学で使用する薬を中薬と呼び、個々の使用する人に応じて、生薬を組み合わせたものが用いられる他、中医学の考え方に基づき近年では工業的に製剤化されたもの（中成薬）ものも存在する。中薬のほとんどは、日本では医薬品として認められていない。

4228 (a) 実の病態が適応となるものには：体力が充実して

4229 (b) 虚実の尺度で中間の病態が適応となるものには：体力中等度で

4230 (c) 虚の病態が適応となるものには：体力虚弱で

4231 (d) 虚実に関わらず幅広く用いられるものについては：体力に関わらず

4232 個々の漢方処方<sup>1</sup>の適応病態は虚実という尺度で見ると、裾野を広げた山のような形をしてお  
4233 り、しかも裾野の狭いものや広いものがある。従って、裾野が虚実中間から実に分布するもの  
4234 ついては「体力中等度以上で」と表現されており、逆に裾野が虚実中間から虚の病態に分布する  
4235 ものは「体力中等度以下で」等と表現されるなど、それぞれの処方に適した表現がなされてい  
4236 る。

4237 また、陰陽の概念で、「陽」の病態を適応とするものは「のぼせがみで顔色が赤く」などの熱  
4238 症状として表現され、また「陰」の病態は「疲れやすく冷えやすいものの」などの寒性の症状を  
4239 示す表現で示されている。さらに、五臓の病態は漢方で言う「脾胃<sup>い</sup>虚弱」の病態が適応となるも  
4240 のには「胃腸<sup>い</sup>虚弱で」と記されており、「肝陽上亢<sup>こう</sup>」のような肝の失調状態が適応となるもの  
4241 には「いらいらして落ち着きのないもの」などと表現されている。また、気血水についても、「口  
4242 渇があり、尿量が減少するもの」（水毒）、「皮膚の色つやが悪く」（血虚）などの表現を用い  
4243 て適宜「しぼり」に組み入れられている。

4244 繰り返すが、漢方処方製剤を利用する場合、患者の「証」に合った漢方処方が選択されれば効  
4245 果が期待できるが、合わないものが選択された場合には、効果が得られないばかりでなく、副作  
4246 用を**生じ招き**やすくなる。そのため、それぞれの製剤について、その効能効果の欄に記載されて  
4247 いる「証」の概念を良く理解し、漢方薬が使用される人の体質と症状を十分に踏まえ、処方が選  
4248 択されることが重要となる。従って、一般の生活者が一般用医薬品として漢方薬を購入する際  
4249 には、漢方処方製剤を使用しようとする人の「証」（体質及び症状）を理解し、その「証」にあつた  
4250 漢方処方を選択することが出来るよう、医薬品の販売等に従事する専門家が助言を行い、漢方処  
4251 方製剤の適正使用を促していくことが重要である。

4252 一般の生活者においては、「漢方薬はすべからく作用が穏やかで、副作用が少ない」という  
4253 誤った認識がなされていることがあり、副作用を看過する要因となりやすい<sup>clxiv</sup>。しかし、漢方処  
4254 方製剤においても、間質性肺炎や肝機能障害のような重篤な副作用が起きることがあり、また、  
4255 証に適さない漢方処方製剤が使用されたために、症状の悪化や副作用を引き起こす場合もある。

4256 医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等が、「漢方薬は副作用が少ない」と  
4257 いった誤った考えで使用することを避け、適切な医薬品を選択することが出来るよう、積極的な  
4258 情報提供を行うことに努める必要がある。

<sup>clxiv</sup>漢方医学を含む東洋医学では、治療効果が現れる過程で一時的に病状が悪化する等の身体の不調（<sup>めいげん</sup>瞑眩）を生じ、その後病気が完全に治るとの考え方がなされることもあり、一般の生活者においては重篤な副作用の初期症状を看過する要因となりやすい。

4259 なお、漢方処方製剤は、用法用量において適用年齢の下限が設けられていない場合であっても、  
4260 生後3ヶ月未満の乳児には使用しないこととされている。

4261 漢方処方製剤は、症状の原因となる体質の改善を主眼としているものが多く、比較的長期間（1  
4262 ヶ月位）継続して服用されることがある。また、漢方処方製剤によっては、服用によりまれに症  
4263 状が進行することがあるものもある。その漢方処方が適しているかを見極めるためにも、一定期  
4264 間使用した後も、専門家に相談する等、症状の経過や副作用の発現に留意されることが重要であ  
4265 る。

4266

4267 2) 代表的な漢方処方製剤、適用となる症状・体質、主な副作用

4268 I～XⅢに記載された漢方処方製剤以外の代表的な漢方処方製剤として、以下のものから出題  
4269 することができる。構成生薬としてカンゾウ又はマオウを含む漢方処方に共通する留意点に関す  
4270 る出題については、Ⅱ-1（咳止め・痰を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。構成生薬  
4271 としてダイオウを含む漢方処方に共通する留意点に関する出題については、Ⅲ-2（腸の薬）を  
4272 参照して作成のこと。

4273 なお、肥満症又は肥胖症<sup>clxv</sup>に用いられる漢方処方製剤（防己黄耆湯、防風通聖散、大柴胡湯）  
4274 については、どのような肥満症にも適すわけではない。ものではなく、また、基本的に肥満症に  
4275 は、糖質や脂質を多く含む食品の過度の摂取を控える、日常生活に適度な運動を取り入れる等、  
4276 生活習慣の改善が図られることが重要である。医薬品の販売等に従事する専門家においては、購  
4277 入者等に対してその旨を説明する等、正しい理解を促すことが重要である。

4278 (a) 黄連解毒湯<sup>おうれんげどくとう</sup>

4279 体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの  
4280 鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔い、血の道症、めまい、動悸<sup>ま</sup>、更年期障害、湿疹<sup>しん</sup>・皮  
4281 膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の  
4282 弱い人）では不向きとされる。

4283 まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、腸間膜静脈硬化症が起こることが知  
4284 られている。

4285 鼻出血、二日酔いに用いられる場合には、漫然と長期の使用は避け、5～6回使用しても  
4286 症状の改善がみられないときは、いったん使用を中止して専門家に相談するなどの対応が必  
4287 要である。

4288 (b) 防己黄耆湯<sup>ぼういおうぎとう</sup>

4289 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの肥満に伴う関節の腫れ  
4290 や痛み痛、むくみ、多汗症、肥満症<sup>clxv</sup>（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）に適すとされ

clxv 脂肪過多症（肥満症）の漢方医学における呼称。

4291 る。構成生薬としてカンゾウを含む。

4292 まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、偽アルドステロン症が起こることが  
4293 知られている。

4294 (c) 防風通聖散

4295 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの的高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・の  
4296 ぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症に適すとされ  
4297 るが、体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、胃腸が弱く下痢しやすい人、発汗  
4298 傾向の著しい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。  
4299 また、小児に対する適用はない。また、本剤を使用するときには、他の瀉下薬との併用は避  
4300 けることとされている。

4301 構成生薬としてカンゾウ、マオウ、ダイオウを含む。

4302 まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、偽アルドステロン症、腸間膜静脈硬  
4303 化症が起こることが知られている。

4304 便秘に用いられる場合には、漫然と長期の使用は避け、1週間位使用しても症状の改善が  
4305 みられないときは、いったん使用を中止して専門家に相談するなどの対応が必要である。

4306 (d) 大柴胡湯

4307 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの胃炎、  
4308 常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症に適すとされるが、体  
4309 の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、胃腸が弱く下痢しやすい人では、激しい腹  
4310 痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。構成生薬としてダイオウを含む。

4311 まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎が起こることが知られている。

4312 常習便秘、高血圧に伴う便秘に用いられる場合には、漫然と長期の使用は避け、1週間位  
4313 使用しても症状の改善がみられないときは、いったん使用を中止して専門家に相談するなど  
4314 の対応が必要である。

4315 (e) 清上防風湯

4316 体力中等度以上で、赤ら顔で、ときにのぼせがあるものにきび、顔面・頭部の湿疹・皮  
4317 膚炎、赤鼻(酒さ)に適すとされるが、胃腸の弱い人では食欲不振、胃部不快感の副作用が  
4318 現れやすい等、不向きとされる。構成生薬としてカンゾウを含む。

4319 まれに重篤な副作用として肝機能障害、偽アルドステロン症、腸間膜静脈硬化症が起こる  
4320 ことが知られている。また、本剤の服用により、まれに症状が進行することもある。

4321

4322 3) 相互作用、受診勧奨

4323 【相互作用】 漢方処方構成する生薬には、複数の処方で共通しているものもあり、同じ生薬  
4324 を含む漢方処方製剤が併用された場合、作用が強くなり現れたり、副作用を生じやすくなる恐れが

4325 ある。また、漢方処方はその自体が一つの有効成分として独立したものであり、自己判断によ  
 4326 ってみだりに生薬成分が追加摂取された場合、生薬の構成が乱れて処方が成立しなくなるおそ  
 4327 れもある。他の漢方処方製剤、生薬製剤又は医薬部外品の併用には注意が必要である。

4328 小柴胡湯<sup>しょうさいこうとう</sup>とインターフェロン製剤の相互作用のように、医療用医薬品との相互作用も知られ  
 4329 ている。医師の治療を受けている人では、使用の可否について治療を行っている医師又は処方  
 4330 薬の調剤を行った薬剤師に相談するよう説明がなされることも重要である。

4331 また、生薬成分は、医薬品的な効能効果が標榜<sup>ぼぼう</sup>又は暗示されていなければ、食品（ハーブ等）  
 4332 として流通することが可能なものもあり、場合によっては、食品として当該生薬成分を摂取し  
 4333 ていると思われる人に対して積極的な情報提供を行う等、漢方処方製剤の適正使用が促される  
 4334 ことが重要である。

4335  
 4336 【受診勧奨】 一定期間又は一定回数使用しても症状の改善が認められない場合には、証が適し  
 4337 ていない処方であることのほか、一般用医薬品によって対処することが適当でない疾患による  
 4338 症状である可能性もある。こうした場合、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入  
 4339 者等に対して、その漢方処方製剤の使用を漫然と継続せずに、必要に応じて医療機関を受診す  
 4340 るよう促すことが重要である。

## 4341 4342 2 その他の生薬製剤

4343 生薬製剤は、生薬成分を組み合わせて配合された医薬品で、成分・分量から一見、漢方薬的に  
 4344 見えるが、漢方処方製剤のように、使用する人の体質や症状その他の状態に適した配合を選択す  
 4345 るという考え方に基づくものでなく、個々の有効成分（生薬成分）の薬理作用を主に考えて、そ  
 4346 れらが相加的に配合された、西洋医学的な基調の上に立つもの<sup>clxvi</sup>であり、伝統的な呼称（「〇〇  
 4347 丸」等）が付されているものもあるが、定まった処方というものはない。

### 4348 4349 1) 代表的な生薬成分、主な副作用

4350 生薬は、動植物の薬用とする部分、細胞内容物、分泌物、抽出物又は鉱物などであり、薬用動  
 4351 植物・薬用鉱物等の名称が生薬名と混同されて用いられることがあるが、これらは生薬の素材（基  
 4352 原）となる動植物・鉱物等を指すものであり、明確に区別される必要がある。

4353 生薬から抽出されたエキス等として配合、製剤化された製品が多いが、全形生薬（その薬用と  
 4354 する部分などを乾燥し、又は簡単な加工をしたもの）、切断生薬（全形生薬を小片若しくは小塊に  
 4355 切断若しくは破碎したもの、又は粗切、中切若しくは細切したもの）又は粉末生薬（全形又は切  
 4356 断生薬を粗末、中末、細末又は微末としたもの）のまま製品として販売されるものもある。それ

<sup>clxvi</sup> 西洋生薬を組み合わせて配合されたものもある。



4357 らについては、カビ、昆虫又は他の動物による汚損物又は混在物及びその他の異物を避け、清潔  
 4358 かつ衛生的に取り扱うこととされている。また、基本的に、湿気及び虫害などを避けて保存する  
 4359 必要がある。

4360 生薬は、サイシン<sup>clxvii</sup>（Ⅶ（内服アレルギー用薬）参照。）やモクツウ<sup>clxviii</sup>（Ⅴ－2（その他の泌  
 4361 尿器用薬）参照。）のように、薬用部位とその他の部位、又は類似した基原植物（諸外国では日本  
 4362 と生薬の名称が違うことがある）を取り違えると、期待する効果が得られないばかりでなく、人  
 4363 体に有害な作用を引き起こすことがある。日本薬局方に準拠して製造された生薬であれば問題な  
 4364 いが、個人輸入等によって入手された生薬又は生薬製剤では、健康被害が発生した事例が知られ  
 4365 ている。

4366 I～XⅢに記載した生薬成分のほか、代表的な生薬成分として以下のものからも出題すること  
 4367 ができる。

4368 (a) ブシ

4369 キンポウゲ科のハナトリカブト又はオクトリカブトの塊根を減毒加工して製したものを基原とする  
 4370 生薬であり、心筋の収縮力を高めて血液循環を改善する作用を持つ。血液循環が高まることに  
 4371 よる利尿作用を示すほか、鎮痛作用を示すが、アスピリン等と異なり、プロスタグランジン  
 4372 を抑えないことから、胃腸障害等の副作用は示さない。

4373 なお、ブシは生のままでは毒性が高いことから、その毒性を減らし有用な作用を保持する処理を  
 4374 施して使用される。

4375 (b) カッコン

4376 マメ科のクズの周皮を除いた根を基原とする生薬で、解熱、鎮痙<sup>けい</sup>等の作用を期待して用い  
 4377 られる。

4378 (c) サイコ

4379 セリ科のミシマサイコの根を基原とする生薬で、抗炎症、鎮痛等の作用を期待して用いら  
 4380 れる。

4381 (d) ボウフウ

4382 セリ科の *Saposhnikovia divaricata* Schischkin ボウフウの根及び根茎を基原とする生薬  
 4383 で、発汗、解熱、鎮痛、鎮痙<sup>けい</sup>等の作用を期待して用いられる。

4384 (e) ショウマ

4385 キンポウゲ科の *Cimicifuga dahurica* Maximowicz、*Cimicifuga heracleifolia* Komarov、  
 4386 *Cimicifuga foetida* Linné 又はサラシナショウマ~~サラシナショウマ~~、フブキショウマ、コラ

clxvii サイシンは、ウマノスズクサ科のウスバサイシン又はケイリンサイシンの根及び根茎を基原とする生薬であるが、地上部には腎障害を引き起こすことが知られているアリストロキア酸が含まれている。

clxviii モクツウは、アケビ科のアケビ又はミツバアケビの蔓性の茎を、通例、横切りしたものを基原とする生薬であるが、中国等では、アリストロキア酸を含有するキダチウマノスズクサを用いたものがモクツウとして流通していることがある。このほか、ボウイ、モッコウに関しても、医薬品・医療機器等安全性情報（平成12年7月）において、注意を要する類似生薬につき情報提供がなされている。

4387 **イシヨウマ又はオオミツバシヨウマ**の根茎を基原とする生薬で、発汗、解熱、解毒、消炎等  
4388 の作用を期待して用いられる。

4389 (f) ブクリョウ

4390 サルノコシカケ科のマツホドの菌核で、通例、外層をほとんど除いたものを基原とする生  
4391 薬で、利尿、健胃、鎮静等の作用を期待して用いられる。

4392 (g) レンギョウ

4393 モクセイ科のレンギョウ**又はシナレンギョウ**の果実を基原とする生薬で、鎮痛、抗菌等の  
4394 作用を期待して用いられる。

4395 (h) サンザシ

4396 バラ科のサンザシ又はオオミサンザシの偽果をそのまま、又は縦切若しくは横切したもの  
4397 を基原とする生薬で、健胃、消化促進等の作用を期待して用いられる。

4398 同属植物であるセイヨウサンザシの葉は、血行促進、強心等の作用を期待して用いられる。  
4399

## 4400 2) 相互作用、受診勧奨

4401 **【相互作用】** 生薬製剤に配合されている生薬成分には、複数の製品で共通するものも存在し、  
4402 同じ生薬成分又は同種の作用を示す生薬成分を含有する医薬品、医薬部外品等が併用された場  
4403 合、作用が強くなり、副作用を生じやすくなるおそれがある。

4404 また、生薬成分は、医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていなければ、食品（ハーブ等）  
4405 として流通することが可能なものもあり、そうした食品を合わせて摂取された場合、医薬品の  
4406 効き目や副作用を増強させることがある。医薬品の販売等に従事する専門家においては、食品  
4407 として当該生薬成分を摂取していると思われる人に対して積極的な情報提供を行う等、生薬製  
4408 剤の適正使用を促すことが重要である。  
4409

4410 **【受診勧奨】** 生薬製剤も、漢方処方製剤と同様、症状の原因となる体質の改善を主眼としてい  
4411 るものが多く、比較的長期間（1ヶ月位）継続して服用されることがある。一般の生活者にお  
4412 いては、「生薬製剤はすべからく作用が緩やかで、副作用が少ない」などという誤った認識がし  
4413 ばしば見られることがある。しかし、センソ（IV-1（強心薬）参照。）のように少量で強い作  
4414 用を示す生薬もあり、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等が、「生薬製剤は  
4415 副作用が少ない」などといった誤った考えで使用することを避け、適切な医薬品を選択するこ  
4416 とができるよう、積極的な情報提供を行うことに努める必要がある。

4417 一定期間又は一定回数使用しても症状の改善が見られない場合には、一般用医薬品によって  
4418 対処することが適当でない疾患による症状である可能性もある。医薬品の販売等に従事する専  
4419 門家においては、購入者等に対して、必要に応じて医療機関を受診するよう促すほか、使用期間  
4420 中の症状の経過や副作用の発現に注意を払う必要性につき、積極的な情報提供を行うことが重

4421 要である。

4422

## 4423 XV 公衆衛生用薬

### 4424 1 消毒薬

#### 4425 1) 感染症の防止と消毒薬

4426 感染症は、病原性のある細菌、寄生虫やウイルスなどが体に侵入することによって起こる望ま  
4427 しくない反応で、日常生活で問題となるのは、飛沫感染するものや経口感染するものが多い。

4428 特に食中毒は、手指や食品、調理器具等に付着した細菌、寄生虫やウイルスが、経口的に体内  
4429 に入って増殖することで生じる。一般に、夏は細菌による食中毒が、冬はウイルスによる食中毒  
4430 が発生することが多いと言われている。通常健康状態にある人では、生体に元来備わっている  
4431 防御機能が働くため、一般的には、石けん<sup>せん</sup>で十分に手洗いを行い、器具等については煮沸消毒  
4432 等を行うといった対応により食中毒を防止することができる。しかし、煮沸消毒が困難な器具等  
4433 もあり、また、食中毒の流行時期や、明らかに感染者が身近に存在するような場合には、集団感  
4434 染を防止するため念入りに、化学薬剤（消毒薬）を用いた処置を行うことが有効とされる。

4435 殺菌・消毒は生存する微生物の数を減らすために行われる処置であり、また滅菌は物質中のす  
4436 べての微生物<sup>clxix</sup>を殺滅又は除去することである。消毒薬が微生物を死滅させる仕組み及び効果は、  
4437 殺菌消毒成分の種類、濃度、温度、時間、消毒対象物の汚染度、微生物の種類や状態などによっ  
4438 て異なる。消毒薬によっては、殺菌消毒効果が十分得られない微生物が存在し（全く殺菌消毒で  
4439 きない微生物もある。）、さらに、生息条件が整えば消毒薬の溶液中で生存、増殖する微生物もい  
4440 る。殺菌・消毒の対象となる微生物を考慮し、適切な医薬品の選択、定められた用法に従って適  
4441 正な使用がなされることが重要である。

4442

#### 4443 2) 代表的な殺菌消毒成分、取扱い上の注意等

##### 4444 (a) 手指・皮膚の消毒のほか、器具等の殺菌・消毒にも用いられる成分

4445 手指又は皮膚の殺菌・消毒を目的とする消毒薬のうち、配合成分やその濃度等が明らかじ  
4446 め定められた範囲内である製品については、医薬部外品として流通することが認められてい  
4447 る。器具等の殺菌・消毒を併せて目的とする製品については、医薬品としてのみ製造販売さ  
4448 れている。

##### 4449 ① クレゾール石けん<sup>けん</sup>液

4450 結核菌を含む一般細菌類、真菌類に対して比較的広い殺菌消毒作用を示すが、大部分のウ  
4451 イルスに対する殺菌消毒作用はない。

4452 日本薬局方に収載されているクレゾール石けん<sup>けん</sup>液は、原液を水で希釈して用いられるが、

<sup>clxix</sup>肉眼ではその存在を知ることが出来ず、顕微鏡などによって観察できる程度以下の生物を指す。細菌だけでなく、藻類、原生動物、菌類やごく小型の動物なども含まれる。

4453 刺激性が強いため、原液が直接皮膚に付着しないようにする必要がある。付着した場合には  
 4454 直ちに石けん<sup>けん</sup>水と水で洗い流し、炎症等を生じたときには医師の診療を受けるなどの対応  
 4455 が必要である。

4456 同様な殺菌消毒作用を有する成分として、ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、  
 4457 ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル等が用いられることもある。

4458 ② エタノール、イソプロパノール

4459 アルコール分が微生物のタンパク質を変性させ、それらの作用を消失させることから、結  
 4460 核菌を含む一般細菌類、真菌類、ウイルスに対する殺菌消毒作用を示す。ただし、イソプロ  
 4461 パノールでは、ウイルスに対する不活性効果はエタノールよりも低い。

4462 脱脂による肌荒れを起こしやすく、皮膚へ繰り返し使用する場合には適さない。粘膜刺  
 4463 激性があり、粘膜面や目の回り、傷がある部分への使用は避けることとされている。揮発性  
 4464 で引火しやすく、また、広範囲に長時間使用する場合には、蒸気の吸引にも留意する必要が  
 4465 ある。

4466 ③ クロルヘキシジングルコン酸塩

4467 クロルヘキシジングルコン酸塩の殺菌消毒作用に関する出題については、X（皮膚に用い  
 4468 る薬）を参照して作成のこと。

4469 (b) 専ら器具、設備等の殺菌・消毒に用いられる成分

4470 ① 塩素系殺菌消毒成分

4471 次亜塩素酸ナトリウムやサラシ粉などの塩素系殺菌消毒成分は、強い酸化力により一般細  
 4472 菌類、真菌類、ウイルス全般に対する殺菌消毒作用を示すが、皮膚刺激性が強いため、通常  
 4473 人体の消毒には用いられない。

4474 金属腐食性があるとともに、プラスチックやゴム製品を劣化させる。また、漂白作用があ  
 4475 り、毛、絹、ナイロン、アセテート、ポリウレタン、色・柄物等には使用を避ける必要があ  
 4476 る。酸性の洗剤・洗浄剤と反応して有毒な塩素ガスが発生するため、混ざらないように注意  
 4477 する必要がある。

4478 なお、吐瀉物<sup>しよ</sup>や血液等が床等にこぼれたときの殺菌消毒にも適しているが、有機物の影響  
 4479 を受けやすいので、殺菌消毒の対象物を洗浄した後に使用した方が効果的である。

4480 ② 有機塩素系殺菌消毒成分

4481 ジクロロ<sup>ろ</sup>ルイソシアヌル酸ナトリウム、トリクロ<sup>ろ</sup>ルイソシアヌル酸等の有機塩素系殺菌  
 4482 消毒成分は、塩素臭や刺激性、金属腐食性が比較的抑えられており、プール等の大型設備の  
 4483 殺菌・消毒に用いられることが多い。

4484

4485 【誤用・事故等による中毒への対処】 基本的に応急処置の後には、すみやかに医療機関に受診す  
 4486 るなどの対応が必要である。

4487 (a) 誤って飲み込んだ場合

4488 一般的な家庭における応急処置として、通常は多量の牛乳など<sup>clxx</sup>を飲ませるが、手元に何  
4489 もないときはまず水を飲ませる。いずれにしても中毒物質の消化管からの吸収を遅らせ、粘  
4490 膜を保護するために誤飲してから数分以内に行う。なお、原末や濃厚液を誤って飲み込んだ  
4491 場合には、自己判断で安易に吐き出させることは避ける。

4492 (b) 誤って目に入った場合

4493 顔を横に向けて上から水を流すか、水道水の場合には弱い流れの水で洗うなどにより、流  
4494 水で十分に（15分間以上）洗眼する。水流が強いと目に障害を起こすことがある。目が痛  
4495 くて開けられない時には、水を満たした容器に顔をつけて、水の中で目を開けてもよい。

4496 酸やアルカリが目に入った場合は、早期に十分な水洗がされることが重要であり、特にア  
4497 ルカリ性物質の場合には念入りに水洗する。なお、酸をアルカリで中和したり、アルカリを  
4498 酸で中和するといった処置は、熱を発生して刺激をかえって強め、状態が悪化するおそれ  
4499 あるため適切ではない。

4500 (c) 誤って皮膚に付着した場合

4501 流水をかけながら着衣を取り、石けん<sup>洗</sup>を用いて流水で皮膚を十分に（15分間以上）水  
4502 洗する。酸やアルカリは早期に<sup>に</sup>十分な水洗がなされることが重要であり、特にアルカリ性  
4503 の場合には念入りに水洗する。目に入った場合と同様、中和剤は用いない。

4504 (d) 誤って吸入した場合

4505 意識がない場合は新鮮な空気の所へ運び出し、人工呼吸などをする。

4506

4507 2 殺虫剤・忌避剤

4508 殺虫剤・忌避剤のうち、ハエ、ダニ、蚊等の衛生害虫の防除を目的とする殺虫剤・忌避剤は医  
4509 薬品又は医薬部外品として、法による規制の対象とされている。殺虫剤・忌避剤のうち、人体に  
4510 対する作用が緩和な製品については医薬部外品として製造販売されているが、原液を用時希釈し  
4511 て用いるもの、長期間にわたって持続的に殺虫成分を放出させる又は一度に大量の殺虫成分を放  
4512 出させるもの、劇薬に該当するもの等、取扱い上、人体に対する作用が緩和とはいえない製品に  
4513 ついては医薬品として扱われる。

4514 忌避剤は人体に直接使用されるが、蚊、ツツガムシ、トコジラミ（ナンキンムシ）、ノミ等が人  
4515 体に取り付いて吸血したり、病原細菌等を媒介するのを防止するものであり、虫さされによる痒  
4516 みや腫れなどの症状を和らげる効果はない。

4517 1) 衛生害虫の種類と防除

4518 疾病を媒介したり、飲食物を汚染するなどして、保健衛生上の害を及ぼす昆虫等を衛生害虫と

<sup>clxx</sup> 牛乳以外にも、卵白を水に溶いた卵白水や、小麦粉を水で溶いたものを用いてもよい。なお、これらを作るのに手間がかかる場合は早めに水を飲ませることを優先すべきである。

4519 いう<sup>clxxi</sup>。代表的な衛生害虫の種類と防除に関する出題については、以下の内容から作成のこと。

4520 (a) ハエ

4521 ハエ（イエバエ、センチクバエ等）は、赤痢菌、チフス菌、コレラ菌、O-157大腸菌  
4522 等の病原菌や皮膚疾患、赤痢アメーバ、寄生虫卵、ポリオウイルスの伝播など様々な病原体  
4523 を媒介する。また、人の体内や皮膚などに幼虫（ウジ）が潜り込み、組織や体液や消化器官  
4524 内の消化物を食べて直接的な健康被害を与えるハエ蛆症<sup>うじ</sup>と呼ばれる症状もある。

4525 ハエの防除の基本は、ウジの防除である。ウジの防除法としては、通常、有機リン系殺虫  
4526 成分が配合された殺虫剤が用いられる。薬液がウジの生息場所に十分行き渡るよう散布され  
4527 ることが重要であるが、厨芥<sup>ちゅうがい</sup>（生ごみ）がビニール袋に入っているなどして薬液が浸透しな  
4528 い場合や、薬液をかけた後に乾燥させるのが困難な場合には、主に成虫の防除を行うことにな  
4529 る。成虫の防除では、医薬品の殺虫剤（希釈して噴霧する）も用いられるが、一般家庭に  
4530 においては、調製を要さずそのまま使用できる医薬部外品の殺虫剤（エアゾールなど）や、ハ  
4531 エ取り紙などの物理的な方法が用いられることが多い。

4532 (b) 蚊

4533 蚊（アカイエカ、シナハマダラカ等）は、吸血によって皮膚に発疹<sup>しん</sup>や痒み<sup>かゆ</sup>を引き起こす<sup>clxxii</sup>  
4534 ほか、日本脳炎、マラリア、黄熱、デング熱等の重篤な病気を媒介する。

4535 水のある場所に産卵し、幼虫（ボウフラ）となって繁殖する。人が蚊に刺される場所と蚊  
4536 が繁殖する場所が異なるため、種類による生息、発生場所に合わせた防除が必要となる。

4537 ボウフラが成虫にならなければ保健衛生上の有害性はないため、羽化するまでに防除を行  
4538 えばよい。ボウフラの防除では水系に殺虫剤を投入することになるため、生態系に与える影  
4539 響を考慮して適切な使用を行う必要がある。

4540 成虫の防除では、医薬品の殺虫剤（希釈して噴霧する）も用いられるが、一般家庭におい  
4541 ては、調製を要さずそのまま使用できる医薬部外品の殺虫剤（蚊取り線香、エアゾール等）  
4542 が用いられることが多い。なお、野外など殺虫剤の効果が十分期待できない場所では、忌避  
4543 剤を用いて蚊による吸血の防止を図ることとなる。

4544 (c) ゴキブリ

4545 ゴキブリ（チャバネゴキブリ、クロゴキブリ等）は、食品にサルモネラ菌、ブドウ球菌、腸  
4546 炎ビブリオ菌、ボツリヌス菌、O-157大腸菌等を媒介する。また、アメーバ赤痢等の中  
4547 間宿主になっている。

4548 ゴキブリは、暗所、風のない場所、水分のある場所、暖かい場所を好むので、該当する場

<sup>clxxi</sup> 外敵から身を守るために人体に危害を与えることがあるもの（ハチ、ドクガ、ドクグモ、サソリ等）は衛生害虫に含まれない。

<sup>clxxii</sup> 蚊のほか、ブユ（ニホンヤマブユ、アオキツメトビブユ等）、アブ（アカウシアブ、シロフアブ等）、ヌカカ（ホシヌカカ、イソヌカカ等）も、吸血によって皮膚に発疹<sup>しん</sup>や痒み<sup>かゆ</sup>を引き起こす。これらが病気を媒介することは日本我が国ではほとんどないが、刺された部位の皮膚症状は、蚊よりもひどくなることもある。

4549 所を中心に防除を行うのが効果的とされている。

4550 燻蒸処理を行う場合、ゴキブリの卵は医薬品の成分が浸透しない殻で覆われているため、  
4551 殺虫効果を示さない。そのため3週間位後に、もう一度燻蒸処理を行い、孵化した幼虫を駆  
4552 除する必要がある。

4553 (d) シラミ

4554 シラミの種類ごとに寄生対象となる動物が決まっているため、ヒト以外の動物に寄生する  
4555 シラミがヒトに寄生して直接的な害を及ぼすことはない。ヒトに寄生するシラミ（コロモジ  
4556 ラミ、アタマジラミ、ケジラミ等）による保健衛生上の害としては、吸血箇所の激しい痒み  
4557 clxxiiiと日本紅斑熱や発疹チフス等の病原細菌であるリケッチア（リケッチアは人獣共通して  
4558 感染する）の媒介である。

4559 シラミの防除は、医薬品による方法以外に物理的方法もある。物理的方法としては、散髪  
4560 や洗髪、入浴による除去、衣服の熱湯処理などがある。医薬品による方法では、殺虫成分と  
4561 してフェノトリンが配合されたシャンプーやてんか粉が用いられるclxxiv。また、シラミの成虫  
4562 が脱落して次の宿主に伝染しやすい場所には殺虫剤を散布して、寄生の拡散防止を図ること  
4563 も重要である。

4564 (e) トコジラミ

4565 トコジラミは、シラミの一種でなくカメムシ目に属する昆虫で、ナンキンムシとも呼ばれ  
4566 る。トコジラミに刺されると激しい痒痛を生じ、アレルギー反応による全身の発熱、睡眠不  
4567 足、神経性の消化不良を起こすことがある。また、ときにペスト、再帰熱、発疹チフスを媒  
4568 介することもある。

4569 トコジラミは床や壁の隙間、壁紙の裏、畳の敷き合わせ目、ベッド等に潜伏する。その防  
4570 除にはハエ、蚊、ゴキブリと同様な殺虫剤が使用されるが、体長が比較的大きい（成虫で約  
4571 8 mm）ので、電気掃除機で隅々まで丁寧に吸引することによる駆除も可能である。

4572 (f) ノミ

4573 ノミによる保健衛生上の害としては、主に吸血されたときの痒みであるが、ノミは、元来、  
4574 ペスト等の病原細菌を媒介する衛生害虫であるclxxv。近年、ヒトノミの生息数は激減している  
4575 が、ノミはシラミと異なり宿主を厳密に選択しないため、ペット等に寄生しているノミによ  
4576 る被害がしばしば発生している。

4577 そのためノミの防除には、イヌやネコなどに寄生しているノミに対して、ノミ取りシャン  
4578 プーや忌避剤などが用いられる。また、シラミが終生を宿主に寄生して生息するのに対して、

clxxiii 吸血された部位を掻くことで化膿することもある。

clxxiv なお、フェノトリンには、シラミの刺咬による痒みや腫れ等の症状を和らげる作用はない。

clxxv 日本にはほとんど存在しないが、ケオブスネズミノミ、ヨーロッパネズミノミが生息している地域では、現在でも、保健衛生上大きな問題となっている。

4579 ノミはペットの寝床やよくいる場所、部屋の隅の埃ほこりの中などで幼虫が育つ<sup>clxxvi</sup>ため、電気掃  
4580 除機による吸引や殺虫剤の散布などによる駆除を行うことも重要である。

4581 (g) イエダニ、ツツガムシ

4582 イエダニは、ネズミを宿主として移動し生息場所を広げていく。吸血による刺咬こうのため激  
4583 しい痒みかゆを生じる。また、発疹熱しんなどのリケッチア、ペストなどを媒介する。イエダニの防  
4584 除には、まず宿主動物であるネズミを駆除することが重要であるが、ネズミを駆除すること  
4585 で、宿主を失ったイエダニが吸血源を求めて散乱するため、併せてイエダニの防除も行われ  
4586 る。イエダニの防除には、殺虫剤による燻蒸くん処理等が行われる。

4587 ツツガムシは、ツツガムシ病リケッチアを媒介するダニの一種である。ヒトの生活環境で  
4588 なく野外に生息し<sup>clxxvii</sup>、目視での確認が困難であるため、ツツガムシが生息する可能性があ  
4589 る場所に立ち入る際には、専ら忌避剤による対応が図られる。その場合、忌避剤の使用だけ  
4590 に頼らず、なるべく肌の露出を避け、野外活動後は入浴や衣服の洗濯を行う等の防御方法を  
4591 心がけることが重要である。

4592 (h) 屋内塵性ダニ（ツメダニ類、ヒョウヒダニ類、ケナガコナダニ等）

4593 ツメダニ類は、通常は他のダニや昆虫の体液を吸って生きているが、大量発生したときに  
4594 はヒトが刺されることがある。刺されるとその部位が赤く腫れて痒みかゆを生じる。

4595 ヒョウヒダニ類やケナガコナダニについては、ヒトを刺すことはないが、ダニの糞ふんや死骸  
4596 がアレルギーとなって気管支喘息ぜんやアトピー性皮膚炎などを引き起こすことがある。

4597 屋内塵性ダニが生息する環境は、どんな住居にも存在し、完全に駆除することは困難であ  
4598 る。また、一定程度まで生息数を抑えれば保健衛生上の害は生じないので、増殖させない  
4599 ということを基本に防除が行われることが重要である。

4600 殺虫剤の使用についてはダニが大量発生した場合のみとし、まずは畳、カーペット等を直  
4601 射日光下に干すなど、生活環境の掃除を十分行うことが基本とされている。併せて、室内の  
4602 換気を改善し湿度を下げることも、ダニの大量発生の防止につながる。

4603 殺虫剤を散布する場合には、湿度がダニの増殖の要因になるため、水で希釈する薬剤の使用  
4604 は避け、エアゾール、粉剤が用いられることが望ましい。医薬品の散布が困難な場合には、  
4605 燻蒸くん処理等が行われる。

4606

4607 2) 代表的な配合成分・用法、誤用・事故等への対処

4608 殺虫剤使用に当たっては、殺虫作用に対する抵抗性が生じるのを避けるため、同じ殺虫成分を  
4609 長期間連用せず、いくつかの殺虫成分を順番に使用していくことが望ましい。

4610 (a) 有機リン系殺虫成分

<sup>clxxvi</sup> ノミの幼虫は吸血せず、成虫の糞ふんや宿主動物の体表から脱落した有機物などを食べて育つ。

<sup>clxxvii</sup> 吸血はせず、幼虫期の一時期だけ動物に寄生して皮膚の老廃物などを摂食する。



4611 代表的な有機リン系殺虫成分として、ジクロロポス、ダイアジノン、フェニトロチオン、  
4612 フェンチオン、トリクロロホン、クロルピリホスメチル、プロピタンホス等がある。

4613 殺虫作用は、アセチルコリンを分解する酵素（アセチルコリンエステラーゼ）と不可逆的  
4614 に結合してその働きを阻害することによる。これらの殺虫成分は、ほ乳類や鳥類では速やか  
4615 に分解されて排泄されるため毒性は比較的低い。ただし、高濃度又は多量に曝露した場合（特  
4616 くに、誤って飲み込んでしまった場合）には、神経の異常な興奮が起こり、縮瞳、呼吸困難、筋  
4617 肉麻痺等の症状が現れるおそれがある。これらの症状が見られたときは、直ちに医師の診断  
4618 を受ける必要がある。

4619 (b) ピレスロイド系殺虫成分

4620 除虫菊の成分から開発された成分で、比較的速やかに自然分解して残効性が低いため、家  
4621 庭用殺虫剤に広く用いられている。主なピレスロイド系殺虫成分として、ペルメトリン、フ  
4622 ェノトリン、フタルスリン等がある。このうちフェノトリンは、殺虫成分で唯一人体に直接  
4623 適用されるものである（シラミの駆除を目的とする製品の場合）。

4624 殺虫作用は、神経細胞に直接作用して神経伝達を阻害することによるものである。高濃度  
4625 又は多量に曝露して身体に異常が現れた場合には、医師の診療を受けるなどの対応が必要で  
4626 ある。

4627 (c) カーバメイト系殺虫成分、オキサジアゾール系殺虫成分

4628 プロポクスルに代表されるカーバメイト系殺虫成分、メトキサジアゾンに代表されるオキ  
4629 サジアゾール系殺虫成分は、いずれも有機リン系殺虫成分と同様にアセチルコリンエステラ  
4630 ーゼの阻害によって殺虫作用を示すが、有機リン系殺虫成分と異なり、アセチルコリンエス  
4631 テラーゼとの結合は可逆的である。ピレスロイド系殺虫成分に抵抗性を示す害虫の駆除に用  
4632 いられる。

4633 一般に有機リン系殺虫成分に比べて毒性は低い、高濃度又は多量に曝露して呼吸困難等  
4634 の症状が出た場合には、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。

4635 (d) 有機塩素系殺虫成分

4636 有機塩素系殺虫成分（DDT等）は、日本我が国ではかつて広く使用され、感染症の撲滅  
4637 に大きな効果を上げたが、残留性や体内蓄積性の問題から、現在ではオルトジクロロベンゼ  
4638 ンがウジ、ボウフラの防除の目的で使用されているのみとなっている。

4639 殺虫作用は、ピレスロイド系殺虫成分と同様、神経細胞に対する作用に基づくものである。

4640 (e) 昆虫成長阻害成分

4641 直接の殺虫作用ではなく、昆虫の脱皮や変態を阻害する作用を有する成分で、有機リン系  
4642 殺虫成分やピレスロイド系殺虫成分に対して抵抗性を示す場合にも効果がある。

4643 メトプレンやピリプロキシフェンは、幼虫が十分成長して蛹になるのを抑えているホルモ  
4644 ン（幼若ホルモン）に類似した作用を有し、幼虫が蛹になるのを妨げる。蛹にならずに成虫

4645 になる不完全変態の昆虫やダニには無効である。

4646 ジフルベンズロンは、脱皮時の新しい外殻の形成を阻害して、幼虫の正常な脱皮をできな  
4647 くする。

4648 (f) その他の成分

4649 ① 殺虫補助成分

4650 それ自体の殺虫作用は弱い、又はほとんどないが、殺虫成分とともに配合されることに  
4651 より殺虫効果を高める成分として、ピペニルブトキシド（PBO）やチオシアノ酢酸イソボ  
4652 ルニル（IBTA）などがある。

4653 ② 忌避成分

4654 ~~ディートは最も効果的で、効果の持続性も高いとされ、医薬品（又は医薬部外品）の忌~~  
4655 ~~避剤の有効成分として用いられ、最も効果的で、効果の持続性も高いとされている。その忌~~  
4656 ~~避作用は、虫が一般にこの物質の臭いを嫌うためと考えられているが、詳細は分かっていな~~  
4657 ~~い。また、イカリジンは、年齢による使用制限がない忌避成分で、蚊やマダニなどに対して~~  
4658 ~~効果を発揮する。~~

4659

4660 ● 主な剤形、用法

4661 (a) スプレー剤

4662 医薬品を空間中に噴霧するもので、原液を水で希釈して噴霧に用いる製品もある。

4663 (1) 衛生害虫に直接噴射して殺滅させるもの、(2) 害虫が潜んでいる場所や通り道に吹き  
4664 付けるもの（残留噴射）、(3) 部屋を閉め切って部屋の広さに応じて一定時間噴射し、室内に  
4665 いる虫を殺滅させるもの（空間噴射）等がある。

4666 (b) 燻蒸剤

4667 空間噴射の殺虫剤のうち、容器中の医薬品を煙状又は霧状にして一度に全量放出させるも  
4668 のである。霧状にして放出するものは、煙状にするものに比べて、噴射された粒子が微小で  
4669 あるため短時間で部屋の隅々まで行き渡るというメリットがある。

4670 燻蒸処理が完了するまでの間、部屋を締め切って退出する必要がある<sup>elxxviii</sup>。処理後は換気  
4671 を十分に行い、ダニやゴキブリの死骸を取り除くために掃除機をかけることも重要である。

4672 (c) 毒餌剤（誘因殺虫剤）

4673 殺虫成分とともに、対象とする衛生害虫（主にゴキブリ）を誘引する成分を配合し、マッ  
4674 ト状、ペレット状、ペースト状等にしたものである。害虫が潜んでいる場所や通り道に置いて、  
4675 害虫が摂食したときに殺虫効果を発揮するものである。乳幼児等が誤って口に入れたり  
4676 しないよう、十分留意する必要がある。

<sup>elxxviii</sup> 犬、猫等のペットや観葉植物は部屋の外に出し、小鳥や魚については、<sup>くん</sup>燻蒸処理後2～3日間部屋に戻さないことが望ましい。カブトムシなどの昆虫類は、1週間は部屋に持ち込むべきではない。

4677 (d) 蒸散剤

4678 殺虫成分を基剤に混ぜて整形し、加熱したとき又は常温で徐々に揮散するようにしたもの  
4679 である。医薬部外品となっている製品を除き、通常、一般の家庭で使用されることは少ない。

4680 (e) 粉剤・粒剤

4681 粉剤は、殺虫成分を粉体に吸着させたもので、主にダニやシラミ、ノミの防除において散  
4682 布される。粒剤は、殺虫成分を基剤に混ぜて粒状にしたもので、ボウフラの防除において、  
4683 ボウフラが生息する水系に投入して使用されるもの等がある。

4684 (f) 乳剤・水和剤

4685 原液を水で希釈して使用するもので、包装単位が大きい製品が多く、通常、個人で用いる  
4686 よりも地域ぐるみの害虫駆除で使用される。

4687 (g) 油剤

4688 湿気を避ける必要がある場所でも使用できるが、噴射器具を必要とし、包装単位が大きい  
4689 製品が多いため、一般の生活者が家庭において使用することはほとんどない。

4690

4691 【殺虫剤を使用する際の一般的な留意事項】 殺虫剤を噴霧・散布する際は、なるべく防護ゴー  
4692 グル、マスク、手袋、肌の露出度の低い衣服を着用し、定められた用法・用量を厳守して使用  
4693 する。医薬品が皮膚に付着した場合には、直ちに石けん<sup>けん</sup>水で洗い流し、目や口に入らないよ  
4694 うにする。また、食品、食器、玩具等に医薬品がかからないよう、あらかじめ他の場所へ移動  
4695 させるか収納しておく（食器棚の扉を開けて殺虫する場合は、食品と食器はビニール袋に入れ  
4696 て密閉する。）必要がある。

4697 殺虫剤を使用したあとに身体に異常が現れた場合、又は誤って殺虫用医薬品を飲み込んだ場  
4698 合には、その製品が何系の殺虫成分を含むものであるかを医師に伝えて診療を受けるなどの対  
4699 応が必要である。

4700

4701 【忌避剤を使用する際の一般的な留意事項】 基本的に、忌避剤は漫然な使用を避け、蚊、ブユ  
4702 （ブヨ）等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用することが重要である。また、スプ  
4703 レー剤等を使用した場合も塗りむらがあると忌避効果が落ちるため、手で塗り拡げるなどして、  
4704 必要以上に使用しないこと。

4705 粘膜刺激性があるため、創傷面、目の周囲、粘膜等に薬剤が触れないようにする必要がある。  
4706 また、皮膚にひどい湿疹<sup>しん</sup>やただれを起こしている人では、使用を避けるべきである。なお、薬  
4707 剤により合成繊維やプラスチック製品の腐食を生じることがある。

4708 スプレー剤となっている忌避剤を顔面に使用する場合は、目や口の粘膜に触れることのない  
4709 よう、いったん手のひらに噴霧してから塗布する（その場合、塗布した手で目を擦らないよう  
4710 にする。）等、直接顔面に噴霧しないようにする必要がある。また、玄関のような狭い場所で使

4711 用することも、目や口の粘膜に触れやすくなるため、避けるべきである。万一、目に入ったと  
 4712 きは直ちに大量の水でよく洗い流し、症状が重い場合には、使用した医薬品の含有成分（例え  
 4713 ば、ディートとアルコール）を眼科医に伝えて診療を受けることとされている。

4714 ディートについては、外国において動物実験（ラット皮膚塗布試験）で神経毒性が示唆され  
 4715 ているため、ディートを含有する忌避剤（医薬品及び医薬部外品）は、生後6ヶ月未満の乳児  
 4716 への使用を避けることとされている。また、生後6ヶ月から12歳未満までの小児については、  
 4717 顔面への使用を避け、1日の使用限度（6ヶ月以上2歳未満：1日1回、2歳以上12歳未満：  
 4718 1日1～3回）を守って使用する必要がある。

4719

## 4720 XVI 一般用検査薬

### 4721 1 一般用検査薬とは

4722 専ら疾病の診断に使用されることが目的とされる医薬品のうち、人体に直接使用されることの  
 4723 ないものを体外診断用医薬品という。体外診断用医薬品の多くは医療用検査薬であるが、一般用  
 4724 検査薬については薬局又は医薬品の販売業（店舗販売業、配置販売業）において取り扱うことが  
 4725 認められている。

4726 一般用検査薬<sup>clxxxix</sup>は、一般の生活者が正しく用いて健康状態を把握し、速やかな受診につなげる  
 4727 ことで疾病を早期発見するためのものである。

4728 検査に用いる検体は、尿、糞便、鼻汁、唾液、涙液など採取に際して侵襲（採血や穿刺等）の  
 4729 ないものである。検査項目は、学術的な評価が確立しており、情報の提供により結果に対する適  
 4730 切な対応ができるものであり、健康状態を把握し、受診につなげていけるものである。なお、悪  
 4731 性腫瘍、心筋梗塞や遺伝性疾患など重大な疾患の診断に関係するものは一般用検査薬の対象外で  
 4732 ある。

4733

### 4734 【販売時の留意点】

4735 販売を行う際には、各検査薬の一般用医薬品の分類による販売方法を行うとともに、次の事項  
 4736 について、製品や添付文書等を用い、購入者等が購入後も確認できるようにわかり易く説明する  
 4737 <sup>clxxx</sup>。また、相談に応じる体制を充実し、購入者等に問い合わせ先を周知するとともに、検査項目  
 4738 によっては、プライバシーに配慮した形で製品の説明を行うことが望ましい。

4739 ・専門的診断におきかわるものでないことについてわかり易く説明する。

4740 ・検査薬の使い方や保管上の注意についてわかり易く説明する。

4741 ・検体の採取時間とその意義をわかり易く説明する。

<sup>clxxxix</sup> 「体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用について」（平成26年12月25日薬食発1225第1号厚生労働省医薬食品局長通知）

<sup>clxxx</sup> 「一般用検査薬の販売時の情報提供の充実について」（平成26年12月25日薬食機参発1225第4号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）、薬食総発1225第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知）

- 4742 ・妨害物質及び検査結果に与える影響をわかり易く説明する。
- 4743 ・検査薬の性能についてわかり易く説明する。
- 4744 ・検査結果の判定についてわかり易く説明する。
- 4745 ・適切な受診勧奨を行う。特に、医療機関を受診中の場合は、通院治療を続けるよう説明する。
- 4746 ・その他購入者等からの検査薬に関する相談には積極的に応じること。

4747

4748 【検出感度、偽陰性・偽陽性】

4749 検査薬は、対象とする生体物質を特異的に検出するように設計されている。しかし、検体中  
4750 の対象物質の濃度が極めて低い場合には検出反応が起こらずに陰性の結果が出る。検出反応が  
4751 起こるための最低限の濃度を検出感度（又は検出限界）という。

4752 検体中に存在しているにもかかわらず、その濃度が検出感度以下であったり、検出反応を妨  
4753 害する他の物質の影響等によって、検査結果が陰性となった場合を偽陰性という。逆に、検  
4754 体中に存在していないにもかかわらず、検査対象外の物質と非特異的な反応が起こって検査結  
4755 果が陽性となった場合を偽陽性という。

4756 生体から採取された検体には予期しない妨害物質や化学構造がよく似た物質が混在すること  
4757 があり、いかなる検査薬においても偽陰性・偽陽性を完全に排除することは困難である<sup>clxxx1</sup>。

4758 また、検査薬が高温になる場所に放置されたり、冷蔵庫内に保管されていたりすると、設計  
4759 どおりの検出感度を発揮できなくなるおそれがある。

4760

4761 2 尿糖・尿タンパク検査薬

4762 1) 尿中の糖・タンパク値に異常を生じる要因

4763 泌尿器系の機能が正常に働いていて、また、血糖値が正常であれば、糖分やタンパク質は腎臓  
4764 の尿細管においてほとんどが再吸収される。

4765 尿糖値に異常を生じる要因は、一般に高血糖と結びつけて捉えられることが多いが、腎性糖尿  
4766 等のように高血糖を伴わない場合もある。尿中のタンパク値に異常を生じる要因については、腎  
4767 臓機能障害によるものとして腎炎やネフローゼ、尿路に異常が生じたことによるものとして尿路  
4768 感染症、尿路結石、<sup>ぼうこう</sup>膀胱炎等がある。

4769

4770 2) 検査結果に影響を与える要因、検査結果の判断、受診勧奨

4771 【検査結果に影響を与える要因】 尿糖・尿タンパクの検査結果に影響を与える主な要因として  
4772 以下のものがある。

4773 (a) 採尿に用いた容器の汚れ

<sup>clxxx1</sup> 一般に、検出感度を鋭敏にしようとする、非特異的な反応が起こりやすくなって偽陽性を生じる可能性が高くなる。また、偽陽性を生じることを避けるため特異性を高めると、検出感度が鈍くなる。

4774 糖分やタンパク質が付着している容器に尿を採取すると正確な検査結果が得られないので、  
4775 清浄な容器を使用する必要がある。

4776 (b) 採尿のタイミング

4777 尿糖検査の場合、食後1～2時間等、検査薬の使用方法に従って採尿を行う。尿タンパク  
4778 の場合、原則として早朝尿<sup>elxxxii</sup>（起床直後の尿）を検体とし、激しい運動の直後は避ける必  
4779 要がある。

4780 尿糖・尿タンパク同時検査の場合、早朝尿（起床直後の尿）を検体とするが、尿糖が検出  
4781 された場合には、食後の尿について改めて検査して判断する必要がある。

4782 (c) 採尿の仕方

4783 出始めの尿では、尿道や外陰部等に付着した細菌や分泌物が混入することがあるため、中  
4784 間尿を採取して検査することが望ましい。

4785 (d) 検体の取扱い

4786 採取した尿を放置すると、雑菌の繁殖等によって尿中の成分の分解が進み、検査結果に影  
4787 響を与えるおそれがあるので、なるべく採尿後速やかに検査することが望ましい。

4788 (e) 検査薬の取扱い

4789 尿糖又は尿タンパクを検出する部分を直接手で触れると、正確な検査結果が得られなくな  
4790 ることがある。また、長い間尿に浸していると検出成分が溶け出してしまい、正確な検査結  
4791 果が得られなくなることがある。

4792 (f) 食事等の影響

4793 通常、尿は弱酸性であるが、食事その他の影響で中性～弱アルカリ性に傾くと、正確な検  
4794 査結果が得られなくなることがある。また、医薬品の中にも、検査結果に影響を与える成分  
4795 を含むものがある。医師（又は歯科医師）から処方された薬剤（医療用医薬品）や一般用医  
4796 薬品を使用している場合には、医師等又は薬剤師に相談するように説明するべきである。

4798 **【検査結果の判断、受診勧奨】** 尿糖・尿タンパク検査薬は、尿中の糖やタンパク質の有無を調  
4799 べるものであり、その結果をもって直ちに疾患の有無や種類を判断することはできない。

4800 尿糖又は尿タンパクが陽性の場合には、疾患の確定診断や適切な治療につなげるため、早期  
4801 に医師の診断を受ける必要がある。また、検査結果では尿糖又は尿タンパクが陰性でも、何ら  
4802 かの症状がある場合は、再検査するか又は医療機関を受診して医師に相談するなどの対応が必  
4803 要である。

4804

<sup>elxxxii</sup> 早朝尿は、常に一定の条件で検査がなされるのにも適している。

## 4805 3 妊娠検査薬

## 4806 1) 妊娠の早期発見の意義

4807 妊娠の初期（妊娠12週<sup>clxxxiii</sup>まで）は、胎児の脳や内臓などの諸器官が形づくられる重要な時  
 4808 期であり、母体が摂取した物質等の影響を受けやすい時期でもある。そのため、妊娠しているか  
 4809 どうかを早い段階で知り、食事の内容<sup>clxxxiv</sup>や医薬品の使用に適切な配慮がなされるとともに、飲  
 4810 酒や喫煙、風疹や水痘（水疱瘡）などの感染症<sup>clxxxv</sup>、放射線照射等を避けることが、母子の健康に  
 4811 にとって重要となる。

4812

## 4813 2) 検査結果に影響を与える要因、検査結果の判断、受診勧奨

4814 【検査結果に影響を与える要因】 妊娠が成立すると、胎児（受精卵）を取り巻く絨毛細胞から  
 4815 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）が分泌され始め、やがて尿中にhCGが検出されるよ  
 4816 うになる。妊娠検査薬は、尿中のhCGの有無を調べるものであり、通常、実際に妊娠が成立  
 4817 してから4週目前後の尿中hCG濃度を検出感度としている。

4818 その検査結果に影響を与える主な要因として以下のものがある。

## 4819 (a) 検査の時期

4820 一般的な妊娠検査薬は、月経予定日が過ぎて概ね1週目以降の検査が推奨されている。月  
 4821 経周期が不規則な人や、月経の日数計算を間違えた場合など、それよりも早い時期に検査が  
 4822 なされ、陰性の結果が出たとしても、それが妊娠していないこと（単なる月経の遅れ）を意  
 4823 味するのか、実際には妊娠していて尿中hCGが検出感度に達していないことによる偽陰  
 4824 性であるのか判別できない。

## 4825 (b) 採尿のタイミング

4826 検体としては、尿中hCGが検出されやすい早朝尿（起床直後の尿）が向いているが、尿  
 4827 が濃すぎると、かえって正確な結果が得られないこともある。

## 4828 (c) 検査薬の取扱い、検出反応が行われる環境

4829 尿中hCGの検出反応は、hCGと特異的に反応する抗体や酵素を用いた反応であるため、  
 4830 温度の影響を受けることがあり、~~る。検査薬が高温になる場所に放置されたり、冷蔵庫内に~~  
 4831 ~~保管されていたりすると、設計どおりの検出感度を発揮できなくなるおそれがある。~~

4832 ~~また、~~検査操作を行う場所の室温が極端に高いか、又は低い場合にも、正確な検査結果が  
 4833 得られないことがある。

## 4834 (d) 検体の取扱い、検体中の混在物質

<sup>clxxxiii</sup> 妊娠が成立した日を厳密に特定することは困難なことがあり、通常、妊娠週数は最後の月経が始まった日から起算される。

<sup>clxxxiv</sup> 例えば、妊娠期間中は、食事に含まれる魚介類（クジラ等を含む。）の種類と量に留意する必要がある。また、鉄分等の栄養素が不足し、貧血になりやすくなる。

<sup>clxxxv</sup> 妊娠期間中に風疹や水痘などの感染症にかかると、胎児に先天異常を生じることがある。

4835 採取した尿を放置すると、雑菌の繁殖等によって尿中の成分の分解が進み、検査結果に影響を与えるおそれがあるので、なるべく採尿後速やかに検査がなされることが望ましい。高  
 4836 濃度のタンパク尿や糖尿の場合、非特異的な反応が生じて偽陽性を示すことがある。

4837  
 4838 (e) ホルモン分泌の変動

4839 絨毛細胞が腫瘍化している場合には、妊娠していなくてもhCGが分泌され、検査結果が  
 4840 陽性となることがある。また、本来はhCGを産生しない組織の細胞でも、腫瘍化するとh  
 4841 CGを産生するようになることがある（胃癌、膵癌、卵巣癌等）。

4842 経口避妊薬や更年期障害治療薬などのホルモン剤を使用している人では、妊娠していなく  
 4843 ても尿中hCGが検出されることがある。閉経期に入っている人も、検査結果が陽性となる  
 4844 ことがある。

4845

4846 【検査結果の判断、受診勧奨】 妊娠検査薬は、妊娠の早期判定の補助として尿中のhCGの有  
 4847 無を調べるものであり、その結果をもって直ちに妊娠しているか否かを断定することはできな  
 4848 い。妊娠の確定診断には、尿中のホルモン検査だけでなく、専門医による問診や超音波検査な  
 4849 どの結果から総合的に妊娠の成立を見極める必要がある。

4850 妊娠が成立していたとしても、正常な妊娠か否かについては、妊娠検査薬による検査結果で  
 4851 は判別できないので、妊娠週数が進むままに漫然と過ごすのではなく、早期に医師の診断を受け  
 4852 るなどの対応が必要である。また、検査結果が陰性であって月経の遅れが著しい場合には、偽  
 4853 陰性であった（実際は妊娠している）可能性のほか、続発性無月経<sup>clxxxvi</sup>等の病気であるおそ  
 4854 れもあり、医療機関を受診して専門医へ相談するなどの対応が必要である。

4855

---

<sup>clxxxvi</sup> 初潮後ある程度月経を経験した女性の月経が3ヶ月以上なくなる疾患。無理なダイエットや拒食症、過度のスポーツ等が原因でしばしば起こり得る。



## 1 第4章 薬事関係法規・制度

### 2 問題作成のポイント

- 3 ○ 薬事関係法規を遵守して医薬品を販売又は授与することができるよう、一般用医薬品の販売又は授与に関連する法令・制度の仕組みを理解していること
- 4
- 5 ○ 出題する法規・制度の根拠となる法令等を正確に理解していることを確認するため、原則、各
- 6 条文等を出題根拠とするとともに、設問からあいまいさを排除すること
- 7

### 8 I 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等

9 一般用医薬品の販売に関連する法令のうち、最も重要な法令は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律である。

11 法第1条において、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」ことを定めている。

16 また、法第1条の4においては、医薬品等関連事業者等の責務として「医薬品等の製造販売、製造（小分けを含む。以下同じ。）、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第4条第1項の許可を受けた者（以下「薬局開設者」という。）又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設（略）の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。」旨が、法第1条の5 [第1項](#)においては、医薬関係者の責務として「医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者（略）及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。」旨が定められている。よって、登録販売者は、購入者等に対して正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努める必要がある<sup>elxxxvii</sup>。[このため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。）第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16<sup>elxxxviii</sup>に基づき、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働省大](#)

<sup>elxxxvii</sup> 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は、研修の専門性、客観性、公正性等の確保の観点より、一般用医薬品販売業者等が自ら登録販売者に対し研修を適切に行うことに加え、外部の研修実施機関が行う研修（外部研修）を受講させることが求められている。

<sup>elxxxviii</sup> 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令第133号）による改正後（令和4年4月1日施行）。

31 臣に届出を行った者（研修実施機関）が行う研修を毎年度受講させなければならないこととされ  
32 ている。さらに、法第1条の6においては、国民の役割として、「国民は、医薬品等を適正に使用  
33 するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければなら  
34 ない。」とされており、購入者が求める知識、理解に応えることが求められている。

#### 35 【登録販売者】

36 登録販売者は、法第4条第5項第1号において、「法第36条の8第2項の登録を受けた者をい  
37 う」と規定されている。一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質  
38 を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者であって、医薬品の販売又  
39 は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならないとされており（法  
40 第36条の8第2項）、申請者が法第5条第3号イからトまでのいずれかに該当する場合は、  
41 その登録を受けることができないとされている（法第36条の8第3項）。

42 この都道府県知事が行う試験の受験に当たっては、一定の学歴や実務経験を要することとされ  
43 ていたが、実務経験の不正証明などの事案を受け、平成27年度以降の試験においては、この受  
44 験資格を撤廃し、管理者又は管理代行者となる登録販売者に一定の実務・業務経験が必要とされ  
45 た。

46 販売従事登録の申請については、~~医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関~~  
47 ~~する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。）~~第159条の7において  
48 次のように規定されている。

49 「販売従事登録を受けようとする者は、様式第八十六の二による申請書を医薬品の販売又は授  
50 与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事（配置販売業にあつて  
51 は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。以下この条において同じ。）  
52 に提出しなければならない。

53 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際  
54 当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由し  
55 て厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、こ  
56 の限りではない。

57 一 販売従事登録を受けようとする申請者（以下この項において「申請者」という。）が登  
58 録販売者試験に合格したことを証する書類

59 二 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し  
60 若しくは住民票記載事項証明書（登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつ  
61 た者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない  
62 者については、住民票の写し（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の  
63 四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。）又は住民票記載事項証明書（同法第七条

64 第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載し  
65 たものに限る。))

66 三 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意  
67 思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神  
68 の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに  
69 関する医師の診断書

70 四 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局  
71 開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類

72 3 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行つた都  
73 道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

74 4 法第三十六条の八第三項において準用する法第五条第三号への厚生労働省令で定める者  
75 は、精神の機能の障害により登録販売者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及  
76 び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」

77 また、販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録す  
78 るとされている（規則第159条の8第1項）。

79 「一 登録番号及び登録年月日

80 二 本籍地都道府県名（日本国籍を有していない者については、その国籍）、氏名、生年  
81 月日及び性別

82 三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名

83 四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認す  
84 るために都道府県知事が必要と認める事項」

85 都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、登録  
86 証を交付しなければならないとされている（規則第159条の8第2項）。

87 なお、登録販売者は、規則第159条の8第1項の登録事項に変更を生じたときは、30日  
88 以内に、その旨を届けなければならないとされており、届出をするには、変更届に届出の原因たる  
89 事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならないとされている（規  
90 則第159条の9）。

91 また、登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30  
92 日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならないとされており（規則第159  
93 条の10第1項）、登録販売者が死亡し、又は失踪<sup>そつ</sup>の宣告を受けたときは、戸籍法（昭和22年  
94 法律第224号）による死亡又は失踪<sup>そつ</sup>の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の  
95 消除を申請しなければならないとされている（規則第159条の10第2項）。

96 さらに、登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく  
97 困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされてい

98 る（規則第159条の10第4項）

99 加えて、都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を  
100 削除しなければならないとされている（規則第159条の10第54項）。

- 101 「一 第一項又は第二項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の  
102 宣告を受けたことが確認されたとき  
103 二 法第五条第三号イから上△までのいずれかに該当するに至ったとき  
104 三 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき」

106 **II 医薬品の分類・取扱い等**

107 1) 医薬品の定義と範囲

108 医薬品の定義は、法第2条第1項において次のように規定されている。

- 109 「一 日本薬局方に収められている物  
110 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつ  
111 て、機械器具等（機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム（電子計算機  
112 に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。  
113 以下同じ。）及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。）でないもの（医薬部外品及  
114 び再生医療等製品を除く。）  
115 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、  
116 機械器具等でないもの（医薬部外品、及び化粧品及び再生医療等製品を除く。）」

117 第1号に規定されている日本薬局方（以下「日局」という。）とは、法第41条第1項の規定に  
118 基づいて、厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意  
119 見を聴いて、保健医療上重要な医薬品（有効性及び安全性に優れ、医療上の必要性が高く、国内  
120 外で広く使用されているもの）について、必要な規格・基準及び標準的試験法等を定めたもので  
121 ある。日局に記載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用  
122 医薬品の中に配合されているものも少なくない。

123 第2号に規定されている医薬品は、疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的とする  
124 ものであり、社会通念上いわゆる医薬品と認識される物の多くがこれに該当する。これには検査  
125 薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されない医薬品も含まれる。

126 第3号に規定されている医薬品は、人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされ  
127 ている物のうち、第1号及び第2号に規定されているもの以外のものが含まれる。これに該当す  
128 るものとしては、「やせ薬」を標榜した<sup>ぼう</sup>もの等、「無承認無許可医薬品」が含まれる。

129 医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない

130 とされており（法第13条第1項）、厚生労働大臣により「製造販売業<sup>elxxxix</sup>」の許可を受けた者で  
 131 なければ製造販売をしてはならないとされている（法第12条第1項）。また、その医薬品は、品  
 132 目ごとに、品質、有効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について厚生労働大臣  
 133 の承認<sup>exc</sup>を受けたものでなければなりませんとされている（法第14条又は法第19条の2）。必要  
 134 な承認を受けずに製造販売された医薬品の販売等は禁止されており（法第55条第2項）、これら  
 135 の規定に違反して販売等を行った者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下  
 136 の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第84条第2号、第3号、18号）こととされている。

137 必要な承認等を受けていない医薬品の広告の禁止に関する出題については、本章IV-1）（適正  
 138 な販売広告）を参照のこと。

139 また、製造販売元の製薬企業、製造業者のみならず、薬局及び医薬品の販売業においても、不  
 140 正表示医薬品（法第50から54条違反）は販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯  
 141 蔵し、若しくは陳列してはならず（第55条第1項）、模造に係る医薬品及び次に掲げる不良医薬  
 142 品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列し  
 143 てはならないとされている（法第55条の2及び~~第56条~~）。

144 (a) 日本薬局方に収められている医薬品であって、その性状、品質が日本薬局方で定める基準  
 145 に適合しないもの

146 (b) 法第41条第3項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品であって、その性  
 147 状、品質又は性能がその基準に適合しないもの

148 (cb) ~~法第14条、法第19条の2、法第23条の2の5若しくは又は~~法第23条の2の17の  
 149 承認を受けた医薬品又は第23条の2の23の認証を受けた体外診断用医薬品であって、そ  
 150 の成分若しくは分量又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容と異なるもの

151 (de) 法第14条第1項又は~~法第23条の2の5第1項又は第23条の2の23第1項~~の規定  
 152 により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であって、その成分若しくは分量 （成分  
 153 が不明のものにあつては、その本質又は製造方法） 又は性状又は品質若しくは性能がその基  
 154 準に適合しないもの

155 (ee) 法第42条第1項の規定によりその基準が定められた医薬品であって、その基準に適合し  
 156 ないもの

157 (fe) その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っている医薬品

158 (gf) 異物が混入し、又は付着している 医薬品もの

159 (hg) 病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがあ  
 160 る 医薬品もの

<sup>elxxxix</sup> 製造（他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない）又は輸入した医薬品を、薬局開設者、医薬品の販売業者等に対して販売等を行う。

<sup>exc</sup> 厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品については、当該基準への適合認証をもって承認を要さないものとされている。

161 (g) 着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用され  
162 ている医薬品

163 また同様に、次に該当する医薬品も、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、  
164 輸入し、若しくは陳列してはならないとされている（法第57条）。

165 (a) 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなっているためにその医  
166 薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある物とともに収められているてはならない

167 (b) 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなっているためにその医  
168 薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある容器若しくは被包（内包を含む。）に収めら  
169 れているてはならない

170 (c) 医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならない

171 これらの規定に触れる医薬品（不良医薬品）の製造、輸入、販売等を行った者については、「3  
172 年以下の懲役若しくは300三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第84条第  
173 18号から第20号及び第22号）こととされている。

174 また、これらの規定については、製造販売元の製薬企業、製造業者のみならず、薬局及び医薬  
175 品の販売業においても適用されるものであり、販売又は授与のため陳列がなされる際に適正な品  
176 質が保たれるよう十分留意される必要がある。

177

178 【一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品】

179 一般用医薬品は、法第4条第5項第4号において次のように規定されている。

180 「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、  
181 薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるこ  
182 とが目的とされているもの（要指導医薬品を除く。）」

183 また、要指導医薬品は、法第4条第5項第3号において次のように規定されている。

184 「次のイからニまでに掲げる医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされている  
185 ものを除く。）のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであ  
186 つて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用さ  
187 れることが目的とされるものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による  
188 情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大  
189 臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

190 イ その製造販売の承認の申請に際して第14条第118項に該当するとされた医薬品で  
191 あつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

192 ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、  
193 効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受  
194 けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

195 ハ 第44条第1項に規定する毒薬

196 ニ 第44条第2項に規定する劇薬

197 医薬品には、一般用医薬品、要指導医薬品のほか、~~医師若しくは歯科医師によって使用され、~~  
198 ~~又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給されるもの（医~~  
199 ~~療用医薬品）~~がある。医療用医薬品は、「医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者  
200 の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品」であり、一般用  
201 医薬品及び要指導医薬品は、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選  
202 択により使用されることが目的とされているもの」である。そのため、一般用医薬品又は要指導  
203 医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用法は用いられておらず、人体に直接使用されない検査  
204 薬においても、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの（例えば、血液を検体とするもの）  
205 は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていない<sup>exci</sup>。

206 用量に関しては、医療用医薬品は、医師又は歯科医師が診察をして患者の容態に合わせて処方  
207 量を決めて交付するものであり、一般用医薬品及び要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量  
208 に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。

209 効能効果の表現に関しては、医療用医薬品では通常、診断疾患名（例えば、胃炎、胃・十二指腸  
210 潰瘍等）で示されているのに対し、一般用医薬品及び要指導医薬品では、一般の生活者が判断で  
211 きる症状（例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等）で示されている。なお、一般用医薬品及  
212 び要指導医薬品は、通常、医療機関を受診するほどではない体調~~不良の不調~~や疾病の初期段階に  
213 おいて使用されるものであり、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患（例  
214 えば、がん、心臓病等）に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められ  
215 ていない。

216 薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることを目  
217 的とする医薬品であって、医療用医薬品において使用されていた有効成分が初めて配合されたも  
218 のや既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもののうち、その適正な使用のために  
219 薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものについ  
220 ては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣が要指導医薬品として指定する。

221 要指導医薬品は、次に掲げる期間を経過し、薬事・食品衛生審議会において、一般用医薬品と  
222 して取り扱うことが適切であると認められたものについては、一般用医薬品に分類される。

223 (a) 法第4条第5項第3号イに該当する要指導医薬品（規則第7条の2第1項）

224 ① 法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品：法第14条の4第1項第1号に規定す  
225 る調査期間（同条第3-2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間）

226 ② 法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対

<sup>exci</sup> 医師等の管理・指導の下で患者が自己注射や自己採血等を行う医薬品は、医療用医薬品として製造販売等されている。

227 し製造販売後の安全性に関する調査<sup>cxcii</sup>を実施する義務が課せられている医薬品：製造販売  
228 の承認の条件として付された調査期間

229 (b) 法第4条第5項第3号口に該当する要指導医薬品（規則第7条の2第2項）

230 当該要指導医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認め  
231 られた(a)の要指導医薬品に係る①又は②の期間の満了日までの期間

232 また、販売における規制の違いとして、店舗販売業は、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の  
233 医薬品の販売等は認められておらず（法第27条）、配置販売業は一般用医薬品（経年変化が起こ  
234 りにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準<sup>cxci</sup>に適合するものに限る。）以外の医薬品の販  
235 売は認められていない（法第31条）。したがって、医療用医薬品の販売は、薬局及び卸売販売業  
236 者に限られる。

237 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を、配置  
238 販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならないこととされな~~っ~~てい  
239 る。（規則第158条の2）

240

#### 241 【毒薬・劇薬】

242 毒薬とは、法第44条第1項の規定に基づき、毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食  
243 品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。また、劇薬とは、同条第2項の規定に基づ  
244 き、劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品  
245 をいう。

246 毒薬及び劇薬は、単に毒性、劇性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量（薬用量）  
247 と中毒のおそれがある摂取量（中毒量）が接近しており安全域が狭いため、その取扱いに注意を  
248 要するもの等が指定され、販売は元より、貯蔵及びその取り扱いは、他の医薬品と区別されてい  
249 る。なお、一般用医薬品で毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、  
250 毒薬又は劇薬で、一般用医薬品のものはなく、要指導医薬品で毒薬又は劇薬に該当するも  
251 のは一部に限られている。

252 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者（薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた事業者（以  
253 下「医薬品の販売業者」という。）を含む。）は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければ  
254 ならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないとされている  
255 （法第48条第1項及び第2項）。これに違反した者については、「1年以下の懲役若しくは1  
256 00万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第86条第1項第14-1-2号）こととさ  
257 れている。

cxcii 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令（平成16年厚生労働省令第135号）第2条第3項に規定する市販後調査を除く。

cxci 「経年変化が起こりにくいこと。」「剤形、用法、用量等からみて、その使用方法が簡易であること。」「容器又は被包が、壊れやすく、又は破れやすいものでないこと。」



258 毒薬については、それを収める直接の容器又は被包（以下「容器等」という。）に、黒地に白枠、  
259 白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない、劇薬につい  
260 ては、容器等に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されてい  
261 なければならないとされている（法第44条第1項及び第2項）。

262 この規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売等してはならないとされており（法第44条第3項）、  
263 これに違反した者については、「3年以下の懲役若しくは300三百万円以下の罰金に処し、又  
264 はこれを併科する」（法第84条第16号）こととされている（~~法第84条第16号~~）。このほか、  
265 法定表示事項に共通する規定に関する出題については、Ⅱ-2）（容器・外箱等への記載事項、添  
266 付文書等への記載事項）を参照して作成のこと。

267 また、毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは  
268 禁止されており（法第47条）、これに違反した者については、「2年以下の懲役若しくは20  
269 0三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第85条第2号）こととされている。こ  
270 の場合、「安全な取扱いに不安がある者」とは、「睡眠薬の乱用」「不当使用」等が懸念される購入  
271 希望者等をさす。

272 さらに、毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り  
273 受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署  
274 名又は記名押印された文書<sup>exciv</sup>の交付を受けなければならない（法第46条第1項及び規則第20  
275 5条）。また、毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業  
276 所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはなら  
277 ないとされている（法第45条）。これらの規定に違反して販売等した者については、「1年以  
278 下の懲役若しくは100百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第86条第1項第1  
279 2~~10~~号又は第13~~11~~号）こととされている。

280

#### 281 【生物由来製品】

282 生物由来製品は、法第2条第10項において次のように定義されている。

283 「人その他の生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として製造（小分けを含む。）  
284 をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要する  
285 ものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」

286 生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されており、生物由来  
287 の原材料（有効成分に限らない。）が用いられているものであっても、現在の科学的知見において、  
288 感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。

289 一般用医薬品又は要指導医薬品においても、生物由来の原材料が用いられているものがあるが、

<sup>exciv</sup> 文書に代えて、一定の条件を満たす電子的ファイルに記録したものによることもできる。

290 現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品又は要指導医薬品はない<sup>excv</sup>。

291

292 【一般用医薬品のリスク区分】

293 一般用医薬品は、その保健衛生上のリスクに応じて、次のように区分される（法第36条の7  
294 第1項）。

295 「一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそ  
296 れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定す  
297 るもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第11-8項に該当するとされた医  
298 薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないも  
299 の

300 二 第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそ  
301 れがある医薬品（第一類医薬品を除く。）であつて厚生労働大臣が指定するもの

302 三 第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品」

303 本規定に基づいて、第一類医薬品（その製造販売の承認の申請に際して第14条第11-8項に  
304 該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を  
305 経過しないものを除く。）及び第二類医薬品を指定する告示（「薬事法第36条の7第1項第1号  
306 及び第2号<sup>excvi</sup>の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品」（平成1  
307 9年3月30日厚生労働省告示第69号）<sup>excvii</sup>が公布され、その後随時改定されている。これら  
308 の厚生労働大臣の指定は、一般用医薬品に配合されている成分又はその使用目的等に着目してな  
309 されており、一般用医薬品の製造販売を行う製薬企業において、その一般用医薬品が、第一類医  
310 薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品のいずれのリスク区分に分類されるかを確認し、購入者等  
311 がそのリスクの程度について判別しやすいよう、各製品の外箱等に、当該医薬品が分類されたり  
312 スク区分ごとに定められた事項を記載することが義務づけられている（本章Ⅱ-2）（容器・外箱  
313 等への記載事項、添付文書等への記載事項）参照。）。

314 ① 第一類医薬品（法第36条の7第1項第1号）

315 法第36条の7第1項第1号中前段に規定される「その副作用等により日常生活に支障  
316 を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要  
317 なものとして厚生労働大臣が指定するもの」は、保健衛生上のリスクが特に高い成分が配  
318 合された一般用医薬品である。

319 また、同号の後段に規定される「その製造販売の承認の申請に際して第14条11第8-

<sup>excv</sup> 医薬部外品、化粧品においても同様である。

<sup>excvi</sup> 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（平成25年法律第103号）により、法第36条の3は法第36条の7に改正された。（平成26年6月12日施行。）

<sup>excvii</sup> 現在の名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品」（平成26年厚生労働省告示第439号）

320 項に該当するとされた医薬品」とは、既存の要指導医薬品及び一般用医薬品と有効成分、  
 321 分量、用法用量、効能効果等が明らかに異なるもののうち、一般用医薬品とされた医薬品  
 322 <sup>excviii</sup>であり、一般用医薬品としての使用経験が少なく、より慎重に取り扱われる必要があ  
 323 り、その承認を受けてから規則第159条の2に定める期間<sup>excix</sup>を経過しないものである。

324 ② 第二類医薬品（法第36条の7第1項第2号）

325 その成分や使用目的等から、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害  
 326 が生ずるおそれがある」保健衛生上のリスクが比較的高い一般用医薬品である。

327 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を  
 328 「指定第二類医薬品」としている。

329 ③ 第三類医薬品（法第36条の7第1項第3号）

330 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品は、保健衛生上のリスクが比較的低  
 331 い一般用医薬品である（ただし、日常生活に支障を来す程度ではないが、副作用等により  
 332 身体の変調・不調が起こるおそれはある）。

333 厚生労働大臣は、第一類医薬品又は第二類医薬品の指定に資するよう医薬品に関する情報の収  
 334 集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならないこととされている（法  
 335 第36条の7第2項）。これにより、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品への分類につ  
 336 いては、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、適宜見直しが図られている。  
 337 例えば、新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類される  
 338 が、その間の副作用の発生や適正使用の状況等に関する情報を収集し、それらを評価した結果に  
 339 基づいて、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品に分類される。また、第三類医薬品に  
 340 分類されている医薬品について、日常生活に支障を来す程度の副作用を生じるおそれがあること  
 341 が明らかとなった場合には、第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることもある。

342

343 2) 容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項

344 【容器・外箱等への記載事項】

345 医薬品は、法第50条に基づきその直接の容器又は被包に必要な事項が記載されていなければ  
 346 ならないほか、医薬品のうち毒薬又は劇薬については、法第44条第1項又は第2項の規定に基  
 347 づく必要な表示が義務づけられている。

348 なお、医薬品の容器等が小売りのために包装されている場合において、上記の各規定に基づく  
 349 容器等への記載が、外部の容器又は被包（以下「外箱等」という。）を透かして容易に見ることが

<sup>excviii</sup> 医療用医薬品において使用されていた有効成分を一般用医薬品において初めて配合したもの（いわゆるスイッチOTC医薬品）や、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの（いわゆるダイレクトOTC）等。

<sup>excix</sup> いわゆるダイレクトOTC医薬品については、法第14条の4第1項第1号の規定に基づく再審査期間（同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間）に1年を加えた期間。いわゆるスイッチOTC医薬品については、法第79条第1項の規定に基づく承認条件として付された製造販売後の安全性調査期間に1年を加えた期間。ただし、承認にあたって要指導医薬品として指定されたものについては、要指導医薬品から第1類医薬品に移行してから原則1年間。

350 できないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならないとされている（法  
351 第51条）。

352 通常、法第44条第1項及び第2項、第50条並びに第51条の規定に基づく記載を総称して  
353 法定表示といい、各記載事項を法定表示事項という。法定表示事項に関する出題については、一  
354 般用医薬品及び要指導医薬品に関連する次の事項を中心に問題を作成すること。

- 355 (a) 製造販売業者等<sup>cc</sup>の氏名又は名称及び住所
- 356 (b) 名称（日局に記載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医  
357 薬品で一般的名称があるもの<sup>cci</sup>ではその一般的名称）
- 358 (c) 製造番号又は製造記号
- 359 (d) 重量、容量又は個数等の内容量
- 360 (e) 日局に記載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等
- 361 (f) 「要指導医薬品」の文字である旨を示す識別表示
- 362 (g) 一般用医薬品のリスク区分を示す字句識別表示
- 363 (h) 日局に記載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量
- 364 (i) 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労  
365 働大臣が指定する医薬品（殺虫剤等）における「注意－人体に使用しないこと」の文字
- 366 (j) 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の  
367 指定する医薬品における使用の期限
- 368 (k) 配置販売品目以外の一般用医薬品にあつては、「店舗専用」の文字
- 369 (l) 指定第二类医薬品にあつては、枠の中に「2」の数字

370

371 【添付文書等への記載事項】

372 要指導医薬品、一般用医薬品は、これにその添付する文書又は、容器等若しくは又は外箱等に、  
373 当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、用法用量その他使用及び取  
374 扱い上必要な注意等が記載されていなければならないこととされている（法第52条第2項）。添  
375 付文書等の記載事項に関する出題については、第5章I－1）（添付文書の読み方）を参照して問  
376 題作成のこと。

377

378 【記載禁止事項】

379 医薬品について表示や記載が義務づけられている事項がある一方、医薬品に添付する文書<sup>ccii</sup>、  
380 その容器等又は外箱等に記載されてはならない事項が次のように定められている（法第54

<sup>cc</sup> 法第19条の2の規定に基づく承認を受けた医薬品については外国製造医薬品等特例承認取得者等の氏名等も記載される。

<sup>cci</sup> 製剤化されていない単味の生薬などが該当する。

<sup>ccii</sup> 製造販売元の製薬企業等において作成され、出荷時に医薬品に添付されている文書だけでなく、薬局開設者又は医薬品の販売業者が販売に際して添付させる文書も含まれる。

381 条)。

382 「一 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項

383 二 第14条、第19条の2、第23条の2の5又は第23条の2の17の承認を受けてい  
384 ない効能、効果又は性能（第14条第1項、第23条の2の5第1項又は第23条の2の  
385 23第1項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあっては、そ  
386 の基準において定められた効能、効果又は性能を除く。）

387 三 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間」

388 法第50条の規定に基づく法定表示事項及び法第52条第2項の規定に基づく添付文書等への  
389 記載については、他の文字、記事、図画、又は図案に比較して見やすい場所にされていなければ  
390 ならず、かつ、購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならないこ  
391 ととされており（法第53条）、特に明瞭に記載され（規則第217条）、かつ、**「邦文でされてい  
392 なければならない」**（規則第218条）とされている。

393 法定表示が適切になされていない、法第52条第2項の規定に基づく添付文書等への記載が適  
394 切になされていない、又は法第54条に掲げられた禁止事項に該当する内容が記載されている医  
395 薬品（不正表示医薬品）は、販売等してはならないとされており（法第55条第1項）、本規定に  
396 違反した者については、「**2**年以下の懲役若しくは**200**万円以下の罰金に処し、又はこれ  
397 を併科する」（法第85条第3号）こととされている。

398 本規定は、薬局及び医薬品の販売業においても適用されるものであり、その販売等する医薬品  
399 が不正表示医薬品に該当することのないよう、十分留意される必要がある。

400

401 3) 医薬部外品、化粧品、保健機能食品等

402 【医薬部外品】

403 医薬部外品は、法第2条第2項において次のように定義されている。

404 「一 次のイからハマまでに掲げる目的のために使用される物（これらの使用目的のほかに、併  
405 せて前項<sup>cciii</sup>第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。）であつて機  
406 械器具等でないもの

407 イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

408 ロ あせも、ただれ等の防止

409 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

410 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の  
411 防除の目的のために使用される物（この使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3  
412 号に規定する目的のために使用される物を除く。）であつて機械器具等でないもの

<sup>cciii</sup> 法第2条第1項。2号及び3号において同じ。

413 三 前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物（前二号に掲げる物を除  
414 く。）のうち、厚生労働大臣が指定するもの」

415 本項中「前項第2号又は第3号に規定する目的」とあるのは、人の疾病の診断、治療若しくは  
416 予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とすること  
417 を指し、医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内（本章別表4-1）であつ  
418 て、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能  
419 効果を表示・<sup>ぼう</sup>標榜することが認められている<sup>cciv</sup>。

420 また、化粧品としての使用目的<sup>ccv</sup>を有する製品について、医薬品的な効能効果を表示・<sup>ぼう</sup>標榜し  
421 ようとする場合には、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であつて、人体に対する作用  
422 が緩和であるものに限り、医薬部外品の枠内で、薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等  
423 として承認されている。

424 医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり（法第12条第1項）、厚  
425 生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある（法第14条）。  
426 一方、販売等については、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等  
427 することができる。

428 また、医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示その他定めら  
429 れた事項の表示が義務付けられている。（法第59条）

430 医薬部外品のうち、(1)衛生害虫類（ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物）の防  
431 除のため使用される製品群（「防除用医薬部外品」の表示のある製品群）、(2)かつては医薬品であ  
432 ったが医薬部外品へ移行された製品群（「指定医薬部外品」の表示のある製品群）については、用  
433 法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の医薬部外品と比べてより重要であるた  
434 め、一般の生活者が購入時に容易に判別することができ、また、実際に製品を使用する際に必要  
435 な注意が促されるよう、各製品の容器や包装等に識別表示がなされている。（規則第219条の2）

436 医薬部外品にあつても、医薬品と同様に、不良医薬部外品及び不正表示医薬部外品の販売は禁  
437 止されている。（法第60条に基づく法第56条及び57条の準用）

438

### 439 【化粧品】

440 化粧品は、法第2条第3項において次のように定義されている。

441 「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに  
442 保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされ

<sup>cciv</sup> 医薬品と同様、販売元の企業等においては、製品を上市するにあつてあらかじめ医薬部外品として品質、有効性及び安全性が備わっていることにつき、法第14条第1項又は第19条の2の規定に基づく承認を取得し（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。）、また、製造販売業の許可を受ける必要がある。必要な承認を受けていない製品の販売等は禁止されており（法第55条第2項）、本規定に違反して販売等を行った者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第84条第18号）こととなっている。

<sup>ccv</sup> 法第2条第3項に規定する使用目的。

443 ている物で、人体に対する作用が緩和なもの」

444 人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。化粧品は、あくまで「人の身体を清潔  
445 にし、美化し、魅力を増し、容貌<sup>ぼう</sup>を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内（本  
446 章別表4-2）においてのみ<sup>ぼう</sup>効能効果を表示・標榜することが認められるものであり、医薬品的  
447 な<sup>ぼう</sup>効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。一方、医薬品について化粧品的な<sup>ぼう</sup>効  
448 能効果を表示・標榜することは、過度の消費や乱用等の不適正な使用を助長するおそれがあり、  
449 承認された<sup>ぼう</sup>効能効果に含まれる場合を除き、適当でないとされている。

451 なお、医薬部外品に、化粧品的<sup>ぼう</sup>効能効果を標榜することは、前項で記したように薬用化粧品、  
452 薬用石けん<sup>けん</sup>、薬用はみがき等が認められている。

453 化粧品の成分本質（原材料）についても、原則として医薬品の成分を配合してはならないこと  
454 とされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用  
455 が期待できない量以下に制限されている。

456 化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ご  
457 との届出を行う必要がある（法第12条第1項、第14条の9）。ただし、厚生労働大臣が指定す  
458 る成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要がある（法第14条第1項）。

459 また、化粧品を販売等する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店に  
460 おいて販売等することができる。ただし、医薬品的な<sup>ぼう</sup>効能効果の表示・標榜がなされた場合には、  
461 法第66条第1項により禁止される虚偽又は誇大な広告に該当するほか、その<sup>ぼう</sup>標榜内容等によっ  
462 ては医薬品又は医薬部外品とみなされ、無承認無許可医薬品又は無承認無許可医薬部外品として  
463 法第55条第2項に基づく取締りの対象となる。

464 化粧品にあっても、医薬品と同様に、不良化粧品及び不正表示化粧品の販売は禁止されている。  
465 （法第62条に基づく法第56条及び57条の準用）

466

#### 467 【保健機能食品等の食品】

468 食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう（食品安全基  
469 本法（平成15年法律第48号）第2条、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第4条第1  
470 項）。

471 医薬品には、その品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制が行われているが、食品  
472 には、専ら安全性の確保のために必要な規制その他の措置が図られている。

473 外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、<sup>ぼう</sup>効能効果の<sup>ぼう</sup>標榜内容等  
474 に照らして医薬品とみなされる場合には、法第14条又は第19条の2の規定に基づく承認を受  
475 けずに製造販売され、又は法第13条第1項の規定に基づく製造業の許可等を受けずに製造され  
476 た医薬品（無承認無許可医薬品）として、法第55条第2項に基づく取締りの対象となる。

477 その本質、形状、表示された効能効果、用法用量等から判断して医薬品である物が、外形上、  
 478 食品として販売等されている場合には、(1) 一般の生活者に正しい医療を受ける機会を失わせ、  
 479 疾病を悪化させるなど、保健衛生上の危害を生じさせる、(2) 不良品及び偽医薬品が製造販売さ  
 480 れる、(3) 一般の生活者における医薬品及び食品に対する概念を崩壊させ、医薬品の正しい使用  
 481 が損なわれ、ひいては医薬品に対する不信感を生じさせる、等の弊害をもたらすおそれがある。

482 しかし、経口的に摂取される物が法第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当す  
 483 るか否かについては、一般の生活者から見て必ずしも明確でない場合があるため、無承認無許可  
 484 医薬品の指導取締りの一環として「医薬品の範囲に関する基準」（昭和46年6月1日付け薬発第  
 485 476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（最終改正：[令和2年](#)  
 486 [3月31日付け薬生発0331第33号平成28年10月12日付け薬生発1012第1号](#)厚生  
 487 労働省医薬・生活衛生局長通知）の別紙。以下同じ。）が示されている。

- 488 この通知で示す「医薬品の範囲に関する基準」では、医薬品に該当する要素として、  
 489 (a) 成分本質（原材料）が、専ら医薬品として使用される成分本質を含むこと<sup>ccvi</sup>（食品添加物  
 490 と認められる場合を除く。）  
 491 (b) 医薬品的な効能効果が標榜<sup>ほう</sup>又は暗示されていること（製品表示や添付文書によるほか、チ  
 492 ラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物等による場合も含む。）  
 493 (c) アンプル剤や舌下錠、口腔用スプレー剤等、医薬品的な形状<sup>くわう</sup><sup>ccvii</sup>であること  
 494 (d) 服用時期、服用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載があること（調理のために使  
 495 用方法、使用量等を定めている場合を除く。）

496 が示されており、食品の販売を行う者（薬局又は医薬品の販売業において食品を販売する場合を  
 497 含む。）にあつては、これらに照らして医薬品に該当する物とみなされることのないよう留意する  
 498 必要がある。

499 食品のうち、健康増進法（平成14年法律第103号）第43-2-6条第1項の規定に基づく許  
 500 可又は同法第63-2-9条第1項の規定に基づく承認を受けた内容を表示する特別用途食品（特  
 501 定保健用食品を含む。[以下同じ](#)。）については、原則として、一般の生活者が医薬品としての目的  
 502 を有するものであるとの誤った認識を生じるおそれはないものとされている。ただし、特別用途  
 503 食品（[特定保健用食品を含む](#)。）以外の食品において、特定の保健の用途に適する旨の効果が表示・  
 504 標榜<sup>ほう</sup>されている場合には、医薬品の効能効果を暗示させるものとみなされる。

#### 505 (af) 保健機能食品

506 前述の(b)① 特定保健用食品、②(c) 栄養機能食品、③(d) 機能性表示食品を総称して「保  
 507 健機能食品」という。これらはいくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取さ

ccvi 製品から実際に検出されなくても、含有又は配合されている旨が標榜<sup>ほう</sup>・表示されている場合には、当該成分本質を含むものとなして本基準が適用される。

ccvii 錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤等の形状については、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。



508 れるものである。

509 なお、①(a) ~ ③(e)及び(b) 特別用途食品（特定保健用食品を除く。）のいずれであっ  
510 ても、食品として販売に供するものについて、健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な  
511 表示をすることは禁止されている（健康増進法第65-3-1条）。

512 ① 特定保健用食品

513 健康増進法第43-2-6条第1項の規定に基づく許可又は同法第63-2-9条第1項の規  
514 定に基づく承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その  
515 摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示（本章別表4-3）をする食品である。  
516 特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性及安  
517 全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。

518 現行の特定保健用食品の許可の際に必要なとされる有効性の科学的根拠のレベルに達し  
519 ないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の  
520 表示をすることを条件として許可されている。この条件で許可された特定保健用食品を  
521 「条件付き特定保健用食品」と区分している。

522 特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品にも、それぞれ消費者庁の許可等のマーク  
523 が付されている。

524 ② 栄養機能食品

525 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、栄養表示し  
526 ようとする場合には、食品表示基準第2条第1項第11号の規定に基づき、その栄養成分  
527 の機能の表示を行わなければならない（本章別表4-4）。

528 栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、  
529 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。また、  
530 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。

531 ③ 機能性表示食品

532 食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）  
533 に規定されている食品である。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表  
534 示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた  
535 ものである。

536 特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役立つ）という食品の機能性を  
537 表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受け  
538 たものではない。

539 (ba) 特別用途食品（特定保健用食品を除く。）

540 乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当  
541 な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法第43-2-

6条第1項の規定に基づく許可又は同法第63-29条第1項の規定に基づく承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。

~~(b) 特定保健用食品~~

~~健康増進法第26条第1項の規定に基づく許可又は同法第29条第1項の規定に基づく承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示（本章別表4-3）をする食品である。特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。~~

現行の特定保健用食品の許可の際に必要なとされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている。この条件で許可された特定保健用食品を「条件付き特定保健用食品」と区分している。

特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品にも、それぞれ消費者庁の許可等のマークが付されている。



(ac) ① 特定保健用食品の標識



(ac) ① 条件付き特定保健用食品の標識



(b) 特別用途食品の標識

以上に述べた(a) 保健機能食品、(a)① 特定保健用食品、(a)② 栄養機能食品、(a)③機能性表示食品、(b) 特別用途食品（特定保健用食品を除く。）、「(a) 特別用途食品」と「(ab) ① 特定保健用食品」と「(b) 特別用途食品」との規制上の関係を図示すると次表のとおりとなる。

広義の特別用途食品 ⇒<前述 (ba)>	狭義の特別用途食品 ((b))		・病者用食品 ・妊産婦、授乳婦用 ・乳児用 ・えん下困難者用
	保健機	特定保健用食品	

	能食品	<u>（(a)①）*</u>	条件付き特定保健用食品
	<u>（(a)）</u>	<u>栄養機能食品（(a)②）</u>	
		<u>機能性表示食品（(a)③）</u>	

\*（特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている。）

570 また、食品のうち、食品表示法（平成25年法律第70号）第4条第1項の規定に基づき  
 571 制定された食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）第2条第1項第11号の規定に基づき  
 572 栄養成分の機能表示等がなされたもの（~~次項（ade）~~②栄養機能食品）における当該表示等  
 573 等に関しては、医薬品の範囲に関する基準における医薬品的な効能効果に該当しないもの  
 574 とされている<sup>ccviii</sup>。

575 ~~(c) 栄養機能食品~~

576 ~~1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、栄養表示しよ  
 577 うとする場合には、食品表示基準第2条第1項第11号の規定に基づき、その栄養成分の機  
 578 能の表示を行わなければならない（本章別表4-4）。~~

579 ~~栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、  
 580 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。また、消  
 581 費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。~~

582 ~~(d) 機能性表示食品~~

583 ~~食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）  
 584 に規定されている食品である。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示  
 585 し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの  
 586 である。~~

587 ~~特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役立つ）という食品の機能性を表  
 588 示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたも  
 589 のではない。~~

590 (ce) その他「いわゆる健康食品」

591 健康食品という単語よばれるものは、法令で定義された用語ものではないが、一般に用  
 592 いられている単語ものである。栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれる  
 593 こともある。法や食品衛生法等における取扱いは、保健機能食品以外の一般食品と変わると  
 594 ころはない。

595 いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・<sup>ぼう</sup>標榜されてい

<sup>ccviii</sup> ただし、規格基準が定められている栄養成分以外の他の成分について、その機能の表示又は特定の保健の用途の表示がな  
 されている場合には、医薬品の範囲に関する基準の(2)医薬品的な効能効果に該当するものとみなされることがある。

596 る場合<sup>ccix</sup>があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされる。また、  
597 製剤中に医薬品成分が検出される場合もあり、いずれも無承認無許可医薬品として、法に基  
598 づく取締りの対象となる。

599 これまでにそうした無承認無許可医薬品の摂取によって重篤な健康被害が発生した事例も  
600 知られており、厚生労働省、消費者庁や都道府県等では、因果関係が完全に解明されていな  
601 くとも、広く一般に対して注意を喚起して健康被害の拡大防止を図るため、製品名等を公表  
602 している。

603 薬局、店舗販売業又は配置販売業に従事する専門家においては、行政庁が公表する無承認  
604 無許可医薬品情報、健康被害情報に日頃から留意しておくことも重要である。

605 ~~(f) 保健機能食品~~

606 ~~前述の(b) 特定保健用食品、(c) 栄養機能食品、(d) 機能性表示食品を総称して「保健機  
607 能食品」という。これらはいくまでか食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取される  
608 ものである。~~

609 ~~なお、(a)～(e)のいずれであっても、食品として販売に供するものについて、健康の保  
610 持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは禁止されている（健康増進法第31条）。~~

611

### 612 III 医薬品の販売業の許可

#### 613 1) 許可の種類と許可行為の範囲

614 法第24条第1項において、「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、  
615 業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列（配  
616 置することを含む。）してはならない<sup>ccx</sup>」と規定されている。本規定に違反した者については、  
617 「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第8  
618 4条第9号）こととされている。

619 医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列（以下「販  
620 売等」という。）を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。医薬品  
621 の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可<sup>ccxi</sup>の3  
622 種類に分けられており（法第25条）、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等すること  
623 ができるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。なお、薬局における医

<sup>ccix</sup> 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨の表現（例：肥満改善効果等）や、身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨の表現（例：老廃物排出効果等）、身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的・慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨（例：二日酔い改善効果等）などの表現が該当する。

<sup>ccx</sup> ただし、「医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときはこの限りでない」（法第24条第1項ただし書き）と規定されており、製薬企業がその製造等した医薬品を、一般の生活者以外の、薬局開設者や販売業者又は他の製薬企業へ販売等を行う場合にあっては、あらかじめ販売業の許可を受ける必要はない。

<sup>ccxi</sup> 卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業又は医療機関等に対して販売等する業態であり、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められていない。（法第25条第3号、規則第138条）

624 薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必  
625 要としない。

626 また、これらの許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、そ  
627 の効力を失う。（法第24条第2項）

628 また、「薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業  
629 者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目  
630 的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない」（法第37条第1項）と規定されている。本  
631 規定に違反した者については、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又  
632 はこれを併科する」（法第85条第1号）こととされている。これは、医薬品は、人の生命や健康  
633 に直接又は間接的に影響を与える生命関連製品であるため、安全性の見地から、露天販売や現金  
634 行商等のような、事後において医薬品の購入者等の安全性を確保すること、また、販売側の責任  
635 や所在を追及することが困難となる形態での販売又は授与を禁止する趣旨（いわゆる「売り逃げ」  
636 の防止）によるものである。

637 また、薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開  
638 封して分割販売（いわゆる「量り売り」、「零売」と呼ばれることもある。）することができる。た  
639 だし、分割販売する場合には、法第50条の規定に基づく容器等への記載事項、法第52条第2  
640 項の規定に基づく添付文書等への記載事項について、分割販売する薬局開設者又は医薬品の販売  
641 業者の責任において、それぞれ表示又は記載されなければならない。分割販売される医薬品の記  
642 載事項には、「分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う薬局、店舗又は営業所の名  
643 称及び所在地」も含まれている（法第50条第15号、規則第210条第7号）。

644 ただし、医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当  
645 するため、認められない。

#### 646 (a) 薬局

647 薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必  
648 要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所（その開設者が併せ行う医薬品  
649 の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。）」（法第2条第12項）と定義  
650 されている。薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認めら  
651 れている。また、調剤を実施する薬局は、医療提供施設としても位置づけられている（医療法  
652 （昭和23年法律第205号）第1条の2第2項）。

653 薬局は、「その所在地の都道府県知事（その所在地が保健所を設置する市<sup>ccxii</sup>又は特別区の区  
654 域にある場合においては、市長又は区長。）の許可を受けなければ、開設してはならない」（法  
655 第4条第1項）と規定されており、都道府県知事は、調剤や医薬品の販売等を行うために必要

ccxii 地域保健法（昭和22年法律第101号）第5条第1項の政令で定める市

656 な構造設備（薬局等構造設備規則（昭和36年厚生省令第2号。以下「構造設備規則」という。）  
657 第1条）を備えていないとき、並びに医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制（薬局  
658 並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行なう体制を定める省令（昭和39年厚生省令第3  
659 号。以下「体制省令」という。）第1条）が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等  
660 に違反し一定期間を経過していないときなどには、許可を与えないことができる（法第5条）。

661 薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。ま  
662 た、一般用医薬品のうち、第二类医薬品又は第三類医薬品に分類（Ⅱ-1）の【一般用医薬品  
663 のリスク区分】の項参照）されたものの販売等に関しては、薬剤師のほかに、登録販売者が購  
664 入者等への情報提供や相談対応を行うこともできる。

665 なお、医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについて  
666 は、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない（法第6条、規則第10  
667 条）こととされており、本規定に違反した者については、「三十万円以下の罰金に処する」（法  
668 第88条第1号）こととされている。

669 薬局においては、調剤された薬剤や医薬品が保健衛生上遺漏なく販売等されるよう、その業  
670 務を適正に運営するための仕組みが設けられている。まず、薬局の開設の許可を受けた事業者  
671 （以下「薬局開設者」という。）は、自らが薬剤師であるときは、その薬局を実地に管理しなけ  
672 ればならず、自ら管理しない場合には、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうち  
673 から管理者を指定して実地に管理させなければならないこととされている（法第7条第1項）。  
674 また、薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のう  
675 ちから管理者を指定して実地に管理させなければならないこととされている（法第7条第2項）。  
676 この管理者は、薬局に関する必要な業務を遂行し、必要な事項を遵守するために必要な能力及  
677 び経験を有する者でなければならないこととされている（法第7条第3項）。

678 なお、薬局の管理者は、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その  
679 薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならな  
680 いこととされている。（法第7条第4項）

681 さらに、管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その薬局に勤務するその他  
682 の従業者を監督するなど、薬局の業務につき、必要な注意をしなければならず、薬局開設者  
683 に対して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている（法第8条）。一方、薬  
684 局開設者は、その管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があ  
685 るときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容（措置を講じない場合にあつては、その旨  
686 及びその理由）を記録し、これを適切に保存しなければならないこととされている（法第9条第  
687 2項）。

688 加えて、薬局開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務を適正に遂行す  
689 ることにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、必要な措置を講じるととも

690 に、その措置の内容を記録し、適切に保存しなければならないこととされている（法第9条の2）。

691 以上のほか、薬局開設者には、法第36条の3及び第36条の4の規定に基づき、「薬局医薬  
692 品」の販売等に関する規制（規則第158条の7から規則第158条の9まで）、並びに法第9  
693 条の3-2及び第9条の4-3の規定に基づき、「調剤された薬剤」の販売等に関する規制（規則第  
694 11条の8から第11条の11まで及び第15条の11から第15条の13まで）が課せられ  
695 ている。

#### 696 【地域連携薬局】

697 薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の  
698 医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必  
699 要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局は、  
700 その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができることとされている  
701 （法第6条の2第1項）。

#### 702 【専門医療機関連携薬局】

703 薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の  
704 医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実  
705 施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定  
706 を受けて専門医療機関連携薬局と称することができることとされている。（法第6条の3第1項）。

#### 707 【健康サポート薬局】

708 患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極  
709 的に支援する機能を有する薬局を健康サポート薬局という（規則第1条第2項第6号）。

710 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、厚生労働大臣が定  
711 める基準に適合するものとしなければならない（規則第15条の11）。

#### 712 【薬剤師不在時間等】

713 開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその  
714 業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を薬剤  
715 師不在時間という（規則第1条第2項第2-3号）。

716 例えば、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加のため、一時  
717 的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間が該当するものであり、学校薬剤師の業務やあら  
718 じめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められず、従  
719 来どおり、当該薬局における調剤応需体制を確保する必要がある。

720 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不  
721 在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る揭示事項を当該薬局内の見や  
722 すい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に揭示しなければならない（規則第14条の3第3  
723 項、規則第15条の16）。

724 また、体制省令において、「薬剤師不在時間内（規則第1条第2項第2号に規定する薬剤師不在  
725 時間をいう。以下同じ。）は、法第7条第1項又は第2項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、  
726 薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること」  
727 等、薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制の基準が規定されている（体制省令第1条  
728 第1項第1号、第7号、第8号、第9号、同条第2項第6号）。

729 なお、薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品又は第  
730 三類医薬品であり、薬局開設者は、調剤室の閉鎖に加え、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬  
731 品陳列区画を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類  
732 医薬品を陳列する場合は、この限りでない。（規則第14条の3第2項、構造設備規則第1条第  
733 1項第11号、第12号）

#### 734 (b) 店舗販売業

735 店舗販売業の許可は、要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与す  
736 る業務について（法第25条第1号）、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事（その店  
737 舗の所在地が保健所を設置する市は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下  
738 (b)において同じ。）が与えることとされている（法第26条第1項）。

739 都道府県知事は、許可を受けようとする店舗が必要な構造設備（構造設備規則第2条）を備  
740 えていないとき、適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な体制（体制省令第2条）  
741 が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等に違反し一定期間を経過していないと  
742 きなどには、許可を与えないことができる（法第26条第4項）。

743 薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用  
744 医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない（法第27条）。本規定に違反した者について  
745 は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法  
746 第84条第10号）こととされている。

747 店舗販売業の許可を受けた事業者（以下「店舗販売業者」という。）は、要指導医薬品につい  
748 ては、薬剤師に販売又は授与させなければならないこととされている（法第36条の5第1項）。  
749 また、一般用医薬品のうち、第一類医薬品については、薬剤師により販売又は授与させなけれ  
750 ばならないこととされており、第二類医薬品又は第三類医薬品については、薬剤師又は登録販  
751 売者に販売又は授与させなければならないこととされている（法第36条の9）。このため、要  
752 指導医薬品及び第一類医薬品は、その店舗において薬剤師がいない場合には、販売又は授与を  
753 行うことができない。本規定に違反した者については、都道府県知事は、その許可を取り消し、  
754 又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる（法第75条第1  
755 項）。

756 店舗販売業においても、薬局と同様、医薬品が保健衛生上遺漏なく販売等されるよう、その  
757 業務を適正に運営するための仕組みが設けられている。まず、店舗販売業者は、「その店舗を、



758 自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない」（法第28条第1  
759 項）こととされており、その店舗を実地に管理する者（以下「店舗管理者」という。）は、「薬剤師又は登録販売者でなければならない」~~（同条第2項）~~こととされ（法第28条第2項）、店舗  
760 管理者は、店舗に関する必要な業務を遂行し、必要な事項を遵守するために必要な能力及び経  
761 験を有する者でなければならないこととされている（法第28条第3項）。

763 この店舗管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その店舗において医薬品の販売又は授与  
764 に従事しているものでなければならない。（規則第140条第1項）

	店舗の種類	店舗管理者
一	要指導医薬品 <sup>ccxiii</sup> 又は第一類医薬品を販売し、授与する店舗	薬剤師
二	第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、授与する店舗	薬剤師又は登録販売者

765 この登録販売者は、薬局、店舗販売業又は配置販売業において、過去5年間のうち、

- 766 ① 一般従事者（その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外  
767 の者をいう。）として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間  
768 ② 登録販売者として業務（店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。）に従事した期間  
769 が通算して2年以上（従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が2  
770 4月以上、又は、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間に於いて合計1,92  
771 0時間以上）あることが必要である。

772 ただし、これらの従事期間が通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業  
773 務に従事した経験がある場合も店舗管理者となれることとされている。

774 第一類医薬品を販売し、授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場  
775 合には、要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗  
776 管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は  
777 薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として  
778 3年以上（従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が36月以上、又  
779 は、従事期間が通算して3年以上あり、かつ、過去5年間に於いて合計2,880時間以上）  
780 業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する  
781 ものを店舗管理者にすることができる。（規則第140条第2項）

782 この場合には、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない。（規則第141条）

783 なお、店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店  
784 舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない  
785 こととされている。（法第28条第4項）

ccxiii 経過措置として、平成29年6月12日から当分の間は、要指導医薬品を販売等する薬局又は薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売等する店舗販売業において登録販売者として業務に従事した期間と要指導医薬品を販売等する店舗の管理者であった期間の合計が3年以上の者を店舗管理者とすることができる。この場合には、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない。

786 さらに、店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他  
787 の従事者を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならず、また、店  
788 舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている（法第2  
789 9条）。一方、店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために  
790 措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容（措置を講じない場  
791 合にあつては、その旨及びその理由）を記録し、これを適切に保存しなければならぬこととさ  
792 れている（法第29条の2第2項）。

793 加えて、店舗販売業者は、店舗の管理に関する業務その他の店舗販売業者の業務を適正に遂  
794 行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、必要な措置を講じると  
795 ともに、その措置の内容を記録し、適切に保存しなければならないこととされている（法第29  
796 条の3）。なお、店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、  
797 その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはな  
798 らない。（法第28条第3項）

#### 799 (c) 配置販売業

800 配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務について（法第2  
801 5条第2号）、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与  
802 えることとされている（法第30条第1項）。

803 都道府県知事は、許可を受けようとする区域において適切に医薬品の配置販売するために必  
804 要な基準（「体制省令第3条」）が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等に違反  
805 し一定期間を経過していないときなどには、許可を与えないことができる（法第30条第2項）。

806 また、配置販売業は、購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき<sup>ccxiv</sup>、購入者がこれを  
807 使用した後でなければ代金請求権を生じない（「先用後利」という）といった販売形態であるた  
808 め、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準（配置販売品目基準（平成21  
809 年厚生労働省告示第26号））に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならないこととされ  
810 ている（法第31条）。本規定に違反した者については、「3年以下の懲役若しくは300  
811 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第84条第11号）こととされている。

812 第一類医薬品の配置販売については、配置販売業の許可を受けた事業者（以下「配置販売業  
813 者」という。）は、薬剤師により販売又は授与させなければならないこととされており、第二類  
814 医薬品又は第三類医薬品の配置販売については、薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させな  
815 なければならないこととされている（法第36条の9）。このため、薬剤師が配置販売に従事して  
816 いない場合には、第一類医薬品の販売又は授与を行うことができない。本規定に違反した者に  
817 ついては、都道府県知事は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは

<sup>ccxiv</sup> 通常、常備薬として用いられる製品をひと揃い収めた「配置箱」を預ける。これは法上、陳列に該当する。

818 一部の停止を命ずることができる（法第75条第1項）。

819 配置販売業においても、薬局や店舗販売業と同様、医薬品が保健衛生上遺漏なく販売等され  
820 るよう、その業務を適正に運営するための仕組みが設けられている。まず、配置販売業者は、  
821 「その業務に係る都道府県の区域を、自ら管理し、又は当該都道府県の区域において配置販売  
822 に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない」（法第31条の2第1  
823 項）こととされており、その区域を管理する者（以下「区域管理者」という。）については、第  
824 一類医薬品を販売し、授与する区域においては薬剤師、第二类医薬品又は第三類医薬品を販売  
825 し、授与する区域においては薬剤師又は登録販売者でなければならないこととされ（法第31  
826 条の2第2項）、区域管理者は、区域に関する必要な業務を遂行し、必要な事項を遵守するた  
827 めに必要な能力及び経験を有する者でなければならないこととされている（法第31条の2第3  
828 項）。この登録販売者についても、薬局、店舗販売業又は配置販売業において、過去5年間のう  
829 ち、

830 ① 一般従事者（その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外  
831 の者をいう。）として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間  
832 ② 登録販売者として業務（店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。）に従事した期間  
833 が通算して2年以上（従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が2  
834 4月以上、又は、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,92  
835 0時間以上）あることが必要である。（法第31条の2第2項、規則第149条の2）。

836 ただし、これらの従事期間が通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業  
837 務に従事した経験がある場合も区域管理者となれることとされている。

838 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督  
839 するなど、その区域の業務につき、必要な注意をしなければならず、また、配置販売業者に対  
840 して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている（法第31条の3）。これ  
841 を受け、配置販売業者は、その区域管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置  
842 を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容（措置を講じない場合に  
843 あつては、その旨及びその理由）を記録し、これを適切に保存しなければならないこととされて  
844 いる（法第31条の4第2項）。

845 配置販売業者は、区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務を適正に遂行するこ  
846 とにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、必要な措置を講じるとともに、  
847 その措置の内容を記録し、適切に保存なければならないこととされている（法第31条の5）。

848 また、配置販売業がいわゆる行商という業態による販売であることから、これに対し薬事監  
849 視を行いやすくする必要性に基づき、「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従  
850 事しようとするときは、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所  
851 並びに区域及びその期間（規則第150条）を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区

852 域の都道府県知事に届け出なければならない」（法第32条）こととされている。本規定に違反  
 853 した者については、「三十万円以下の罰金に処する」（法第88条第4号）こととされている。

854 さらに、「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書  
 855 の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない」（法第  
 856 33条第1項）とされており、本規定に違反した者については、「五十万円以下の罰金に処する」  
 857 （法第87条第11号）こととされている。

858 なお、薬局開設者又は店舗販売業者は、店舗による販売又は授与以外の方法により医薬品を  
 859 販売等してはならず、同様に、配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等しては  
 860 ならないとされている（法第37条第1項）。そのため、薬局開設者又は店舗販売業者が、配置  
 861 による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可  
 862 を受ける必要がある。一方、配置販売業者が、店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売  
 863 等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。

864 また、配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている（法第37条  
 865 第2項）。

866

867 2) リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等

868 【リスク区分に応じた販売従事者等】

869 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の5の規定に基づき、要指導医薬品を販売し、授  
 870 与する場合には、薬剤師に、販売させ、授与させなければならないこととされている。また、要  
 871 指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対しては、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売  
 872 業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼  
 873 育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与する場合を除き、正当な理由なく要指導医薬品を販  
 874 売し、又は授与してはならないこととされている（法第36条の5第2項）。

875 また、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売し、又は授与するに当たっては、  
 876 次に掲げる方法により、薬剤師にをして販売させ、又は授与させなければならないこととされて  
 877 いる（法第36条の5第1項、規則第158条の11）。

878 (a) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しよ  
 879 うとする者であることを確認させること。この場合において、当該要指導医薬品を購入し、  
 880 又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該  
 881 者が法第36条の5第2項の薬剤師等である場合を除き、同項の正当な理由の有無を確認さ  
 882 せること。

883 (b) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該要指導医薬品を使用しよ  
 884 うとする者の他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの  
 885 状況を確認させること。

886 (c) (b)の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、  
887 販売し、又は授与させること。

888 (d) 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質  
889 問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。

890 (e) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報  
891 の提供又は指導を行った後に、当該要指導医薬品を販売し、又は授与させること。

892 (f) 当該要指導医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当  
893 該薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けよう  
894 とする者に伝えさせること。

895 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の9の規定に基づき、一般用医薬  
896 品を販売し、授与する場合には、次に掲げるリスク区分に応じて、当該各号に定める者に、販売  
897 させ、授与させなければならないこととされている。

	リスク区分	販売又は授与する者
一	第一類医薬品	薬剤師
二	第二類医薬品及び第三類医薬品	薬剤師又は登録販売者

898 また、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第一類医薬品を販売し、授与し、又は  
899 配置するに当たっては、次に掲げる方法により、薬剤師にを~~して~~販売させ、又は授与させなけれ  
900 ばならないこととされている。(法第36条の9、規則第159条の14第1項)

901 (a) 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認  
902 した後に、販売し、又は授与させること。

903 (b) 当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報  
904 の提供を行った後に、当該第一類医薬品を販売し、又は授与させること。

905 (c) 当該第一類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当  
906 該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第一類医薬品を購入し、又  
907 は譲り受けようとする者に伝えさせること。

908 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又  
909 は授与するに当たっては、次に掲げる方法により、薬剤師又は登録販売者にを~~して~~販売させ、又  
910 は授与させなければならないこととされている。(法第36条の9、規則第159条の14第2項)

911 (a) 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があっ  
912 た場合には、情報の提供を行った後に、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は  
913 授与させること。

914 (b) 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名、  
915 当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、  
916 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

917 薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、店  
 918 舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、配置販売業者は、  
 919 第一類医薬品を配置したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、2年間保存しなければならない  
 920 いこととされている（法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、規則第14  
 921 条第3項、第146条第3項、第149条の5第3項）。

922 (a) 品名

923 (b) 数量

924 (c) 販売、授与、配置した日時

925 (d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名

926 (e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

927 また、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、  
 928 授与し、又は配置したときは、上記(a)～(e)の事項を書面に記載し、保存するよう努めなければな  
 929 らないとされている（法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、規則第14  
 930 条第4項、第146条第4項、第149条の5第4項。(e)については第二類医薬品のみ）。

931 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品を販売し、授与し、又は配置したとき  
 932 は、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、保存するよう努めなけれ  
 933 ばならないとされている（法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、規則第  
 934 14条第5項、第146条第5項、第149条の5第5項）。

935

936 【リスク区分に応じた情報提供】

937 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売又は授与する場合には、次の(a)及び(b)に  
 938 より、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、購入者等に対して、  
 939 対面により、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない  
 940 とされている。（法第36条の6）

941 (a) 要指導医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供及び指導

942 法第36条の6第1項において、薬局開設者又は店舗販売業者が要指導医薬品を販売又は  
 943 授与する場合には、規則第158条の12第1項で定めるところにより、その薬局又は店舗  
 944 において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、規則第158条の12第  
 945 2項で定める事項を記載した書面<sup>ccxv</sup>を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に  
 946 基づく指導を行わせなければならないと規定されている。薬局開設者又は店舗販売業者は、  
 947 これら情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な使用を確保すること  
 948 ができないと認められるときは、要指導医薬品を販売又は授与してはならないこととされて

<sup>ccxv</sup> 当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。以下同じ。

949 いる。（法第36条の6第3項）

950 特に、当該要指導医薬品を使用しようとする者が薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経  
 951 時的に管理できる手帳（以下「お薬手帳」という。）を所持しない場合はその所持を勧奨し、  
 952 当該者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供及び  
 953 指導を行わせることとされており、お薬手帳には、要指導医薬品についても記録することが  
 954 重要である。

955 また、法第36条の6第2項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供及び  
 956 指導を行わせるに当たっては、当該薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなけ  
 957 ればならないと規定されている（規則第158条の12第4項）。

- 958 i) 年齢
- 959 ii) 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
- 960 iii) 性別
- 961 iv) 症状
- 962 v) iv) の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたこと
- 963 がある場合にはその診断の内容
- 964 vi) 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
- 965 vii) 妊娠しているか否か及び妊娠中である場合は妊娠週数
- 966 viii) 授乳しているか否か
- 967 ix) 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
- 968 x) 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったこと
- 969 があるか否か、かかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名
- 970 称、有効成分、服用した量及び服用の状況
- 971 xi) その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項

情報提供及び指導の方法 (規則第158条の12第1項関係)	情報提供の事項 (規則第158条の12第2項関係)
①当該薬局又は店舗内の情報提供及び指導を行う場所(構造設備規則第1条第1項第13号若しくは第2条第12号に規定する情報を提供し、指導を行うための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所)で行わせること	①当該要指導医薬品の名称 ②当該要指導医薬品の有効成分の名称及びその分量 ③当該要指導医薬品の用法及び用量 ④当該要指導医薬品の効能又は効果 ⑤当該要指導医薬品に係る使用上注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

<p>②当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のため必要な情報を、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者又は当該要指導医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、必要な指導を行わせること</p> <p>③<u>当該要指導医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること</u></p> <p>④当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること</p> <p>⑤④情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと及び更なる質問の有無について確認させること</p> <p>⑥⑤必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること</p> <p>⑦⑥必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること</p> <p>⑧⑦情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること</p>	<p>⑥その他当該要指導医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項</p>
--	--

972 (b) 販売時に購入者側から、又は事後において購入者若しくはその医薬品の使用者から相談が  
973 あった場合の対応

974 法第36条の6第4項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な  
975 使用のため、その薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けよう  
976 とする者又はその薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者  
977 若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた要指導医薬品を使用する者  
978 から相談があった場合には、規則第159条の規定により、その薬局又は店舗において医薬  
979 品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基



980 づく指導を行わせなければならないとされている。

981

982 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を販売又は授与する場合には、  
983 その分類されたりスク区分に応じて、次の(a)～(d)により、その薬局又は店舗において医薬品の販  
984 売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、購入者等に対して、必要な情報を提供させなけ  
985 ればならないとされている（法第36条の10）。

986 (a) 第一類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供

987 法第36条の10第1項において、薬局開設者又は店舗販売業者が第一類医薬品を販売又  
988 は授与する場合には、規則第159条の15第1項で定めるところにより、その薬局又は店  
989 舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、規則第159条の15第2項で定め  
990 る事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならないと規定されている。

991 特に、当該第一類医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、  
992 当該お薬手帳を活用した情報の提供を行わせることとされており、要指導医薬品と同様にお  
993 薬手帳には、一般用医薬品についても記録することが重要である。

994 また、法第36条の10第2項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供を  
995 行わせるに当たっては、薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなければならな  
996 いと規定されている（規則第159条の15第4項）。

997 i) 年齢

998 ii) 他の薬剤又は医薬品の使用の状況

999 iii) 性別

1000 iv) 症状

1001 v) iv) の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたこと  
1002 がある場合にはその診断の内容

1003 vi) 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名

1004 vii) 妊娠しているか否か及び妊娠中である場合は妊娠週数

1005 viii) 授乳しているか否か

1006 ix) 当該第一類医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

1007 x) 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったこと  
1008 があるか否か、かかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名  
1009 称、有効成分、服用した量及び服用の状況

1010 xi) その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項

情報提供の方法 (規則第159条の15第1項 <u>関係</u> )	情報提供の事項 (規則第159条の15第2項 <u>関係</u> )
---------------------------------------	---------------------------------------

<p>①当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所（構造設備規則第1条第1項第13号若しくは第2条第12号に規定する情報を提供するための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所）で行わせること</p> <p>②当該第一類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第一類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該第一類医薬品の適正な使用のため必要な情報を、当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者又は当該第一類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること</p> <p>③<u>当該一般用医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供を行わせること</u></p> <p>④当該第一類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること</p> <p>⑤④情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び更なる質問の有無について確認させること</p> <p>⑥⑤必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること</p> <p>⑦⑥情報の提供を行った薬剤師の氏名を伝えさせること</p>	<p>①当該第一類医薬品の名称</p> <p>②当該第一類医薬品の有効成分の名称及びその分量</p> <p>③当該第一類医薬品の用法及び用量</p> <p>④当該第一類医薬品の効能又は効果</p> <p>⑤当該第一類医薬品に係る使用上注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項</p> <p>⑥その他当該第一類医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項</p>
--	--

1011

1012

1013

1014

1015

1016

配置販売業者については、法第36条の10第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づき、その業務に係る都道府県の区域において第一類医薬品を配置する場合には、規則第159条の18の規定により読み替えて適用される規則第159条の15で定めるところにより、医薬品の配置販売に従事する薬剤師に、規則第159条の15第2項で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならないとされて

1017 いる。

1018 また、第一類医薬品に関する情報の提供を受けた者が情報提供の内容を理解したことを確  
1019 認した後でなければ、当該第一類医薬品を販売し、又は授与してはならないとされている。

1020 ただし、いずれの場合にも、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しな  
1021 い旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると  
1022 判断した場合には、適用しないこととされている（法第36条の10第6項）。

1023 (b) 第二類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供

1024 法第36条の10第3項において、薬局開設者又は店舗販売業者が第二類医薬品を販売又  
1025 は授与する場合には、規則第159条の16の規定により、医薬品の販売又は授与に従事す  
1026 る薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならないと規定され  
1027 ている。また、法第36条の10第4項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の  
1028 提供を行わせるに当たっては、薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、(a)のi)～xi)に掲  
1029 げる事項を確認させるよう努めなければならないと規定されている。

1030 配置販売業者については、法第36条の6第7項の規定により読み替えて適用される同条  
1031 第3項の規定に基づき、その業務に係る都道府県の区域において第二類医薬品を配置する場  
1032 合には、規則第159条の18の規定により読み替えて準用される第159条の16の規定  
1033 により、医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよ  
1034 う努めなければならないとされている。

1035 なお、第二類医薬品に分類された医薬品のうち、特定の使用者（小児、妊婦等）や相互作  
1036 用に関して使用を避けるべき注意事項があり、それに該当する使用がなされた場合に重大な  
1037 副作用を生じる危険性が高まる成分、又は依存性・習慣性がある成分が配合されたもの（指  
1038 定第二類医薬品）については、薬剤師又は登録販売者による積極的な情報提供の機会がより  
1039 確保されるよう、陳列方法を工夫する等の対応が求められる。

1040 また、指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しよ  
1041 うとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販  
1042 売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなけ  
1043 ればならないとされている（法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、  
1044 規則第15条の7、第147条の8、第149条の11）。

1045 (c) 第三類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供

1046 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者が、第三類医薬品に区分された医薬品を販売  
1047 又は授与する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましい。

1048 (d) 一般用医薬品の販売時に購入者側から、又は事後において購入者若しくはその医薬品の使  
1049 用者から相談があった場合の対応

1050 法第36条の10第5項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正

1051 な使用のため、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けよ  
 1052 うとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた  
 1053 者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する  
 1054 者から相談があった場合には、規則第159条の17の規定により、医薬品の販売又は授与  
 1055 に従事する薬剤師又は登録販売者にをして、必要な情報を提供させなければならないとされ  
 1056 ている。

1057 配置販売業者については、法第36条の10第7項の規定により読み替えて適用される同条第  
 1058 5項の規定に基づき、配置販売によって一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者  
 1059 又は配置した一般用医薬品を使用する者から相談があった場合には、規則第159条の18の規  
 1060 定により読み替えて適用される規則第159条の17で定めるところにより、医薬品の配置販売  
 1061 に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならないこととされている。

1062 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を購入し、又は譲り受けよう  
 1063 する者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならない  
 1064 こととされている。

1065 以上を要約すると次表のとおりとなる。

リスク区分	対応する 専門家	購入者側から質問等がな くても行う積極的な情報提供	情報提供 を行う 場所	購入者側から相 談があった場合 の応答
要指導 医薬品	薬剤師	対面により、書面を用いた情報 提供及び薬学的知見に基づく 指導を義務づけ	情報提供 を行う場 所 (配置販 売の場合 は医薬品 を配置す る場所)	義務
第一類 医薬品		書面を用いた情報提供を義務 づけ		
第二類 医薬品	薬剤師 又は 登録 販売者	努力義務		
第三類 医薬品		(法上の規定は特になし)		

1066  
 1067 【リスク区分に応じた陳列等】

1068 (a) 薬局及び店舗販売業

1069 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第57条の2第1項の規定により、医薬品を他の物と区  
 1070 別して貯蔵し、又は陳列しなければならないこととされている。また、法第57条の2第2項  
 1071 の規定により、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品を陳列する場  
 1072 合には、次の方法によりこれらを区別して陳列しなければならない。

1073 ① 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画（構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区

1074 画をいう。)の内部の陳列設備に陳列しなければならない。(規則第218条の3第1号、  
1075 構造設備規則第1条第1項第11号、第2条第10号)ただし、次の場合を除く。

- 1076 i) 鍵かぎをかけた陳列設備に陳列する場合  
1077 ii) 要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合  
1078 ② 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。(規則第2  
1079 18条の3第2号)

1080 なお、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与  
1081 しない時間は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなけ  
1082 ればならない(規則第14条の3第1項、第147条第1項)。要指導医薬品又は第一類医薬品  
1083 を販売し、又は授与する薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販  
1084 売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなけ  
1085 ればならない。ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している  
1086 場合は、この限りでない。(規則第14条の3第2項、第147条第2項、構造設備規則第1条  
1087 第1項第11号、第12号、第2条第10号、第11号)

1088 法第57条の2第3項の規定により、薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品を陳列  
1089 する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに、次の方法により陳列  
1090 しなければならない。

- 1091 ① 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区  
1092 画をいう。)の内部の陳列設備に陳列しなければならない。(規則第218条の4第1項第1  
1093 号、構造設備規則第1条第1項第12号、第2条第11号)ただし、次の場合を除く。

- 1094 i) 鍵かぎをかけた陳列設備に陳列する場合  
1095 ii) 第一類医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合  
1096 ② 指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メ  
1097 ートル以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。(規則第218条  
1098 の4第1項第2号)

- 1099 i) 鍵かぎをかけた陳列設備に陳列する場合  
1100 ii) 指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しよ  
1101 うとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合

- 1102 ③ 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列しなければなら  
1103 ない。(規則第218条の4第1項第3号)

1104 (b) 配置販売業

1105 配置販売業者は、法第57条の2第1項の規定により、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、  
1106 又は陳列しなければならないこととされている。また、配置販売業者は、一般用医薬品を陳  
1107 列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければな

1108 らないとされており、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように  
1109 配置しなければならない。（規則第218条の4第2項）

1110  
1111 薬局や医薬品の販売業において、医薬品を販売する店舗と同一店舗で併せて、食品（保健機能  
1112 食品を含む。）、医薬部外品、化粧品等の販売が行われる場合には、医薬品と他の物品を区別して  
1113 貯蔵又は陳列することが求められる（法第57条の2第1項）。

1114 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者が販売等することにより、一般の生活者に医薬品  
1115 でない製品（食品、医薬部外品、化粧品等）について医薬品的な誤認を与えることのないよう、  
1116 又は医薬品について食品的若しくは化粧品的な使用目的、使用方法と誤認を与えることのないよ  
1117 う、十分配慮される必要がある。

1118  
1119 【薬局又は店舗における掲示】

1120 リスク区分に応じた情報提供又は相談対応の実効性を高めるため、薬局開設者又は店舗販売  
1121 業者は、当該薬局又は店舗を利用するために必要な次の情報を、当該薬局又は店舗の見やすい  
1122 位置に掲示板で掲示しなければならない（法第9条の5-4及び第29条の4-3、規則第15条  
1123 の15、規則第147条の12、別表第1の2）。

1124  
1125  
1126

<p>薬局又は店舗の管理及び運営に関する 事項</p>	<p>薬局製造販売医薬品<sup>ccxvi</sup>、要指導医薬品 及び 一般用医薬品の 販売制度に関する事項</p>
<p>① 許可の区分の別 ② 開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項 ③ <del>薬局、店舗</del>の管理者の氏名 ④ 勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定するの登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定するの登録販売者の別、その氏名及び担当業務</p>	<p>① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びに及びこれらに関する解説 ② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 ③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説</p>

<sup>ccxvi</sup> 薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの。

<ul style="list-style-type: none"> <li>⑤ 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分</li> <li>⑥ 薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明</li> <li>⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間</li> <li>⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>④ <a href="#">薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説</a></li> <li>⑤ <a href="#">要指導医薬品の陳列に関する解説</a></li> <li>⑥⑤ <a href="#">指定第二类医薬品の陳列等に関する解説</a></li> <li>⑦⑥ <a href="#">指定第二类医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二类医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二类医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨</a></li> <li>⑧⑦ <a href="#">一般用医薬品の陳列に関する解説</a></li> <li>⑨⑧ <a href="#">医薬品による健康被害の救済制度に関する解説</a></li> <li>⑩⑨ <a href="#">個人情報の適正な取扱いを確保するための措置</a></li> <li>⑪⑩ <a href="#">その他必要な事項</a></li> </ul>
--	---

1127 また、配置販売業者は、次の情報を記載した書面を添えて配置しなければならない（法第3  
1128 1条の4第1項、規則第149条の10、別表第1の4）。

区域の管理及び運営に関する事項	一般用医薬品の販売制度に関する事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>① 許可の区分の別</li> <li>② 配置販売業者の氏名又は名称、営業の区域その他の許可証の記載事項</li> <li>③ 区域管理者の氏名</li> <li>④ 当該区域に勤務する薬剤師又は第十五条第二項<a href="#">本文に規定する</a>の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項<a href="#">本文に規定する</a>の登録販売者の別、その氏名及び担当業務</li> <li>⑤ 取り扱う一般用医薬品の区分</li> <li>⑥ 当該区域に勤務する者の名札等による</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 第一類医薬品、第二类医薬品及び第三類医薬品の定義<a href="#">並びに及び</a>これらに関する解説</li> <li>② 第一類医薬品、第二类医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説</li> <li>③ 第一類医薬品、第二类医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説</li> <li>④ 指定第二类医薬品の定義等に関する解説</li> <li>⑤ 指定第二类医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二类医</li> </ul>

<p>区別に関する説明</p> <p>⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間</p> <p>⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先</p>	<p>薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨</p> <p>⑥ 一般用医薬品の陳列に関する解説</p> <p>⑦ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説</p> <p>⑧ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置</p> <p>⑨ その他必要な事項</p>
--	---

1129

1130 【特定販売】

1131 「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品<sup>eexvii</sup>（毒薬及び劇薬であるものを除く。）の販売又は授与」を「特定販売」という（規則第1条第2項第3号）。

1134 薬局開設者又は店舗販売業者は、特定販売を行う場合には、次に掲げるところにより行わなければならない。（法第9条第1項、第29条の2第1項、規則第15条の6、第147条の7、別表第1の2及び第1の3）

- 1137 ① 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。
- 1138
- 1139 ② 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、次に掲げる情報を、見やすく表示すること。
- 1140
- 1141

薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項	薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項	特定販売に伴う事項
<p>① 許可の区分の別</p> <p>② 開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項</p> <p>③ 薬局、店舗の管理者の氏名</p> <p>④ 勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定す</p>	<p>① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びに及びこれらに関する解説</p> <p>② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解</p>	<p>① 薬局又は店舗の主要な外観の写真</p> <p>② 薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真</p> <p>③ 現在勤務している薬剤師又は第十五条第二項本文</p>

<sup>eexvii</sup> 薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの。



<p><u>る</u>の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項<u>本文に規定する</u>の登録販売者の別、その氏名及び担当業務</p> <p>⑤ 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分</p> <p>⑥ 薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明</p> <p>⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間</p> <p>⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先</p>	<p>説</p> <p>③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説</p> <p>④ <u>薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説</u></p> <p>⑤ 要指導医薬品の陳列に関する解説</p> <p>⑥⑤ 指定第二類医薬品の表示等に関する解説</p> <p>⑦⑥ 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨</p> <p>⑧⑦ 一般用医薬品の表示に関する解説</p> <p>⑨⑧ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説</p> <p>⑩⑨ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置</p> <p>⑪⑩ その他必要な事項</p>	<p><u>に規定する</u>の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項<u>本文に規定する</u>の登録販売者の別及びその氏名</p> <p>④ 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び特定販売を行う時間</p> <p>⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品<del>（毒薬及び劇薬を除く。）</del>又は一般用医薬品の使用期限</p>
--	--	--

1142

1143 ③ 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二

1144 類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。<sup>ccxviii</sup>

1145 ④ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事  
 1146 （その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市は特別区の区域にある場合においては、  
 1147 市長又は区長。）及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。  
 1148 特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面又は電話  
 1149 により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗  
 1150 において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報  
 1151 提供を行わせなければならない（規則第159条の17第2項）。

1152

1153 【医薬品の購入等に関する記録等】

1154 (a) 薬局

1155 薬局開設者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業  
 1156 者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、  
 1157 又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。ただし、④（氏名又  
 1158 は名称以外の事項に限る。）及び⑤については、薬局開設者と医薬品を購入若しくは譲り受けた  
 1159 者又は販売若しくは授与した者（以下この項及び次項において「購入者等」という。）が常時取  
 1160 引関係にある場合を除くこと。また、⑥については、購入者等が自然人であり、かつ、購入者  
 1161 等自らが医薬品の取引の任に当たる場合を除くこと。（規則第14条）

1162 ① 品名

1163 ② 数量

1164 ③ 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日

1165 ④ 購入若しくは譲り受けた者又は販売若しくは授与した者（以下「購入者等」という。）の  
 1166 氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先

1167 ⑤ ④の事項を確認するために提示を受けた資料

1168 ⑥ 医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から  
 1169 取引の指示を受けたことを示す資料

1170 また、薬局開設者は、購入者等が常時取引関係にある場合を除き、①から⑥までの事項を書  
 1171 面に記載する際に、購入者等から、薬局開設、医薬品の製造販売業、製造業若しくは販売業又  
 1172 は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設の許可に係る許可証の写し（以下単に「許可  
 1173 証の写し」という。）その他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番  
 1174 号その他の連絡先を確認しなければならないこと。なお、この確認ができない場合は、医薬品

<sup>ccxviii</sup> ただし、インターネットを利用する場合は、そのホームページで区分ごとに表示する措置を確保した上であれば、検索結果等においてまで区分ごとに表示する必要はないが、検索結果等として表示された医薬品の区分が明確に分かるよう表示させる必要がある。

1175 の譲受及び譲渡を行わないこと。

1176 また、医療用医薬品（体外診断用医薬品を除く。）については、①から⑥までの事項に加え、  
1177 ロット番号（ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号）及び使用の期限を  
1178 記載する必要があること。

1179 なお、ロット番号（ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号）及び使用  
1180 の期限については、医療用医薬品（体外診断用医薬品を除く。）以外の医薬品（以下「一般用医  
1181 薬品等」という。）についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載す  
1182 ることが望ましいこと。

#### 1183 (b) 店舗販売業

1184 店舗販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売  
1185 業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売  
1186 し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。ただし、④（氏  
1187 名又は名称以外の事項に限る。）及び⑤については、店舗販売業者と購入者等が常時取引関係に  
1188 ある場合を除くこと。また、⑥については、購入者等が自然人であり、かつ、購入者等自らが  
1189 医薬品の取引の任に当たる場合を除くこと。（規則第146条）

1190 ① 品名

1191 ② 数量

1192 ③ 購入等の年月日

1193 ④ 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先

1194 ⑤ ④の事項を確認するために提示を受けた資料

1195 ⑥ 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及  
1196 び購入者等が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等  
1197 と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料

1198 また、店舗販売業者は、購入者等が常時取引関係にある場合を除き、①から⑥までの事項を  
1199 書面に記載する際に、購入者等から、許可証の写しその他の資料の提示を受けることで、購入  
1200 者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならないこと。なお、この  
1201 確認ができない場合は、医薬品の譲受及び譲渡を行わないこと。

1202 また、ロット番号（ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号）及び使用  
1203 の期限については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点か  
1204 ら、併せて記載することが望ましいこと。

#### 1205 (c) 配置販売業

1206 配置販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたときは、次に掲げる事項を書面に記載し  
1207 なければならない。ただし、④（氏名又は名称以外の事項に限る。）及び⑤については、配置販  
1208 売業者と当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者（以下この項において「販売

1209 者等」という。)が常時取引関係にある場合を除くこと。また、⑥については、販売者等が自然  
 1210 人であり、かつ、販売者等自らが医薬品の取引の任に当たる場合を除くこと。(規則149条の  
 1211 5)

1212 ① 品名

1213 ② 数量

1214 ③ 購入又は譲受けの年月日

1215 ④ 販売者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先

1216 ⑤ ④の事項を確認するために提示を受けた資料

1217 ⑥ 医薬品の取引の任に当たる自然人が、販売者等と雇用関係にあること又は販売者等から  
 1218 取引の指示を受けたことを表す資料

1219 また、配置販売業者は、販売者等が常時取引関係にある場合を除き、①から⑥までの事項を  
 1220 書面に記載する際に、販売者等から、許可証の写しその他の資料の提示を受けることで、販売  
 1221 者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならないこと。なお、この  
 1222 確認ができない場合は、医薬品の譲受を行わないこと。

1223 また、ロット番号（ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号）及び使用  
 1224 の期限については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点か  
 1225 ら、併せて記載することが望ましいこと。

1226 (d) 複数の事業所について許可を受けている場合

1227 法に基づく許可を受けて医薬品を業として販売又は授与する者(以下「許可事業者」という。)  
 1228 が、複数の事業所について許可を受けている場合には、当該許可事業者内の異なる事業所間の  
 1229 医薬品の移転であっても、その移転に係る記録について許可を受けた事業所ごとに記録するこ  
 1230 とを明確化するため、移転先及び移転元のそれぞれの事業所ごとに、次の①から⑤までの事項  
 1231 を記録しなければならない。ただし、②及び③については、医療用医薬品（体外診断用医薬品  
 1232 を除く。）である場合に限ること。

1233 なお、②及び③については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対  
 1234 策の観点から、併せて記載することが望ましいこと。

1235 ① 品名

1236 ② ロット番号（ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号）

1237 ③ 使用の期限

1238 ④ 数量

1239 ⑤ 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日

1240 また、許可事業者は、①から⑤までの事項を記録した書面を、許可を受けて業務を行う事業  
 1241 所ごとに、記載の日から3年間、保存しなければならないこと。

1242 (e) 貯蔵設備を設ける区域

1243 薬局及び店舗販売業の店舗の構造設備に係る基準として、「医薬品の貯蔵設備を設ける区域が、  
1244 他の区域から明確に区別されていること」が規定されている（構造設備規則第1条第1項第9  
1245 号、第2条第9号）。また、薬局開設者及び店舗販売業者が講じなければならない措置として、  
1246 「医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定」が規定されている（体制  
1247 省令第1条第2項第3号、第2条第2項第2号）。

1248

1249 【その他の遵守事項等】

1250 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において医薬品の  
1251 販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるようその  
1252 薬局、店舗又は区域に勤務する者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければな  
1253 らない。なお、この名札については、過去5年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業にお  
1254 いて、一般従事者（その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以  
1255 外の者をいう。）として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登  
1256 録販売者として業務（店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。）に従事した期間（以下  
1257 「従事期間」という。）が通算して2年（事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従  
1258 事した月が24月、又は、従事期間が通算して2年以上、かつ、過去5年間に於いて合計1,  
1259 920時間）に満たない登録販売者である場合は、「登録販売者（研修中）」などの容易に判別  
1260 できるような表記をすることが必要である。

1261 また、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、この登録販売者については、薬剤師  
1262 又は登録販売者（前述の過去5年間のうち業務に従事した期間が2年に満たない場合を除く）  
1263 の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。（規則第15条、第147条の2、第  
1264 149条の6）。

1265 ただし、従事期間が通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事  
1266 した経験がある場合はこれらの規定は適用されない。

1267 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売し、又は授与するときは、次の方法により行わなければならないこととされている。（規則第15条の2、第147条の3、第149条の7）

1270 ① 当該薬局、店舗又は区域において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者  
1271 に、次に掲げる事項を確認させること。

1272 i) 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢

1273  
1274 ii) 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の  
1275 他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の  
1276 濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況

1277 iii) 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められ  
 1278 る数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由  
 1279 iv) その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために  
 1280 必要な事項

1281 ② 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、①の規定に  
 1282 より確認した事項を勘案し、適正な使用のため必要と認められる数量に限り、販売し、又は  
 1283 授与させること。

1284 濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品（平成26年厚生労働省告  
 1285 示第252号）は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する  
 1286 製剤とされており、対象の医薬品を販売する際には確認を行ったうえで適正に使用されるよう  
 1287 販売する必要がある。

- 1288 i) エフェドリン
- 1289 ii) コデイン（鎮咳去痰薬に限る。）
- 1290 iii) ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る。）
- 1291 iv) プロモバレリル尿素
- 1292 v) プソイドエフェドリン
- 1293 vi) メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。）

1294 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包に表示  
 1295 された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与  
 1296 の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならないこととされている。（規則第15条  
 1297 の3、第147条の4、第149条の8）

1298 薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならないこととされている。（規則  
 1299 第15条の4、第147条の5）

1300 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、販売し、又は授与しようとする医薬品につ  
 1301 いて広告するときは、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によつて購  
 1302 入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医  
 1303 薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならないこととされており、  
 1304 また、医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に  
 1305 特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれ  
 1306 のある方法により医薬品を広告してはならないこととされている（規則第15条の5、第14  
 1307 7条の6、第149条の9）。

1308 法第68条の2の5第3項（情報の活用等）の規定に関する出題については第5章 I-4）  
 1309 （購入者等に対する情報提供への活用）、第68条の10第2項（副作用等の報告）の規定に関  
 1310 する出題については第5章 II-1-1）（副作用情報等の収集）を参照して作成のこと。

1311

1312 **IV 医薬品販売に関する法令遵守**

## 1313 1) 適正な販売広告

1314 医薬品については、誇大広告等や承認前の医薬品等の広告が禁止されている<sup>ccxix</sup>。

1315 まず、誇大広告等については、法第66条において「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医  
1316 療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗  
1317 示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」（同条  
1318 第1項）とされ、「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、  
1319 記述し、又は流布する」ことはこれに該当するものとされている（同条第2項）。さらに、「何人  
1320 も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して墮胎を暗示し、又はわ  
1321 いせつにわたる文書又は図画を用いてはならない」とされている（同条第3項）。

1322 また、承認前の医薬品については、法第68条において「何人も、第14条第1項、又は第2  
1323 3条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は  
1324 再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1  
1325 項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の規定に  
1326 よる承認又は第23条の2の23第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名  
1327 称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」と規定され、未承認の医薬  
1328 品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告が禁止されている。

1329 これらの規定に違反して**広告販売等**を行った者については、「2年以下の懲役若しくは200  
1330 二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第85条第4号又は第5号）こととされて  
1331 いる。

1332 法第66条及び第68条は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が  
1333 対象となる。そのため、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われる宣伝広告に関し  
1334 て、業界団体の自主基準のほか、広告媒体となるテレビ、ラジオ、新聞又は雑誌の関係団体にお  
1335 いても、それぞれ自主的な広告審査等が行われている。

1336 一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるも  
1337 ののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレ  
1338 クトメール（電子メールを含む）、POP<sup>ccxx</sup>広告等も含まれる。こうした一般用医薬品の販売広告  
1339 に関しても、その内容や表現等が適切なものである必要があり、医薬品の販売等に従事する専門  
1340 家にあつては、その広告活動に関しても、法令遵守はもとより、医薬品の販売広告に係るルール  
1341 を十分理解し、その適正化に留意する必要がある。

<sup>ccxix</sup> 医薬品等の販売広告に関しては、法による保健衛生上の観点からの規制のほか、不当な表示による顧客の誘引の防止等を  
図るため、「不当景品類及び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」の規制もなされている。

<sup>ccxx</sup> Point of Purchase の略号で、購買時点広告と訳される。小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレイな  
どによる店頭・店内広告を指す。

1342 なお、医薬品の広告に該当するか否かについては、(1) 顧客を誘引する（顧客の購入意欲を昂  
1343 進させる）意図が明確であること、(2) 特定の医薬品の商品名（販売名）が明らかにされている  
1344 こと、(3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当す  
1345 るものと判断されている。

1346

#### 1347 【違反広告に係る措置命令等】

1348 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第66条第1項又は第68条の規定に違反して広告等を行  
1349 った者に対してその行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができることとされている（法  
1350 第72条の5）。

1351

#### 1352 【課徴金制度】

1353 厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇  
1354 大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の  
1355 課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある（法第75条の5の2）。

1356

#### 1357 【医薬品等適正広告基準】

1358 医薬品等適正広告基準とは、平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・  
1359 生活衛生局長通知（昭和55年通知は廃止）により、医薬品の販売広告に係る法令遵守、また、  
1360 生命関連製品である医薬品の本質にかんがみて、広告の適正化を図ることを目的として示された  
1361 ものである。この基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得さ  
1362 せるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正  
1363 なものとされている。

1364 (a) 事実に反する認識を得させるおそれがある広告

1365 一般用医薬品では、一般の生活者が医薬品を選択する際に販売広告が一つの判断要素となるの  
1366 で、広告の方法や内容、表現において、医薬品の効能効果や安全性等について事実に反する認識  
1367 を生じさせることのないよう、また、その医薬品が適正に使用されるよう、正確な情報の伝達が  
1368 重要である。

1369 一般の生活者が事実に反する認識を得るおそれがある広告については、医薬品の販売元の製薬  
1370 企業等が取得している承認の範囲を超える内容が表現されている場合、特にその効能効果につい  
1371 て、承認された内容に合致しない表現がなされている場合が多い。漢方処方製剤等では、使用す  
1372 る人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条  
1373 件（いわゆる「しぼり表現」）が付されていることが多いが、そうしたしぼり表現を省いて広告す  
1374 ることは原則として認められていない。なお、漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々  
1375 の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも



1376 不適當である。

1377 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の<sup>ぼう</sup>効能効果をそのまま標榜することも、  
1378 承認されている内容を正確に反映した広告といえない。一般用医薬品は、医療機関を受診するほ  
1379 どではない体調不良の不調や疾病の初期段階において使用されるものが多く、医師による診断・  
1380 治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患（例えば、がん、糖尿病、心臓病等）につい  
1381 て自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。

1382 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた  
1383 広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。（法第66条第1項）

1384 また、使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、こうした効能効果等の保証表  
1385 現となるものは認められない。このほか、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現  
1386 又はこれに類する表現等を行うことも不適當とされている。

1387 なお、チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品で  
1388 はない製品を併せて掲載すること自体は問題ないが、医薬品でない製品について医薬品的な効能  
1389 効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等  
1390 を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、その場合には法第68条の違反となる。

1391 (b) 過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告

1392 医薬品は、何らかの保健衛生上のリスクを有し、人の生命や健康に影響を与える生命関連製品  
1393 であるため、過度の消費や乱用が助長されることのないよう、また、生命関連製品としての信用  
1394 や品位が損なわれることのないよう、その広告については節度ある適切な内容や表現が求められ  
1395 る。

1396 販売広告に価格の表示や特定商品の名称と価格が特記表示されていることをもって直ちに不適  
1397 当とみなされることはないが、例えば、商品名を連呼する音声広告や、生活者の不安を煽<sup>おほ</sup>って購  
1398 入を促す広告等、医薬品が不必要な人にまで使用を促したり、安易な使用を促すおそれがあるも  
1399 のについては、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。

1400 また、「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった  
1401 事実と反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広  
1402 告にも該当する。

1403 さらに、医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選定等している旨の広告に  
1404 ついては、一般の生活者の当該医薬品に対する認識に与える影響が大きいことにかんがみて、仮  
1405 に事実であったとしても、原則として<sup>ccxxi</sup>不適當とされている。

1406 なお、チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調さ  
1407 れているような場合には、生活者に安易又は過度な医薬品の使用を促すおそれがある不適正な広

<sup>ccxxi</sup> 市町村が行う衛生害虫類駆除事業に際して特定の殺虫剤・殺そ剤の使用を住民に推薦するときのような、特別な場合を除く。

1408 告とみなされることがあるため注意が必要である。

1409

## 1410 2) 適正な販売方法

1411 薬局又は医薬品の販売業において、一般用医薬品の販売等が法令を遵守して適正に行われるた  
1412 めには、販売広告のほか、その許可の種類に応じた許可行為の範囲、一般用医薬品のリスク区分  
1413 及びリスク区分に応じた情報提供並びに法定表示事項等へ留意した販売方法について、注意する  
1414 ことが重要である。（規則第159条の14から第159条の17、構造設備規則第1条第1項第  
1415 13号、構造設備規則第2条第12号）

1416

### 1417 【不適正な販売方法】

1418 生活者に医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある販売方法については、販売広告  
1419 と同様に、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。キャラクターグッズ等の景  
1420 品類を提供して販売することに関しては、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認  
1421 められているが、医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。

1422 購入者の利便性のため異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品<sup>ccxxii</sup>を組み合わせる販売又  
1423 は授与する場合<sup>ccxxiii</sup>には、組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に  
1424 行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければ  
1425 ならない。したがって、効能効果が重複する組合せや、相互作用等により保健衛生上の危害を  
1426 生じるおそれのある組合せは不相当である。なお、組み合わせた個々の医薬品等の外箱等に記  
1427 載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見える  
1428 ようになっている必要がある。（法第51条）

1429 薬局及び店舗販売業において、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳  
1430 列し、そこを拠点として販売等に供するような場合は店舗による販売等に当たらず、また、配  
1431 置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当  
1432 たらぬ。これらの場合には、いずれも法第37条第1項の規定に違反するものとして取締り  
1433 の対象となる。

1434 なお、購入者がその購入した医薬品を業として他者に提供することが推定される場合におい  
1435 て、購入者の求めるままに医薬品を販売すると、法第24条第1項の規定に違反する行為（医  
1436 薬品の無許可販売）に便宜を与えることにつながるおそれがある。医薬品の販売等に従事する  
1437 専門家においては、例えば、「医薬品を多量に購入する者」等に対しては、積極的に事情を尋ね  
1438 るなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。

ccxxii 体温計、救急絆創膏<sup>ばんこう</sup>、ガーゼ、包帯、脱脂綿等、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲におい  
てのみ認められる。

ccxxiii 医薬品の組み合わせ販売は、購入者の利便性を考慮して行われるものであり、販売側の都合による抱き合わせ、在庫処  
分等の目的で組み合わせを行うことは、厳に認められない。

1439

1440 3) 行政庁の監視指導、苦情相談窓口

1441 【行政庁の監視指導】

1442 (a) 薬事監視員

1443 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市（以下「保健所設置市」という。）の市  
1444 長及び特別区の区長は、その職員のうちから薬事監視員を命じ（法第76条の3第1項）、監  
1445 視指導を行わせている。薬局及び医薬品の販売業に関する監視指導に関しては、基本的に当  
1446 該薬局の開設許可、販売業の許可を所管する都道府県又は保健所設置市若しくは特別区の薬  
1447 事監視員が行っている。

1448 (b) 立入検査等

1449 都道府県知事（薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所設置  
1450 市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下「都道府県知事等」という。）  
1451 は、法第69条第2項に基づき、薬局開設者又は医薬品の販売業者が、関係する法の規定又  
1452 はそれに基づく命令（具体的には法第69条第2項を参照）を遵守しているかどうかを確か  
1453 めるために必要があると認めるときは、その薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して必要  
1454 な報告をさせ、又は当該職員（薬事監視員）に、その薬局開設者又は医薬品の販売業者が医  
1455 薬品を業務上取り扱う場所に立ち入りさせ、その構造設備若しくは帳簿書類等を検査させ、  
1456 従業員その他の関係者に質問させることができる。また、このほかに必要があると認めると  
1457 きにも、法第69条第6項に基づき、その薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、必  
1458 要な報告をさせ、又は当該職員（薬事監視員）に、その薬局開設者又は医薬品の販売業者が  
1459 医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類等を検査させ、従  
1460 業員その他の関係者に質問させ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の  
1461 疑いのある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

1462 (c) 罰則

1463 これらの行政庁の監視指導に対して、薬局開設者や医薬品の販売業者が、命ぜられた報告  
1464 を怠ったり、虚偽の報告をした場合、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げた  
1465 り、忌避した場合、また、薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して  
1466 正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、「五十万円以下の罰金に処  
1467 する」（法第87条第13号）こととされている。

1468

1469 【行政庁による処分】 行政庁の監視指導の結果、厚生労働大臣、都道府県知事等が必要がある  
1470 と認めるときには、以下の処分を命じることができる。

1471 (a) 改善命令等

1472 都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者（配置販売業者を除く。）に対して、

1473 その構造設備が基準に適合せず、又はその構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある  
1474 場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善がなされるまでの間当該施設  
1475 の全部若しくは一部の使用を禁止することができる（法第72条第4項の規定に基づく改善  
1476 命令、施設の使用禁止処分）。本規定に基づく施設の使用禁止処分に違反した者については、  
1477 「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第8  
1478 6条第1項第18号）こととされている。

1479 また、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販  
1480 売等を行うための業務体制が基準（体制省令）に適合しなくなった場合において、その業務  
1481 体制の整備を命ずることができる（法第72条の2に基づく命令）、法令の遵守を確保するた  
1482 め措置が不十分であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべきことを命  
1483 ずることができる（法第72条の2の2に基づく命令）。

1484 このほか、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に、薬事に関する法令に  
1485 違反する行為があった場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要  
1486 があると認めるときは、その薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、その業務の運営の  
1487 改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる（法第72条の4第1項の規定に基  
1488 づく改善命令）。本規定に基づく命令に違反した者については、「1年以下の懲役若しくは  
1489 100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第86条第1項第19号）ことと  
1490 されている。

1491 さらに、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者について、その者に当該薬  
1492 局の開設又は販売業の許可の際に付された条件に違反する行為があったときは、その薬局開  
1493 設者又は医薬品の販売業者に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置を  
1494 採るべきことを命ずることができる（法第72条の4第2項に基づく改善措置是正命令）。加  
1495 えて、都道府県知事等は、薬局の管理者又は店舗管理者若しくは区域管理者について、その  
1496 者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はその者が管  
1497 理者として不適当であると認めるときは、その薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、  
1498 その変更を命ずることができる（法第73条の規定に基づく管理者の変更命令）。これらの命  
1499 令に違反した者についても、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又  
1500 はこれを併科する」（法第86条第1項第19号又は第20号）こととされている。

#### 1501 (b) 業務停止命令等

1502 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、薬事に関する法若しくはこれ  
1503 に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者  
1504 に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができ、また、  
1505 必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることがで  
1506 きる（法第74条の規定に基づく業務停止命令）。本命令に違反した者については、「1年

1507 以下の懲役若しくは100百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第86条第1  
1508 項第21号）こととされている。

1509 さらに、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者について、薬事に関する法  
1510 令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、薬局開設者又は医薬品の販売業者が  
1511 禁錮以上の刑に処せられるなど、その許可の基準として求めている事項<sup>ccxxiv</sup>に反する状態に  
1512 該当するに至ったときは、その許可を取り消し、または期間を定めてその業務の全部若しく  
1513 は一部の停止を命ずることができる（法第75条第1項の規定に基づく許可の取消し、業務  
1514 停止命令）。本規定に基づく業務停止命令に違反した者については、「2年以下の懲役若し  
1515 くは200百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」（法第85条第6号）こととさ  
1516 れている。

1517 このほか、厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するた  
1518 め必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、医薬品の販売又  
1519 は授与を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急措  
1520 置を採るべきことを命ずることができる（法第69条の3の規定に基づく緊急命令）。

1521 (c) 廃棄・回収命令等

1522 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、医薬品を業務上取り扱う者（薬局開設者、医薬品の  
1523 販売業者を含む。）に対し、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、  
1524 廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足る措置を採るべきことを命ずる  
1525 ことができる（法第70条第1項の規定に基づく廃棄等の命令）。また、厚生労働大臣、都道  
1526 府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、本命令を受けた者がその命令に従わな  
1527 いとき、又は緊急の必要があるときは、その職員（薬事監視員）に、その不正表示医薬品等  
1528 を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる（法第70  
1529 条第2項）。本命令に違反し、又はその廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  
1530 については、「3年以下の懲役若しくは300百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科  
1531 する」（法第84条第19号）こととされている。

1532 また、行政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用  
1533 によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これ  
1534 を防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければな  
1535 らないこととされており（法第68条の9第1項）、薬局開設者又は医薬品の販売業者、薬剤  
1536 師その他の医薬関係者は、医薬品等の製造販売業者等が行う必要な措置の実施に協力するよ  
1537 う努めなければならないこととされている（法第68条の9第2項）。

ccxxiv 法第5条第3号、第26条第2項第3号又は第30条第2項第2号に規定するものに限る。

1539 【苦情相談窓口】 一般用医薬品の販売等について、薬局開設者や医薬品の販売業者が適切な業  
 1540 務運営を行っていない場合に、実際に不利益を被るのは、その購入者となる一般の生活者であ  
 1541 る。

1542 薬事監視員を任命している行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所等には、薬局や医  
 1543 薬品の販売業の販売広告、販売方法等の一般用医薬品の販売等に関して、生活者からの苦情や  
 1544 相談が寄せられている。その苦情等の内容から、薬事に関する法令への違反、不遵守につなが  
 1545 る情報が見出された場合には、立入検査等によって事実関係を確認のうえ、問題とされた薬局  
 1546 開設者又は医薬品の販売業者等に対して、必要な指導、処分等を行っている。

1547 また、そのような生活者からの苦情等は、(独)国民生活センター、各地区の消費生活センタ  
 1548 ー又は消費者団体等の民間団体にも寄せられている。それらの機関、団体等では、生活者への  
 1549 アドバイスのほか、必要に応じて行政庁への通報や問題提起を行っている。

1550 なお、医薬品の販売関係の業界団体・職能団体においては、一般用医薬品の販売等に関する  
 1551 苦情を含めた様々な相談を購入者等から受けつける窓口を設置し、業界内における自主的な  
 1552 チェックと自浄的是正を図る取り組みもなされている。

1553

1554 第4章 別表

1555

II-3) 関係

1556

4-1. 医薬部外品の効能効果の範囲

(1) 衛生害虫類の防除のため使用される医薬部外品	効能効果の範囲
殺鼠剤： 保健のためにするねずみの防除を目的とする製剤	殺鼠、ねずみの駆除、殺滅又は防止
殺虫剤： 衛生のためにするはえ、蚊、のみ等の衛生害虫の防除を目的とする製剤	殺虫、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
忌避剤（虫除け薬）： はえ、蚊、のみ等の衛生害虫の忌避を目的とする外用剤	蚊成虫、ブユ（ブヨ）、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ（ナンキンムシ）等の忌避
(2) 医薬品から医薬部外品へ移行した製品群	効能効果の範囲
● 平成16年に医薬品から移行した新範囲医薬部外品	
健胃薬： 胃のもたれ、食欲不振、食べすぎ、飲みすぎ等の諸症状を改善することを目的とする内用剤（煎じて使用するものを除く）	食欲不振（食欲減退）、胃弱、胃部膨満感・腹部膨満感、消化不良、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、吐きけ、胃のむかつき、むかつき（二日酔い、悪酔い時を含む）、嘔気、悪心、嘔吐、栄養補給（妊産婦、授乳婦、虚弱体質者を含む）、栄養障害、健胃
整腸薬： 腸内の細菌叢を整え、腸運動を調節することを目的とする内用剤（煎じて使用するものを除く）	整腸、便通を整える、腹部膨満感、便秘、軟便（腸内細菌叢の異常による症状を含む）
消化薬： 消化管内の食物等の消化を促進することを目的とする内用剤	消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べすぎ（過食）、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、消化不良による胃部膨満感・腹部膨満感
健胃消化薬： 食欲不振、消化促進、整腸等の複数の胃腸症状を改善することを目的とする内用剤	食欲不振（食欲減退）、胃弱、胃部膨満感・腹部膨満感、消化不良、消化促進、食べすぎ（過食）、飲みすぎ、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、健胃、むかつき（二日酔い、悪酔い時を含む）、嘔気、悪心、嘔吐、吐きけ、栄養補給（妊産婦、授乳婦、虚弱体質者を含む）、栄養障害、整腸、便通を整える、便秘、軟便（腸内細菌叢の異常による症状を含む）
瀉下薬： 腸内に滞留・膨潤することにより、便秘等を改善することを目的とする内用剤	便通を整える（整腸）、軟便、腹部膨満感、便秘、痔、下痢軟便の繰り返し、便秘に伴う頭重・のぼせ・肌あれ・吹き出物・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満感、腸内異常発酵
ビタミン含有保健薬： ビタミン、アミノ酸その他身体の保持等に必要の栄養素の補給等を目的とする内用剤	滋養強壮、虚弱体質、次の場合の栄養補給：胃腸障害、栄養障害、産前産後、小児・幼児の発育期、偏食児、食欲不振、肉体疲労、妊娠授乳期、発熱性消耗性疾患、病後の体力低下、病中病後
カルシウム含有保健薬： カルシウムの補給等を目的とする内用剤（用時調整して使用するものを除く）	妊娠授乳期・老年期・発育期のカルシウム補給、虚弱体質の場合の骨歯の発育促進、骨歯の脆弱防止（妊娠授乳期）、カルシウム不足、カルシウム補給（栄養補給、妊娠授乳期）、腺病質、授乳期及び小児発育期のカルシウム補給源
生薬主剤保健薬： 虚弱体質、肉体疲労、食欲不振、発育期の滋養強壮等を目的とする生薬配合内用剤（煎じて使用するものを除く）	虚弱体質、肉体疲労、病中病後・病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期の滋養強壮
鼻づまり改善薬： 胸又はのど等に適用することにより、鼻づまりやくしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和を目的とする外用剤（蒸気を吸入して使用するものを含む）	鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和
殺菌消毒薬： 手指及び皮膚の表面又は創傷部に適用することにより、殺菌すること等を目的とする外用剤（絆創膏を含む）	手指・皮膚の殺菌・消毒、外傷の消毒・治療・殺菌作用による傷の化膿の防止、一般外傷・擦傷、切傷の殺菌・消毒、傷面の殺菌・消毒、きり傷・すり傷・さし傷・かき傷・靴ずれ・創傷面の殺菌・消

	毒・被覆
しもやけ・あかぎれ用薬： 手指、皮膚又は口唇に適用することにより、しもやけや唇のひびわれ・ただれ等を改善することを目的とする外用剤	ひび、あかぎれ、手指のひび、皮膚のあれ、皮膚の保護、手指のひらのあれ、ひじ・ひざ・かかとのあれ、かゆみ、かゆみどめ、しもやけ、口唇のひびわれ・ただれ、口唇炎、口角炎
含嗽薬： 口腔内又はのどの殺菌、消毒、洗浄等を目的とするうがい用薬（適量を水で薄めて用いるものに限る）	口腔内・のど（咽頭）の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
コンタクトレンズ装着薬： ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にすることを目的とするもの	ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にする
いびき防止薬： いびきの一時的な抑制・軽減を目的とする点鼻剤	いびきの一時的な抑制・軽減
口腔咽喉薬： のどの炎症による痛み・はれの緩和等を目的とするトローチ剤、口腔用スプレー剤・塗布剤	のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
● 平成11年に医薬品から移行した新指定医薬部外品	
のど清涼剤： のどの不快感を改善することも目的とする内用剤（トローチ剤及びドロップ剤）	たん、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのはれ
健胃清涼剤： 胃の不快感の改善を目的とする内用剤（カプセル剤、顆粒剤、丸剤、散剤、錠剤、錠剤、内用液剤）	食べすぎ又は飲みすぎによる胃部不快感及び吐きけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）
きず消毒保護剤： すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ又は創傷面の消毒及び保護を目的とする外用剤（外用液剤、絆創膏類）	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護（被覆）
外皮消毒剤： すり傷、きり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の洗浄又は消毒を目的とする外用剤（外用液剤、軟膏剤）	・ すり傷、きり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 ・ 手指・皮膚の洗浄・消毒
ひび・あかぎれ用剤： ひび、あかぎれ等の改善を目的とする外用剤（軟膏剤に限る）	・ クロルヘキシジン主剤製剤：ひび、あかぎれ、すり傷、靴ずれ ・ メントール・カンフル主剤製剤：ひび、しもやけ、あかぎれ ・ ビタミンA E主剤製剤：ひび、しもやけ、あかぎれ、手足のあれの緩和
あせも・ただれ用剤： あせも、ただれの改善を目的とする外用剤（外用液剤、軟膏剤）	あせも、ただれの緩和・防止
うおのめ・たこ用剤： うおのめ、たこの改善を目的とする絆創膏	うおのめ、たこ
かさつき・あれ用剤： 手足のかさつき又はあれの改善を目的とする外用剤（軟膏剤に限る）	手足のかさつき・あれの緩和
ビタミン剤： 1種類以上のビタミンを主体とした製剤であって、肉体疲労時、中高年期等における当該ビタミンの補給に用いることを目的とする内用剤（カプセル剤、顆粒剤、丸剤、散剤、錠剤、ゼリー状ドロップ剤、内用液剤）	・ ビタミンE剤：中高年期のビタミンEの補給 ・ ビタミンC剤：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時又は中高年期のビタミンCの補給 ・ 肉体疲労時、病中病後の体力低下時又は中高年期のビタミンECの補給
カルシウム補給剤： 1種類以上のカルシウムを主体とした製剤であって、妊娠授乳期、発育期等におけるカルシウムの補給に用いることを目的とする内用剤（カプセル剤、顆粒剤、散剤、錠剤、内用液剤）	妊娠授乳期・発育期・中高年期のカルシウムの補給
ビタミン含有保健剤： 1種類以上のビタミンを配合した製剤であって、滋養強壮、虚弱体質等の改善及び肉体疲労などの場合における栄養補給に用いることを目的とする内用剤（カプセル剤、顆粒剤、丸剤、散剤、錠剤、内用液剤）	滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後（又は病後の体力低下）・食欲不振（又は胃腸障害）・栄養障害・発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期（又は産前産後）等の場合の栄養補給
● 平成8年に医薬品から移行した医薬部外品	
ソフトコンタクトレンズ用消毒剤： ソフトコンタクトレンズの消毒に用いられる化学消毒剤	ソフトコンタクトレンズの消毒



(3) その他の医薬部外品	効能効果の範囲
口中清涼剤： 吐きけその他の不快感の防止を目的とする内用剤	りゅう飲、悪心・嘔吐、乗物酔い、二日酔い、宿酔、口臭、胸つかえ、気分不快、暑気あたり
腋臭防止剤： 体臭の防止を目的とする外用剤	わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗
てんか粉類： あせも、ただれ等の防止を目的とする外用剤	あせも、おしめ（おむつ）かぶれ、ただれ、股づれ、かみそりまけ
育毛剤（養毛剤）： 脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤	育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛
除毛剤： 除毛を目的とする外用剤	除毛
生理処理用ナプキン： 経血を吸収処理することを目的とする綿類（紙綿類を含む）	生理処理用
清浄用綿類： 塩化ベンザルコニウム水溶液又はクロルヘキシジングルコン酸塩水溶液を有効成分とする、衛生上の用に供されることを目的とする綿類（紙綿類を含む）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乳児の皮膚又は口腔の清浄又は清拭</li> <li>・ 授乳時の乳首又は乳房の清浄又は清拭</li> <li>・ 目、性器又は肛門の清浄又は清拭</li> </ul>
染毛剤（脱色剤、脱染剤を含む）： 毛髪の染色 <sup>ccxxv</sup> 、脱色又は脱染を目的とする外用剤	染毛、脱色、脱染
パーマメント・ウェーブ用剤： 毛髪のウェーブ等を目的とする外用剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毛髪にウェーブをもたせ、保つ。</li> <li>・ くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ</li> </ul>
薬用化粧品類： 化粧品としての使用目的 <sup>ccxxvi</sup> を併せて有する化粧品類似の剤形の外用剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シャンプー・リンス：ふけ・かゆみを防ぐ、毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ、毛髪・頭皮を清浄にする、毛髪の水分・脂肪を補い保つ、裂毛・切毛・枝毛を防ぐ、毛髪・頭皮をすこやかに保つ又は毛髪をしなやかにする</li> <li>・ 化粧水・クリーム・乳液・化粧用油、パック：肌あれ、あれ性、あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ、油性肌、カミソリまけを防ぐ、日やけによるシミ・そばかすを防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてり、肌をひきしめる、肌を清浄にする、肌を整える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える、皮膚を保護する、皮膚の乾燥を防ぐ</li> <li>・ ひげそり用剤：カミソリまけを防ぐ、皮膚を保護し、ひげを剃りやすくする</li> <li>・ 日やけ止め剤：日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ、日やけ・雪やけを防ぐ、日やけによるシミ・そばかすを防ぐ、皮膚を保護する</li> </ul>
薬用石けん（洗顔料を含む）： 化粧品としての使用目的を併せて有する石けん類似の剤形の外用剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 殺菌剤主剤製剤：皮膚の清浄・殺菌・消毒、体臭・汗臭及びにきびを防ぐ</li> <li>・ 消炎剤主剤製剤：皮膚の清浄、にきび・カミソリまけ及び肌あれを防ぐ</li> </ul>
薬用歯みがき類： 化粧品としての使用目的を併せて有する歯みがきと類似の剤形の外用剤、洗口することを目的とするもの（洗口液）	<p>①ブラッシングにより歯を磨くことを目的とするもの：<u>歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎（歯槽膿漏）の予防、歯肉（齦）炎の予防、歯石の形成及び沈着を防ぐ、むし歯を防ぐ、むし歯の発生及び進行の予防、口臭又はその発生の防止、タバコのやに除去、歯がしみるのを防ぐ、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、むし歯を防ぐ</u></p> <p>②口に含みすすいで、吐き出した後ブラッシングにより歯を磨くことを目的とするもの：<u>歯周炎（歯槽膿漏）の予防、歯肉（齦）炎の予防、むし歯の発生及び進行の予防、口臭又はその発生の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、むし歯を防ぐ</u></p> <p>③洗口することを目的とするもの：<u>口臭又はその発生の防止、口中を浄化する、こと並びに口中を爽快に</u></p>

ccxxv 毛髪を単に物理的に染色するものは含まない。

ccxxvi 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために使用される目的（法第2条第3項）

	すること
浴用剤： 原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤（浴用石けんを除く）	あせも、荒れ性、打ち身、肩のこり、くじき、肩の凝り、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび

1557

1558

Ⅱ－3）関係

1559

4－2．化粧品の効能効果の範囲

<p>(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。                  (2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。                  (3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。                  (4) 毛髪にはり、こしを与える。                  (5) 頭皮、頭髪にうるおいを与える。                  (6) 頭皮、毛髪にうるおいを保つ。                  (7) 毛髪をしなやかにする。                  (8) クシどおりをよくする。                  (9) 毛髪をつやを保つ。                  (10) 毛髪につやを与える。                  (11) フケ、カユミがとれる。                  (12) フケ、カユミを抑える。                  (13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。                  (14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。                  (15) 髪型を整え、保持する。                  (16) 毛髪の帯電を防止する。                  (17) (汚れをおとすことにより) 皮膚を清浄にする。                  (18) (洗浄により) ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。                  (19) 肌を整える。                  (20) 肌のキメを整える。                  (21) 皮膚をすこやかに保つ。                  (22) 肌荒れを防ぐ。                  (23) 肌をひきしめる。                  (24) 皮膚にうるおいを与える。                  (25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。                  (26) 皮膚の柔軟性を保つ。                  (27) 皮膚を保護する。                  (28) 皮膚の乾燥を防ぐ。                  (29) 肌を柔らげる。                  (30) 肌にはりを与える。</p>	<p>(31) 肌にツヤを与える。                  (32) 肌を滑らかにする。                  (33) ひげを剃りやすくする。                  (34) ひげそり後の肌を整える。                  (35) あせもを防ぐ(打粉)。                  (36) 日やけを防ぐ。                  (37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。                  (38) 芳香を与える。                  (39) 爪を保護する。                  (40) 爪をすこやかに保つ。                  (41) 爪にうるおいを与える。                  (42) 口唇の荒れを防ぐ。                  (43) 口唇のキメを整える。                  (44) 口唇にうるおいを与える。                  (45) 口唇をすこやかにする。                  (46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。                  (47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。                  (48) 口唇を滑らかにする。                  (49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。                  (50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。                  (51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。                  (52) 口中を浄化する(歯みがき類)。                  (53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。                  (54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。                  (55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。                  (56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。</p>
---	---

1560

注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」又は「保つ」との効能でも可とする。

1561

注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。

1562

注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

1563

1564

このほかに、「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなくみせる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは事実と反しない限り認められている。

1565

1566

1567

1568

Ⅱ－3）関係

1569

4－3．特定保健用食品：これまでに認められている主な特定の保健の用途

表示内容	保健機能成分
おなかの調子を整える等	各種オリゴ糖、ラクチュロース、ビフィズス菌、各種乳酸菌、食物繊維（難消化性デキストリン、ポリデキストロース、グアーガム分解物、サイリウム種皮等）
血糖値が気になる方に適する、食後の血糖値の上昇を緩やかにする等の血糖値関係	難消化性デキストリン、小麦アルブミン、グアバ葉ポリフェノール、L-アラビノース等
血圧が高めの方に適する等の血圧関係	ラクトリペプチド、カゼインドデカペプチド、杜仲葉配糖体（ベニボシド酸）、サーデンペプチド等
コレステロールが高めの方に適する等のコレステロール関係	キトサン、大豆たんぱく質、低分子化アルギン酸ナトリウム
歯の健康維持に役立つ等の歯関係	パラチノース、マルチトール、エリスリトール等
コレステロール＋おなかの調子、中性脂肪＋コレステロール等	低分子化アルギン酸ナトリウム、サイリウム種皮等
骨の健康維持に役立つ等の骨関係	大豆イソフラボン、MBP（乳塩基性たんぱく質）等
カルシウム等の吸収を高める等のミネラルの吸収関係	クエン酸リンゴ酸カルシウム、カゼインホスホペプチド、ヘム鉄、フラクトオリゴ糖等
食後の血中中性脂肪が上昇しにくい又は身体に脂肪が付きにくい等の中性脂肪関係	中性脂肪酸等

1570

1571

（参考）主な情報入手先

<b>（独）国立健康・栄養研究所</b>	
「健康食品」の安全性・有効性情報	<a href="https://hfnet.nih.go.jp/">https://hfnet.nih.go.jp/</a>

1572

1573

1574

Ⅱ－3）関係

1575

4－4. 栄養機能食品：栄養機能表示と注意喚起表示

栄養成分	栄養機能表示	注意喚起表示	
亜鉛	亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。1日の摂取の目安を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。	
カルシウム	カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。	
鉄	鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。		
銅	銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。	
マグネシウム	マグネシウムは、骨の形成や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便（下痢）になることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。	
ナイアシン	ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。	
パントテン酸	パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。		
ビオチン	ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。		
ビタミンA	ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。	
β-カロテン <sup>ccxxvii</sup> （ビタミンAの前駆体）	β-カロテンは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。β-カロテンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。	
ビタミンB <sub>1</sub>	ビタミンB <sub>1</sub> は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚と粘膜の健康維持を助ける栄養素です。	本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。	
ビタミンB <sub>2</sub>	ビタミンB <sub>2</sub> は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。		
ビタミンB <sub>6</sub>	ビタミンB <sub>6</sub> は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。		
ビタミンB <sub>12</sub>	ビタミンB <sub>12</sub> は、赤血球の形成を助ける栄養素です。		
ビタミンC	ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。		
ビタミンD	ビタミンDは、腸管のカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。		
ビタミンE	ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。		
葉酸	葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。		本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。本品は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。

1576

ccxxvii ビタミンAの前駆体であるβ-カロテンは、ビタミンA源の栄養機能食品として、ビタミンAと同様に栄養機能表示が認められている。β-カロテンはビタミンAに換算して1/12であるため、「妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。」旨の注意喚起表示は不要とされている。

## 1577 (参考) 関係条文 等

## 1578 ○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）抄

## 1580 (目的)

1581 第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の  
1582 品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必  
1583 要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医  
1584 療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図る  
1585 ことを目的とする。

## 1586 (国の責務)

1587 第一条の二 国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用に  
1588 よる保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

## 1590 (都道府県等の責務)

1591 第一条の三 都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を  
1592 設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況  
1593 に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。

## 1594 (医薬品等関連事業者等の責務)

1595 第一条の四 医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、  
1596 第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医  
1597 療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の  
1598 診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要  
1599 な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上  
1600 の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。

## 1603 (医薬関係者の責務)

1604 第一条の五 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これら  
1605 の適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所  
1606 所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の  
1607 二十二第三項及び第四項において同じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適  
1608 正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。

1609 2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤  
1610 又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他  
1611 の医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下  
1612 同じ。)において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施  
1613 設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。

1614 3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局において  
1615 薬剤師による前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。

## 1616 (国民の役割)

1617 第一条の六 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深  
1618 めるよう努めなければならない。

1621

(定義)

第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。))及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。

一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほか、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

ロ あせも、ただれ等の防止

ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほか、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌<sup>ぼう</sup>を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほか、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

5 この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

6 この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

7 この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

8 この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

9 この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの

イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成

ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防

二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含むもの

10 この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

11 この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、貸与し、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

13 この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供することをいう。

14 この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることがないものをいう。

15 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚的作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「精神毒性」という。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第二百二十四号)に規定する大麻、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

16 この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を、「希少疾病用再生医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製品を、「先駆的医薬品」とは、同条第二項の規定による指定を受けた医薬品を、「先駆的医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を、「先駆的再生医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製品を、「特定用途医薬品」とは、同条第三項の規定による指定を受けた医薬品を、「特定用途医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を、「特定用途再生医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製品をいう。

17 この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第十五項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(同条第十五項及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第三項(同条第十一項及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。

18 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。

#### (開設の許可)

第四条 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。))において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 その薬局の名称及び所在地



- 1714 三 その薬局の構造設備の概要
- 1715 四 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局におい
- 1716 て医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
- 1717 五 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 1718 六 次条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
- 1719 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 1720 一 その薬局の平面図
- 1721 二 第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合
- 1722 にあつては、その薬局の管理者の氏名及び住所を記載した書類
- 1723 三 第一項の許可を受けようとする者及び前号の薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従
- 1724 事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した
- 1725 書類
- 1726 四 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては、次のイ及びロに掲げる書類
- 1727 イ その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚
- 1728 生労働省令で定める区分を記載した書類
- 1729 ロ その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあ
- 1730 つては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
- 1731 五 その他厚生労働省令で定める書類
- 1732 4 第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 1733 5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 1734 一 登録販売者 第三十六条の八第二項の登録を受けた者をいう。
- 1735 二 薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とさ
- 1736 れているものを除く。)をいう。
- 1737 三 要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている
- 1738 ものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その
- 1739 他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもので
- 1740 あり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われ
- 1741 ることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 1742 イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十一項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に
- 1743 係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 1744 ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
- 1745 同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期
- 1746 間を経過しないもの
- 1747 ハ 第四十四条第一項に規定する毒薬
- 1748 ニ 第四十四条第二項に規定する劇薬
- 1749 四 一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、
- 1750 薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされて
- 1751 いるもの(要指導医薬品を除く。)をいう。

1752 (許可の基準)

1753 第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。

- 1754 一 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 1755 二 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬
- 1756 品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準
- 1757 に適合しないとき。
- 1758 三 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第
- 1759

十九条の二第二項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当するとき。

イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

ロ 第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

ニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

ホ 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

ト 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

(名称の使用制限)

第六条 医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。

(薬局の管理)

第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。

2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。

3 薬局の管理者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。

4 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(管理者の義務)

第八条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3 薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務及び薬局の管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

(薬局開設者の遵守事項)

第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。

一 薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項

1806 二 薬局における調剤並びに調剤された薬剤及び医薬品の販売又は授与の実施方法(その薬局においてその薬  
 1807 局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同  
 1808 じ。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する  
 1809 事項

1810 2 薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条  
 1811 第二項の規定により述べられた薬局の管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要  
 1812 があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理  
 1813 由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1814  
 1815 (薬局開設者の法令遵守体制)

1816 第九条の二 薬局開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務を適正に遂行することにより、  
 1817 薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措  
 1818 置を講じなければならない。

1819 一 薬局の管理に関する業務について、薬局の管理者が有する権限を明らかにすること。

1820 二 薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、  
 1821 当該薬局開設者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業員の業務の監督に係る体制その他の薬局開  
 1822 設者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

1823 三 前二号に掲げるもののほか、薬局開設者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の薬局  
 1824 開設者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

1825 2 薬局開設者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1826  
 1827 (調剤された薬剤の販売に従事する者)

1828 第九条の三 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋によ  
 1829 り調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

1830  
 1831 (調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)

1832  
 1833 第九条の四 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、  
 1834 当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売  
 1835 又は授与に従事する薬剤師に、対面(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする  
 1836 ことが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として  
 1837 厚生労働省令で定めるものを含む。)により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録  
 1838 (電子的方式、磁気的方式その他の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電  
 1839 子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第三十六条の十までにおいて同じ。)に記録されてい  
 1840 るときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用い  
 1841 て必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

1842 2 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、  
 1843 当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項  
 1844 を確認させなければならない。

1845 3 薬局開設者は、第一項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その  
 1846 他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は  
 1847 授与してはならない。

1848 4 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬  
 1849 剤を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局開設者から当該薬剤を購入し、若しくは譲り受けた  
 1850 者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に  
 1851 従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

- 1852 5 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤さ  
 1853 れた薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めると  
 1854 ころにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り  
 1855 受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は  
 1856 譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。  
 1857 6 薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に第一項又は前二項に規定する情報  
 1858 の提供及び指導を行わせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬剤師にその内容を記録させな  
 1859 なければならない。

1860  
 1861 (薬局における掲示)

1862 第九条の五 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつ  
 1863 て厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。

1864  
 1865 (製造販売業の許可)

1866  
 1867 第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は  
 1868 化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業と  
 1869 して、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の種類	許可の種類
第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品	第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品	第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品	医薬部外品製造販売業許可
化粧品	化粧品製造販売業許可

- 1870 2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した  
 1871 申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。  
 1872 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
 1873 二 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名  
 1874 三 第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者の氏名  
 1875 四 次条第二項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項  
 1876 3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。  
 1877 一 法人にあつては、その組織図  
 1878 二 次条第一項第一号に規定する申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に係る体制に関する書  
 1879 類  
 1880 三 次条第一項第二号に規定する申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理に係る体制  
 1881 に関する書類  
 1882 四 その他厚生労働省令で定める書類  
 1883 4 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつ  
 1884 て、その効力を失う。

1885  
 1886 (製造業の許可)

1887 第十三条 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、  
 1888 医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。

- 1889 2 前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。  
 1890 3 第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載し

1891 た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1892 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

1893 二 その製造所の構造設備の概要

1894 三 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

1895 四 医薬品の製造業の許可を受けようとする者にあつては、第十七条第六項に規定する医薬品製造管理者の氏  
1896 名

1897 五 医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けようとする者にあつては、第十七条第十一項に規定する医薬  
1898 部外品等責任技術者の氏名

1899 六 第六項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項

1900 4 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつ  
1901 て、その効力を失う。

1902 5 その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことが  
1903 できる。

1904 6 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。

1905 7 厚生労働大臣は、第一項の許可又は第四項の許可の更新の申請を受けたときは、第五項の厚生労働省令で定  
1906 める基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。

1907 8 第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働  
1908 大臣の許可を受けなければならない。

1909 9 前項の許可については、第一項から第七項までの規定を準用する。

1910  
1911 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)

1912 第十四条 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定  
1913 めて指定する医薬部外品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする  
1914 者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

1915 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。

1916 一 申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。

1917 二 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目に  
1918 ついて製造ができる区分に係るものに限る。)、第十三条の三第一項の認定(申請をした品目について製造がで  
1919 きる区分に係るものに限る。)又は第十三条の二の二第一項若しくは前条第一項の登録を受けていないとき。

1920 三 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の  
1921 品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。

1922 イ 申請に係る医薬品又は医薬部外品が、その申請に係る効能又は効果を有すると認められないとき。

1923 ロ 申請に係る医薬品又は医薬部外品が、その効能又は効果に比して著しく有害な作用を有することにより、  
1924 医薬品又は医薬部外品として使用価値がないと認められるとき。

1925 ハ イ又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当なものとして厚生労働省令  
1926 で定める場合に該当するとき。

1927 四 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製  
1928 造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。

1929 3 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に  
1930 関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品が厚  
1931 生労働省令で定める医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作  
1932 成されたものでなければならない。

1933 4 第一項の承認の申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原  
1934 簿に収められている原薬等(原薬たる医薬品その他厚生労働省令で定める物をいう。以下同じ。)を原料又は材料  
1935 として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところによ  
1936 り、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規

1937 定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。

1938 5 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が、希少疾病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬品  
1939 その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であつて、当該医薬品の有効性及び安全性  
1940 を検証するための十分な人数を対象とする臨床試験の実施が困難であるときその他の厚生労働省令で定めると  
1941 きは、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により添付するものとされた臨床試験の試験成績に  
1942 関する資料の一部の添付を要しないこととすることができる。

1943 6 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づ  
1944 き、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査(既にこの条又は第十九条の二の承認を与えられている品  
1945 目との成分、分量、用法、用量、効能、効果等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合に  
1946 において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係  
1947 る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。

1948 7 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品又は化  
1949 粧品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号  
1950 に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及  
1951 び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は  
1952 実地の調査を受けなければならない。

1953 8 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造する製造所が、当該承認に  
1954 係る品目の製造工程と同一の製造工程の区分(医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質、有効性及び安全性の確保  
1955 の観点から厚生労働省令で定める区分をいう。次条において同じ。)に属する製造工程について同条第三項の基  
1956 準確認証の交付を受けているときは、当該製造工程に係る当該製造所における前項の調査を受けることを要し  
1957 ない。

1958 9 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の特性その他  
1959 を勘案して必要があると認めるときは、当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所における製造管理又は品  
1960 質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面に  
1961 よる調査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、第一項の承認を受けた者は、当該調査を受け  
1962 なければならない。

1963 10 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が、希少疾病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬  
1964 品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品についての第二項第三号  
1965 の規定による審査又は第七項若しくは前項の規定による調査を、他の医薬品の審査又は調査に優先して行うこ  
1966 とができる。

1967 11 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品  
1968 が、既にこの条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品、医薬部外品又は化粧品と有効成分、分量、用  
1969 法、用量、効能、効果等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の  
1970 意見を聴かななければならない。

1971 12 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に関し、第五項の規定に基づき臨床試験の試験成績に関する資料の  
1972 一部の添付を要しないこととした医薬品について第一項の承認をする場合には、当該医薬品の使用の成績に関  
1973 する調査の実施、適正な使用の確保のために必要な措置の実施その他の条件を付してするものとし、当該条件  
1974 を付した同項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該条件に基づき収集され、かつ、作  
1975 成された当該医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料を厚生労働大臣に提出し、当該医薬品の品質、有  
1976 効性及び安全性に関する調査を受けなければならない。この場合において、当該条件を付した同項の承認に係  
1977 る医薬品が厚生労働省令で定める医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集  
1978 され、かつ、作成されたものでなければならない。

1979 13 厚生労働大臣は、前項前段に規定する医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出があつたとき  
1980 は、当該資料に基づき、同項前段に規定する調査(当該医薬品が同項後段の厚生労働省令で定める医薬品である  
1981 ときは、当該資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査及び同項前  
1982 段に規定する調査)を行うものとし、当該調査の結果を踏まえ、同項前段の規定により付した条件を変更し、又

1983 は当該承認を受けた者に対して、当該医薬品の使用の成績に関する調査及び適正な使用の確保のために必要な  
 1984 措置の再度の実施を命ずることができる。

1985 14 第十二項の規定により条件を付した第一項の承認を受けた者、第十二項後段に規定する資料の収集若しくは  
 1986 は作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関し  
 1987 その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。

1988 15 第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が  
 1989 厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなけれ  
 1990 ばならない。この場合においては、第二項から第七項まで及び第十項から前項までの規定を準用する。

1991 16 第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めると  
 1992 ころにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

1993 17 第一項及び第十五項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。

1994  
 1995 (製造販売の届出)

1996 第十四条の九 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品  
 1997 及び化粧品以外の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、  
 1998 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

1999 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日  
 2000 以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

2001  
 2002 (外国製造医薬品等の製造販売の承認)

2003 第十九条の二 厚生労働大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品であつて本邦に輸出  
 2004 されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の  
 2005 規定により選任した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を  
 2006 与えることができる。

2007 2 申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの  
 2008 日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。

2009 3 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品による  
 2010 保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置をとらせるため、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者  
 2011 (当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しな  
 2012 ければならない。

2013 4 第一項の承認を受けた者(以下「外国製造医薬品等特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した医  
 2014 薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者(以下「選任外国製造医薬品等製造販売業者」という。)は、第十四  
 2015 条第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。

2016 5 第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十七項まで並びに第十四条の二  
 2017 の二の規定を準用する。

2018 6 前項において準用する第十四条第十五項の承認については、同条第十七項及び第十四条の二の二の規定を準  
 2019 用する。

2020  
 2021 (医薬品の販売業の許可)

2022 第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、  
 2023 又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただ  
 2024 し、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製  
 2025 造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、  
 2026 それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでな  
 2027 い。

2028 2 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074

(医薬品の販売業の許可の種類)

第二十五条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

- 一 店舗販売業の許可 要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
- 二 配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
- 三 卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務

(店舗販売業の許可)

第二十六条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第四項において同じ。)が与える。

2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 その店舗の名称及び所在地
- 三 その店舗の構造設備の概要
- 四 その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
- 五 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 六 第五項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

- 一 その店舗の平面図
- 二 第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
- 三 第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
- 四 その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
- 五 その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
- 六 その他厚生労働省令で定める書類

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。

- 一 その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 二 薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。

5 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。

(店舗販売品目)

第二十七条 店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(店舗の管理)



第二十八条 店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。

2 前項の規定により店舗を実地に管理する者(以下「店舗管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない。

3 店舗管理者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。

4 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(店舗管理者の義務)

第二十九条 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3 店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務及び店舗管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

(店舗販売業者の遵守事項)

第二十九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。

一 店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項

二 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項

2 店舗販売業者は、第二十八条第一項の規定により店舗管理者を指定したときは、前条第二項の規定により述べられた店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

(店舗販売業者の法令遵守体制)

第二十九条の三 店舗販売業者は、店舗の管理に関する業務その他の店舗販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 店舗の管理に関する業務について、店舗管理者が有する権限を明らかにすること。

二 店舗の管理に関する業務その他の店舗販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該店舗販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の店舗販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

三 前二号に掲げるもののほか、店舗販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の店舗販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

2 店舗販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

(店舗における掲示)

第二十九条の四 店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2131  
2132  
2133  
2134  
2135  
2136  
2137  
2138  
2139  
2140  
2141  
2142  
2143  
2144  
2145  
2146  
2147  
2148  
2149  
2150  
2151  
2152  
2153  
2154  
2155  
2156  
2157  
2158  
2159  
2160  
2161  
2162  
2163  
2164  
2165  
2166

(配置販売業の許可)

第三十条 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。

2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を配置しようとする区域をその区域に含む都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制の概要

三 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

四 第三十一条の二第二項に規定する区域管理者の氏名

五 第四項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項

3 薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。

4 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。

(配置販売品目)

第三十一条 配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、一般用医薬品のうち経年変化が起りにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(都道府県ごとの区域の管理)

第三十一条の二 配置販売業者は、その業務に係る都道府県の区域を、自ら管理し、又は当該都道府県の区域内において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない。

2 前項の規定により都道府県の区域を管理する者(以下「区域管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない。

3 区域管理者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。

(区域管理者の義務)

第三十一条の三 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その区域の業務につき、配置販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3 区域管理者が行う区域の管理に関する業務及び区域管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

(配置販売業者の遵守事項)

第三十一条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、配置販売の業務に関する記録方法その他配置販売の業務に関し配置販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。

2 配置販売業者は、第三十一条の二第一項の規定により区域管理者を指定したときは、前条第二項の規定により述べられた区域管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

2167  
2168  
2169  
2170  
2171  
2172  
2173  
2174  
2175  
2176  
2177  
2178  
2179  
2180  
2181  
2182  
2183  
2184  
2185  
2186  
2187  
2188  
2189  
2190  
2191  
2192  
2193  
2194  
2195  
2196  
2197  
2198  
2199  
2200  
2201  
2202  
2203  
2204  
2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212

(配置販売業者の法令遵守体制)

第三十一条の五 配置販売業者は、区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

- 一 区域の管理に関する業務について、区域管理者が有する権限を明らかにすること。
- 二 区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の配置販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
- 三 前二号に掲げるもののほか、配置販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の配置販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

2 配置販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

(配置従事の届出)

第三十二条 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。

(配置従事者の身分証明書)

第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。

2 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(薬局医薬品の販売に従事する者等)

第三十六条の三 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

2 薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等)

第三十六条の四 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たっては、当該薬剤師に、あらかじめ、薬局医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

3 薬局開設者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他薬局医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。

4 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購

入され、若しくは譲り受けられた薬局医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

5 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、その販売し、又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

(要指導医薬品の販売に従事する者等)

第三十六条の五 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

(要指導医薬品に関する情報提供及び指導等)

第三十六条の六 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、要指導医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2 薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たっては、当該薬剤師に、あらかじめ、要指導医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

3 薬局開設者又は店舗販売業者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。

4 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた要指導医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

(一般用医薬品の区分)

第三十六条の七 一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。

一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度 of 健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十一項に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

二 第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度 of 健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの

三 第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品

2259 2 厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。

2260  
2261 3 厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

2262  
2263  
2264 (資質の確認)

2265 第三十六条の八 都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。

2266  
2267 2 前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。

2268  
2269  
2270 3 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条中「許可を与えないことができる」とあるのは、「登録を受けることができない」と読み替えるものとする。

2271  
2272 4 第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2273  
2274 (一般用医薬品の販売に従事する者)

2275 第三十六条の九 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。

2276  
2277 一 第一類医薬品 薬剤師

2278 二 第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者

2279  
2280 (一般用医薬品に関する情報提供等)

2281 第三十六条の十 薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品の適正な使用のため、第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2282  
2283  
2284 2 薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たっては、当該薬剤師に、あらかじめ、第一類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

2285  
2286  
2287  
2288  
2289 3 薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品の適正な使用のため、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2290  
2291  
2292  
2293 4 薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たっては、当該薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければならない。

2294  
2295  
2296  
2297  
2298  
2299 5 薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。

2300  
2301 6 第一項の規定は、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る。)には、適用しない。

2302  
2303  
2304 7 配置販売業者については、前各項(第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一項本文及び第三項本文中「販売し、又は授与する場合」とあるのは「配置する場合」と、「薬局

又は店舗」とあるのは「業務に係る都道府県の区域」と、「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第五項中「その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した一般用医薬品を使用する者」と、「薬局又は店舗」とあるのは「業務に係る都道府県の区域」と、「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と読み替えるものとする。

(販売方法等の制限)

第三十七条 薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

2 配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包(内袋を含まない。第五十四条及び第五十七条第一項を除き、以下同じ。)を開き、その医薬品を分割販売してはならない。

(準用)

第三十八条 店舗販売業については、第十条及び第十一条の規定を準用する。

2 配置販売業及び卸売販売業については、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。

(日本薬局方等)

第四十一条 厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。

2 厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。

3 厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。

(医薬品等の基準)

第四十二条 厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。

2 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる。

(表示)

第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

3 前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(開封販売等の制限)

第四十五条 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外

2351 の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は  
 2352 販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

2353  
 2354 (譲渡手続)

2355 第四十六条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬  
 2356 局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月  
 2357 日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付  
 2358 を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない。

2359 2 薬剤師等に対して、その身分に関する公務所の証明書の提示を受けて毒薬又は劇薬を販売し、又は授与する  
 2360 ときは、前項の規定を適用しない。薬剤師等であつて常時取引関係を有するものに販売し、又は授与するとき  
 2361 も、同様とする。

2362 3 第一項の薬局開設者等は、同項の規定による文書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の  
 2363 承諾を得て、当該文書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を  
 2364 利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該  
 2365 薬局開設者等は、当該文書の交付を受けたものとみなす。

2366 4 第一項の文書及び前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方  
 2367 式、磁気的方式その他の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機に  
 2368 よる情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた薬  
 2369 局開設者等において、当該毒薬又は劇薬の譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

2370  
 2371 (交付の制限)

2372 第四十七条 毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる  
 2373 者には、交付してはならない。

2374  
 2375 (貯蔵及び陳列)

2376 第四十八条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならな  
 2377 い。

2378 2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。

2379  
 2380 (直接の容器等の記載事項)

2381 第五十条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただ  
 2382 し、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2383 一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所

2384 二 名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品  
 2385 で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)

2386 三 製造番号又は製造記号

2387 四 重量、容量又は個数等の内容量

2388 五 日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方において直接の容器  
 2389 又は直接の被包に記載するように定められた事項

2390 六 要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項

2391 七 一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項

2392 八 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において直  
 2393 接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項

2394 九 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他その基準  
 2395 において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項

2396 十 日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、

その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)

十一 習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意—習慣性あり」の文字

十二 前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意—医師等の処方箋により使用すること」の文字

十三 厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意—人体に使用しないこと」の文字

十四 厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限

十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

第五十一条 医薬品の直接の容器又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器又は直接の被包に記載された第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号に規定する事項が外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。

(容器等への符号等の記載)

第五十二条 医薬品(次項に規定する医薬品を除く。)は、その容器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより、第六十八条の二第一項の規定により公表された同条第二項に規定する注意事項等情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2 要指導医薬品、一般用医薬品その他の厚生労働省令で定める医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

一 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意

二 日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項

三 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において当該体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項

四 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(記載方法)

第五十三条 第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条までに規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならない。かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。

(記載禁止事項)

第五十四条 医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されてはならない。

一 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項

二 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けていない効能、効果又は性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。)

三 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間



2443 (販売、授与等の禁止)

2444 第五十五条 第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三又は第六十八条の二の四第二  
 2445 項の規定に違反する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはな  
 2446 らない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2447 2 第十三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受  
 2448 けていない製造所(外国にある製造所に限る。))において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第八項若し  
 2449 くは第二十三条の二の三第一項の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第十五項(第十  
 2450 九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第  
 2451 十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第  
 2452 二十三条の二の二十三第一項若しくは第七項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同  
 2453 様とする。

2454  
 2455 (模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止)

2456 第五十五条の二 模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、  
 2457 若しくは陳列してはならない。

2458  
 2459 (販売、製造等の禁止)

2460 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、  
 2461 輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

- 2462 一 日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しない  
 2463 もの
- 2464 二 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品であつて、その性状、品質又は性  
 2465 能がその基準に適合しないもの
- 2466 三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は  
 2467 第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のも  
 2468 の)にあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容と異なるもの  
 2469 (第十四条第十六項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十六項(第二  
 2470 十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。))又は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反し  
 2471 ていないものを除く。)
- 2472 四 第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品  
 2473 であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のもの)にあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若し  
 2474 くは性能がその基準に適合しないもの
- 2475 五 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準に適合しないもの
- 2476 六 その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っている医薬品
- 2477 七 異物が混入し、又は付着している医薬品
- 2478 八 病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
- 2479 九 着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品

2480  
 2481 (輸入の確認)

2482 第五十六条の二 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは  
 2483 第二十三条の二の二十三の認証を受けないで、又は第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二の届出をしな  
 2484 いで、医薬品を輸入しようとする者(以下この条において「申請者」という。))は、厚生労働省令で定める事項を  
 2485 記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出し、その輸入についての  
 2486 厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

2487 2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の確認をしない。

- 2488 一 個人的使用に供せられ、かつ、売買の対象とならないと認められる程度の数量を超える数量の医薬品の輸

2489 入をする場合その他の申請者が販売又は授与の目的で輸入するおそれがある場合として厚生労働省令で定め  
 2490 る場合

2491 二 申請者又は申請者に代わつて前項の確認の申請に関する手続をする者がこの法律、麻薬及び向精神薬取締  
 2492 法、毒物及び劇物取締法その他第五条第三号二に規定する薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに  
 2493 基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない場合その他の輸入が不相当と認め  
 2494 られる場合として厚生労働省令で定める場合

2495 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の規定による厚生労働大臣の確  
 2496 認を受けることを要しない。

2497 一 覚醒剤取締法第三十条の六第一項ただし書又は麻薬及び向精神薬取締法第十三条第一項ただし書に規定す  
 2498 る場合

2499 二 第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣が定める医薬品で、厚生労働省令で定  
 2500 める数量以下のものを自ら使用する目的で輸入する場合その他のこれらの場合に準ずる場合として厚生労働  
 2501 省令で定める場合

2502  
 2503 第五十七条 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなつているためにその医薬品を保  
 2504 健衛生上危険なものにするおそれがある物とともに、又はこれと同様のおそれがある容器若しくは被包(内袋を  
 2505 含む。)に収められてはならず、また、医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいも  
 2506 のであつてはならない。

2507 2 前項の規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若  
 2508 しくは陳列してはならない。

2509  
 2510 (陳列等)

2511 第五十七条の二 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければ  
 2512 ならない。

2513 2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と  
 2514 されているものを除く。)を陳列する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これらを区別して陳列し  
 2515 なければならない。

2516 3 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合には、厚生労働省令で定めると  
 2517 ころにより、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品の区分ごとに、陳列しなければならない。

2518  
 2519 (封)

2520 第五十八条 医薬品の製造販売業者は、医薬品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、医  
 2521 薬品を収めた容器又は被包に封を施さなければならない。ただし、医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売  
 2522 し、又は授与するときは、この限りでない。

2523  
 2524 (直接の容器等の記載事項)

2525 第五十九条 医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない  
 2526 い。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2527 一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所

2528 二 「医薬部外品」の文字

2529 三 第二条第二項第二号又は第三号に規定する医薬部外品にあつては、それぞれ厚生労働省令で定める文字

2530 四 名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)

2531 五 製造番号又は製造記号

2532 六 重量、容量又は個数等の内容量

2533 七 厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあつては、有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その  
 2534 一般的名称)及びその分量

八 厚生労働大臣の指定する成分を含有する医薬部外品にあつては、その成分の名称

九 第二条第二項第二号に規定する医薬部外品のうち厚生労働大臣が指定するものにあつては、「注意—人体に使用しないこと」の文字

十 厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあつては、その使用の期限

十一 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医薬部外品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項

十二 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(準用)

第六十条 医薬部外品については、第五十一条、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、第五十二条第二項第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号中「第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三又は第六十八条の二の四第二項」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」と、「第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、第五十六条第三号中「第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた医薬部外品」と、「品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若しくは品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十六項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。))又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。))」と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(直接の容器等の記載事項)

第六十一条 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所

二 名称

三 製造番号又は製造記号

四 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称

五 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限

六 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2581  
2582  
2583  
2584  
2585  
2586  
2587  
2588  
2589  
2590  
2591  
2592  
2593  
2594  
2595  
2596  
2597  
2598  
2599  
2600  
2601  
2602  
2603  
2604  
2605  
2606  
2607  
2608  
2609  
2610  
2611  
2612  
2613  
2614  
2615  
2616  
2617  
2618  
2619  
2620  
2621  
2622  
2623  
2624  
2625  
2626

(準用)

第六十二条 化粧品については、第五十一条、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、第五十二条第二項第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三又は第六十八条の二の四第二項」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた化粧品」と、「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若しくは品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十六項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。))又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。))」と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して墮胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

(注意事項等情報の公表)

2627 第六十八条の二 医薬品(第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以下この条及び次条  
 2628 において同じ。)、医療機器(第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。以下この  
 2629 条及び次条において同じ。)又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製  
 2630 造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する  
 2631 最新の論文その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報について、電子情報処理組織を使用する方法  
 2632 その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定め  
 2633 をしたときは、この限りでない。

2634 2 前項の注意事項等情報とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をいう。

2635 一 医薬品 次のイからホまでに掲げる事項

2636 イ 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意

2637 ロ 日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において当該医薬品の品質、有効性及び安  
 2638 全性に関連する事項として公表するように定められた事項

2639 ハ 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において  
 2640 当該体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

2641 ニ 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において当該医薬品  
 2642 の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

2643 ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2644 二 医療機器 次のイからホまでに掲げる事項

2645 イ 使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意

2646 ロ 厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項

2647 ハ 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療  
 2648 機器の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

2649 ニ 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療  
 2650 機器の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

2651 ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2652 三 再生医療等製品 次のイからホまでに掲げる事項

2653 イ 用法、用量、使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意

2654 ロ 再生医療等製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項

2655 ハ 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において当  
 2656 該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

2657 ニ 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において当  
 2658 該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

2659 ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2660

2661 (注意事項等情報の提供を行うために必要な体制の整備)

2662 第六十八条の二の二 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところに  
 2663 より、当該医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は医療機器プ  
 2664 ログラムを電気通信回線を通じて提供を受けようとする者に対し、前条第二項に規定する注意事項等情報の提  
 2665 供を行うために必要な体制を整備しなければならない。

2666

2667 (注意事項等情報の届出等)

2668 第六十八条の二の三 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品  
 2669 若しくは医療機器又は再生医療等製品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところに  
 2670 より、当該医薬品の第五十二条第二項各号に掲げる事項若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事項、  
 2671 当該医療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若しくは第六十八条の二第二項第二号に定める事項又  
 2672 は当該再生医療等製品の同項第三号に定める事項のうち、使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該医薬品の第五十二条第二項各号に掲げる事項若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事項、当該医療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若しくは第六十八条の二第二項第二号に定める事項又は当該再生医療等製品の同項第三号に定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

(機構による注意事項等情報の届出の受理)

第六十八条の二の四 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次項において同じ。)若しくは医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。同項において同じ。)であつて前条第一項の厚生労働大臣が指定するもの又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次項において同じ。)についての前条第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。

2 厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとしたときは、医薬品若しくは医療機器であつて前条第一項の厚生労働大臣が指定するもの又は再生医療等製品についての同項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に行わなければならない。

3 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。

(情報の提供等)

第六十八条の二の五 医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等(医療機器の販売業者又は貸与業者のうち、薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは貸与業者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬局開設者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を貸与するものをいう。次項において同じ。)、再生医療等製品卸売販売業者(再生医療等製品の販売業者のうち、再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、再生医療等製品を販売し、又は授与するものをいう。同項において同じ。)又は外国製造医薬品等特例承認取得者、外国製造医療機器等特例承認取得者若しくは外国製造再生医療等製品特例承認取得者(以下「外国特例承認取得者」と総称する。)は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報(第六十八条の二第二項第二号口の規定による指定がされた医療機器の保守点検に関する情報を含む。次項において同じ。)を収集し、及び検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならない。

2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者又は医学医術に関する学術団体、大学、研究機関その他の厚生労働省令で定める者は、医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等、再生医療等製品卸売販売業者又は外国特例承認取得者が行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければならない。

3 薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により提供される情報の活用(第六十八条の二第二項第二号口の規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならない。

(医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発)

2719 第六十八条の三 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬  
 2720 品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。

2721  
 2722 (危害の防止)

2723 第六十八条の九 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承  
 2724 認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認  
 2725 を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用によつて保健衛生上の危害が発生  
 2726 し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提  
 2727 供その他必要な措置を講じなければならない。

2728 2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業  
 2729 者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、  
 2730 獣医師その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製  
 2731 品の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。

2732  
 2733 (副作用等の報告)

2734 第六十八条の十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承  
 2735 認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認  
 2736 を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由  
 2737 によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他  
 2738 の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令  
 2739 で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。

2740  
 2741 2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣  
 2742 医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由に  
 2743 よるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に  
 2744 関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるとき  
 2745 は、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2746 3 機構は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規  
 2747 定する副作用救済給付又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあつた者に係る疾病、障害及び死亡  
 2748 に係る情報の整理又は当該疾病、障害及び死亡に関する調査を行い、厚生労働省令で定めるところにより、その  
 2749 結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2750  
 2751 (立入検査等)

2752 第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品  
 2753 の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二  
 2754 十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の  
 2755 委託を受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下この項において「製造販売業者等」という。))が、  
 2756 第十二条の二、第十三条第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第  
 2757 十三条の二の二第五項、第十四条第二項、第十五項若しくは第十六項、第十四条の三第二項、第十四条の九、第  
 2758 十七条、第十八条第一項から第四項まで、第十八条の二、第十九条、第二十三条、第二十三条の二の二、第二十  
 2759 三条の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項、第十五項若しくは第十六項、第二十三条の二の八第二項、第  
 2760 二十三条の二の十二、第二十三条の二の十四(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の  
 2761 十五第一項から第四項まで(これらの規定を第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十  
 2762 五の二(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六(第四十条の三において準用する  
 2763 場合を含む。)、第二十三条の二の二十二(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一、  
 2764 第二十三条の二十二第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十

2765 三条の二十五第二項、第十一項若しくは第十二項、第二十三条の二十八第二項、第二十三条の三十四、第二十三  
2766 条の三十五第一項から第四項まで、第二十三条の三十五の二、第二十三条の三十六、第二十三条の四十二、第四  
2767 十条の二第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第四十条の四、第  
2768 四十六条第一項若しくは第四項、第五十八条、第六十八条の二の五第一項若しくは第二項、第六十八条の五第一  
2769 項若しくは第四項から第六項まで、第六十八条の七第一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条の九、第  
2770 六十八条の十第一項、第六十八条の十一、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十六、第六十八条の二十二第  
2771 一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条の二十四第一項、第八十条第一項から第三項まで若しくは第  
2772 七項、第八十条の八若しくは第八十条の九第一項の規定又は第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第  
2773 七十二條の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に基づく命  
2774 令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生  
2775 労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が  
2776 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設  
2777 備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

2778 2 都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除  
2779 く。))の販売業若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗又は営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別  
2780 区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、  
2781 第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十二条の五、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十  
2782 六条の三の二及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若し  
2783 くは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者(以下この項  
2784 において「販売業者等」という。)が、第五条、第七条第一項、第二項、第三項(第四十条第一項及び第四十条の  
2785 七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第八条(第四十条第一項及び第四十条の七第一項にお  
2786 いて準用する場合を含む。)、第九条第一項(第四十条第一項、第二項及び第三項並びに第四十条の七第一項にお  
2787 いて準用する場合を含む。)若しくは第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含  
2788 む。)、第九条の二(第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九  
2789 条の三から第九条の五まで、第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項  
2790 において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条  
2791 (第三十八条、第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項若し  
2792 くは第五項、第二十七条から第二十九条の四まで、第三十条第三項若しくは第四項、第三十一条から第三十三条  
2793 まで、第三十四条第三項から第五項まで、第三十五条から第三十六条の六まで、第三十六条の九から第三十七条  
2794 まで、第三十九条第四項若しくは第五項、第三十九条の二、第三十九条の三第二項、第四十条の四、第四十条の  
2795 五第四項、第五項若しくは第七項、第四十条の六、第四十五条、第四十六条第一項若しくは第四項、第四十九条、  
2796 第五十七条の二(第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条の二の五、第六十八条の五第三項、  
2797 第五項若しくは第六項、第六十八条の七第二項、第五項若しくは第八項、第六十八条の九第二項、第六十八条の  
2798 十第二項、第六十八条の二十二第二項、第五項若しくは第八項若しくは第八十条第七項の規定又は第七十二条  
2799 第四項、第七十二条の二第一項若しくは第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十四  
2800 条若しくは第七十五条第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき  
2801 は、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、  
2802 店舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち  
2803 入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる  
2804 ことができる。

2805 3 都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは第七十二条の三に基づく  
2806 命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき、又は地域連携薬局若しくは専門医療  
2807 機関連携薬局(以下この章において「地域連携薬局等」という。)の開設者が第六条の二第三項若しくは第六条の  
2808 三第三項若しくは第四項の規定若しくは第七十二条第五項若しくは第七十二条の二第三項に基づく命令を遵守  
2809 しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者若しくは当該地域連携薬局等  
2810 の開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局若しくは地域



2811 連携薬局等に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

2812  
2813 4 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医薬品、医薬部外品、化粧品、  
2814 医療機器又は再生医療等製品を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は第五十六条の二第一項に規定する  
2815 確認の手續に係る関係者が、同条(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合  
2816 を含む。)の規定又は第七十条第二項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認め  
2817 るときは、当該者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、当該者  
2818 の試験研究機関、医療機関、事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員そ  
2819 の他の関係者に質問させ、若しくは同条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最  
2820 少分量に限り、収去させることができる。

2821 5 厚生労働大臣は、第七十五条の五の二第一項の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、同項  
2822 に規定する課徴金対象行為者又は同項に規定する課徴金対象行為に関して関係のある者に対し、その業務若し  
2823 くは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該課徴金対象  
2824 行為者若しくは当該課徴金対象行為に関して関係のある者の事務所、事業所その他当該課徴金対象行為に関係  
2825 のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該課徴金対象行為者その他の関係者に  
2826 質問させることができる。

2827 6 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前各項に定めるもののほか必  
2828 要があると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、  
2829 化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業者若  
2830 しくは修理業者、第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは  
2831 再生医療等製品を業務上取り扱う者又は第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五  
2832 第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者  
2833 に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育  
2834 動物診療施設、工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業  
2835 務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係  
2836 者に質問させ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量  
2837 に限り、収去させることができる。

2838 7 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録認証機関に対して、基準適合性認証の業  
2839 務又は経理の状況に関し、報告をさせ、又は当該職員に、登録認証機関の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の  
2840 物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2841 8 当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、  
2842 関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2843 9 第一項から第七項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

2844  
2845 (緊急命令)

2846 第六十九条の三 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品による保健衛生上  
2847 の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若し  
2848 くは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業者若しくは修理業者、第十  
2849 八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の  
2850 七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者、第八十条の六第一項の登録を受けた者又は薬  
2851 局開設者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の販売若しくは授与、医療  
2852 機器の貸与若しくは修理又は医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供を一時停止することその他保健  
2853 衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

2854  
2855 (廃棄等)

2856 第七十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務

上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品若しくは再生医療等製品、同項の規定に違反して販売され、若しくは授与された医薬品若しくは再生医療等製品、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して販売され、貸与され、若しくは授与された医療機器、同項の規定に違反して電気通信回線を通じて提供された医療機器プログラム、第四十四条第三項、第五十五条(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十五条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の五若しくは第六十八条の二十に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品、第二十三条の四の規定により基準適合性認証を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十四条の二第一項若しくは第三項第三号(第七十五条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号(第七十五条の二の二第二項において準用する場合を含む。))の規定により第十四条若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、医薬部外品若しくは化粧品、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品、第七十五条の三の規定により第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。))の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。))の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。))の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、第五十六条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。))の規定に違反して医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を輸入しようとする者又は輸入した者に対して、その医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の廃棄その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。

3 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前二項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、前二項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。

4 当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第八項の規定を準用する。

#### (改善命令等)

第七十二条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者に対して、その品質管理又は製造販売後安全管理の方法(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その製造管理若しくは品質管理に係る業務を行う体制又はその製造販売後安全管理の方法。以下この項において同じ。))が第十二条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十三条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第二十三条の二十一第一項第一号若しくは第二号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しない場合においては、その品質管理若しくは製造販売後安全管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下「選任製造販売業者」と総称する。))を除く。以下この項において同じ。))又は第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者に対して、その物の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その物の製造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ。))が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号若しくは第八十条第二項に規定する厚生労

2903 働省令で定める基準に適合せず、又はその製造管理若しくは品質管理の方法によつて医薬品、医薬部外品、化粧  
 2904 品、医療機器若しくは再生医療等製品が第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、  
 2905 第六十五条若しくは第六十五条の五に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品  
 2906 若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その  
 2907 製造管理若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の  
 2908 停止を命ずることができる。

2909 3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医  
 2910 療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者に対して、その構造設備が、第十三条第五項、第二十三条の二十二  
 2911 第五項若しくは第四十条の二第五項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備  
 2912 によつて医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品が第五十六条(第六十条及び第六十二  
 2913 条において準用する場合を含む。)、第六十五条若しくは第六十五条の五に規定する医薬品、医薬部外品、化粧  
 2914 品、医療機器若しくは再生医療等製品若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当するようにな  
 2915 るおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若  
 2916 しくは一部を使用することを禁止することができる。

2917 4 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機  
 2918 器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第五条第一号、第二  
 2919 十六条第四項第一号、第三十四条第三項、第三十九条第四項、第三十九条の三第二項若しくは第四十条の五第四  
 2920 項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品、医療機器若しく  
 2921 は再生医療等製品が第五十六条、第六十五条若しくは第六十五条の五に規定する医薬品、医療機器若しくは再  
 2922 生医療等製品若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合にお  
 2923 いては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用するこ  
 2924 とを禁止することができる。

2925 5 都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その構造設備が第六条の二第一項第一号又は第六条の  
 2926 三第一項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しない場合においては、その構造設備の改善  
 2927 を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。

2928  
 2929 第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又  
 2930 は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなった場合においては、当  
 2931 該基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命ずることができる。

2932 2 都道府県知事は、配置販売業者に対して、その都道府県の区域における業務を行う体制が、第三十条第三項の  
 2933 規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなった場合においては、当該基準に適合するようにその  
 2934 業務を行う体制を整備することを命ずることができる。

2935 3 都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その地域連携薬局等が第六条の二第一項各号(第一号を  
 2936 除く。)又は第六条の三第一項各号(第一号を除く。)に掲げる要件を欠くに至ったときは、当該要件に適合するよ  
 2937 うにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。

2938  
 2939 第七十二条の二の二 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販  
 2940 売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者に対して、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、  
 2941 第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品  
 2942 の販売業者に対して、その者の第九条の二(第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用  
 2943 する場合を含む。)、第十八条の二、第二十三条の二の十五の二(第四十条の三において準用する場合を含む。)、  
 2944 第二十三条の三十五の二、第二十九条の三、第三十一条の五又は第三十六条の二の二の規定による措置が不十  
 2945 分であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2946  
 2947 第七十二条の三 都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又  
 2948 は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是

2949 正すべきことを命ずることができる。

2950  
2951 第七十二条の四 第七十二条から前条までに規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2958 2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者に第十四条第十二項、第二十三条の二の五第十二項、第二十三条の二十六第一項又は第七十九条第一項の規定により付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2965 (違反広告に係る措置命令等)

2966 第七十二条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足る措置をとるべきことを命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

2970 一 当該違反行為をした者

2971 二 当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

2972 三 当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

2973 四 当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者

2974 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反する広告(次条において「特定違法広告」という。)である特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。

2982 (損害賠償責任の制限)

2983 第七十二条の六 特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第四号に規定する発信者をいう。以下同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。

2990 (医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令)

2991 第七十三条 厚生労働大臣は、医薬品等総括製造販売責任者、医療機器等総括製造販売責任者若しくは再生医療等製品総括製造販売責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者若しくは再生医療等製品製造管理者又は医療機器修理責任技術者について、都道府県知事は、

2995 薬局の管理者又は店舗管理者、区域管理者若しくは医薬品営業所管理者、医療機器の販売業若しくは貸与業の  
 2996 管理者若しくは再生医療等製品営業所管理者について、その者にこの法律その他薬事に関する法令で政令で定  
 2997 めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者若しくは責任技術者と  
 2998 して不適当であると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業  
 2999 者に対して、その変更を命ずることができる。

3000  
 3001 (配置販売業の監督)

3002 第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又は  
 3003 これらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員によ  
 3004 る配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、  
 3005 期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

3006  
 3007 (承認の取消し等)

3008 第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認(第二十三条の  
 3009 二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機  
 3010 器又は再生医療等製品が第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十五項において準用する場合を含む。)、  
 3011 第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十  
 3012 三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第十一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する  
 3013 に至つたと認めるとき、又は第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十  
 3014 五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなく  
 3015 なつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十一項において準用する場合を含  
 3016 む。)若しくは第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第十一項にお  
 3017 いて準用する同条第二項第三号イ若しくは口のいずれかに該当するに至つたと認めるときは、薬事・食品衛生  
 3018 審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければならない。

3019 2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の第十四条、第二十三条の二の  
 3020 五又は第二十三条の二十五の承認を与えた事項の一部について、保健衛生上の必要があると認めるに至つたと  
 3021 きは、その変更を命ずることができる。

3022 3 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の  
 3023 第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場  
 3024 合には、その承認を取り消し、又はその承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができる。

3025 一 第十二条第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)、第二十三条の二第一項の許可(承  
 3026 認を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)又は第二十三条の二十第一項の許可について、第十二条第四項、  
 3027 第二十三条の二第四項若しくは第二十三条の二十四第四項の規定によりその効力が失われたとき、又は次条第  
 3028 一項の規定により取り消されたとき。

3029 二 第十四条第三項、第二十三条の二の五第三項又は第二十三条の二十五第三項に規定する申請書又は添付資  
 3030 料のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。

3031 三 第十四条第七項若しくは第九項、第二十三条の二の五第七項若しくは第九項又は第二十三条の二十五第六  
 3032 項若しくは第八項の規定に違反したとき。

3033 四 第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一  
 3034 項の規定により再審査若しくは再評価を受けなければならない場合又は第二十三条の二の九第一項の規定に  
 3035 より使用成績に関する評価を受けなければならない場合において、定められた期限までに必要な資料の全部  
 3036 若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料若しくは第十四条の四第五項後段、第十四条の六第四  
 3037 項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項の  
 3038 規定に適合しない資料を提出したとき。

3039 五 第七十二条第二項の規定による命令に従わなかつたとき。

3040 六 第十四条第十二項、第二十三条の二の五第十二項、第二十三条の二十六第一項又は第七十九条第一項の規

定により第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認に付された条件に違反したとき。

七 第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について正当な理由がなく引き続き三年間製造販売をしていないとき。

(許可の取消し等)

第七十五条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。))が第五条第三号若しくは第十二条の二第二項、第十三条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二第二項、第二十三条の二十一第二項、第二十三条の二十二第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十六条第五項、第三十条第四項、第三十四条第四項、第三十九条第五項、第四十条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。))若しくは第四十条の五第五項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。))の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3 第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 当該製造販売業者又は製造業者(血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する血液製剤をいう。以下この項において同じ。))の製造販売業者又は血液製剤若しくは原料血漿しょうじょう(同法第七条に規定する原料血漿しょうじょうをいう。第三号において同じ。))の製造業者に限る。))が、同法第二十七条第三項の勧告に従わなかつたとき。

二 採血事業者(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第二条第三項に規定する採血事業者をいう。次号において同じ。))以外の者が国内で採取した血液又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として血液製剤を製造したとき。

三 当該製造販売業者又は製造業者以外の者(血液製剤の製造販売業者又は血液製剤若しくは原料血漿しょうじょうの製造業者を除く。))が国内で採取した血液(採血事業者又は病院若しくは診療所の開設者が安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第十二条第一項第二号に掲げる物の原料とする目的で採取した血液を除く。))又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として医薬品(血液製剤を除く。)、医療機器又は再生医療等製品を製造したとき。

4 都道府県知事は、地域連携薬局の開設者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域連携薬局の認定を取り消すことができる。

一 地域連携薬局が、第六条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 地域連携薬局の開設者が、第六条の四第一項の規定又は同条第二項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。))の規定に該当するに至つたとき。

三 地域連携薬局の開設者が、第七十二条第五項又は第七十二条の二第三項の規定に基づく命令に違反したとき。

5 都道府県知事は、専門医療機関連携薬局の開設者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、専門医療機関連携薬局の認定を取り消すことができる。

一 専門医療機関連携薬局が、第六条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 専門医療機関連携薬局の開設者が、第六条の三第三項の規定に違反したとき。

3087 三 専門医療機関連携薬局の開設者が、第六条の四第一項の規定又は同条第二項において準用する第五条（第三  
 3088 号に係る部分に限る。）の規定に該当するに至ったとき。

3089 四 専門医療機関連携薬局の開設者が、第七十二条第五項又は第七十二条の二第三項の規定に基づく命令に違  
 3090 反したとき。

3091 （課徴金納付命令）

3092 第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為（以下「課徴金対象行為」という。）をした者（以下  
 3093 「課徴金対象行為者」という。）があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期  
 3094 間取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額（次条及び第七十五条の五の五第八項にお  
 3095 いて「対価合計額」という。）に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命  
 3096 じなければならない。

3097 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をやめた後そのやめた  
 3098 日から六月を経過する日（同日前に、課徴金対象行為者が、当該課徴金対象行為により当該医薬品等の名称、製  
 3099 造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置として厚生労働省令で定める  
 3100 措置をとったときは、その日）までの間に課徴金対象行為者が当該課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をした  
 3101 ときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が  
 3102 三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。

3103 3 第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、課徴金対象行為者に対して同項の課徴金  
 3104 を納付することを命じないことができる。

3105 一 第七十二条の四第一項又は第七十二条の五第一項の命令をする場合（保健衛生上の危害の発生又は拡大に  
 3106 与える影響が軽微であると認められる場合に限る。）

3107 二 第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の処分をする場合

3108 4 第一項の規定により計算した課徴金の額が二百二十五万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることが  
 3109 できない。

3111 （不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額）

3112 第七十五条の五の三 前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対  
 3113 象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）第八条第一項の規定による  
 3114 命令があるとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないものとされるときは、対価合計額に  
 3115 百分の三を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。

3117 （課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額）

3118 第七十五条の五の四 第七十五条の五の二第一項又は前条の場合において、厚生労働大臣は、課徴金対象行為者  
 3119 が課徴金対象行為に該当する事実を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告したときは、同項  
 3120 又は同条の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものと  
 3121 する。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為につい  
 3122 て同項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）があるべきことを予知してされたものであるとき  
 3123 は、この限りでない。

3125 （課徴金の納付義務等）

3126 第七十五条の五の五 課徴金納付命令を受けた者は、第七十五条の五の二第一項、第七十五条の五の三又は前条  
 3127 の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

3128 2 第七十五条の五の二第一項、第七十五条の五の三又は前条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の  
 3129 端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3130 3 課徴金対象行為者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴  
 3131 金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第七十五条の  
 3132 五の二からこの条までの規定を適用する。

4 課徴金対象行為者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等（第六十九条第五項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問をいう。以下この項において同じ。）が最初に行われた日（当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第七十五条の五の八第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。）以後においてその一若しくは二以上の子会社等（課徴金対象行為者の子会社若しくは親会社（会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。）又は当該課徴金対象行為者と親会社が同一である他の会社をいう。以下この項において同じ。）に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人（会社に限る。）が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等（以下この項において「特定事業承継子会社等」という。）がした課徴金対象行為とみなして、第七十五条の五の二からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第七十五条の五の二第一項中「当該課徴金対象行為者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等（第七十五条の五の五第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。）に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第七十五条の五の五第一項中「受けた者は、第七十五条の五の二第一項」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等（第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。）は、第七十五条の五の二第一項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して、同項」とする。

5 前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主（総社員を含む。以下この項において同じ。）の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。）の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

6 第三項及び第四項の場合において、第七十五条の五の二第二項及び第三項、第七十五条の五の三並びに前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

8 厚生労働大臣は、課徴金納付命令を受けた者に対し、当該課徴金対象行為について、不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項の規定による命令があつたとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないものとされたときは、当該課徴金納付命令に係る課徴金の額を、対価合計額に百分の三を乗じて得た額を第七十五条の五の二第一項の規定により計算した課徴金の額から控除した額（以下この項において「控除後の額」という。）（当該課徴金納付命令に係る課徴金の額が第七十五条の五の四の規定により計算したものであるときは、控除後の額に百分の五十を乗じて得た額を控除後の額から控除した額）に変更しなければならない。この場合において、変更後の課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

（課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与）

第七十五条の五の六 厚生労働大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

（薬事監視員）

第七十六条の三 第六十九条第一項から第六項まで、第七十条第三項、第七十六条の七第二項又は第七十六条の八第一項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を命ずるものとする。



- 3179 2 前項に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3180
- 3181 (許可等の条件)
- 3182 第七十九条 この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができ
- 3183 る。
- 3184 2 前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、
- 3185 認定又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
- 3186
- 3187 第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこ
- 3188 れを併科する。
- 3189 一 第四条第一項の規定に違反した者
- 3190 二 第十二条第一項の規定に違反した者
- 3191 三 第十四条第一項若しくは第十五項の規定又は第十四条の七の二第七項の規定による命令に違反した者
- 3192 四 第二十三条の二第一項の規定に違反した者
- 3193 五 第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項の規定又は第二十三条の二の十の二第七項の規定による命令
- 3194 に違反した者
- 3195 六 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項の規定に違反した者
- 3196 七 第二十三条の二十第一項の規定に違反した者
- 3197 八 第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項の規定又は第二十三条の三十二の二第七項の規定による命令
- 3198 に違反した者
- 3199 九 第二十四条第一項の規定に違反した者
- 3200 十 第二十七条の規定に違反した者
- 3201 十一 第三十一条の規定に違反した者
- 3202 十二 第三十九条第一項の規定に違反した者
- 3203 十三 第四十条の二第一項又は第七項の規定に違反した者
- 3204 十四 第四十条の五第一項の規定に違反した者
- 3205 十五 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 3206 十六 第四十四条第三項の規定に違反した者
- 3207 十七 第四十九条第一項の規定に違反した者
- 3208 十八 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)
- 3209 の規定に違反した者
- 3210 十九 第五十五条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)
- 3211 の規定に違反した者
- 3212 二十 第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)
- 3213 の規定に違反した者
- 3214 二十一 第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合
- 3215 を含む。)
- 3216 の規定に違反した者
- 3217 二十二 第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)
- 3218 の規定に違反した者
- 3219 二十三 第六十五条の規定に違反した者
- 3220 二十四 第六十五条の五の規定に違反した者
- 3221 二十五 第六十八条の二十の規定に違反した者
- 3222 二十六 第六十九条の三の規定による命令に違反した者
- 3223 二十七 第七十条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七
- 3224 十条第三項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した
- 3225 者
- 3226 二十八 第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

- 3225 二十九 第八十三条の二第一項、第八十三条の二の二第一項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項（第八  
 3226 十三条の五第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
- 3227
- 3228 第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこ  
 3229 れを併科する。
- 3230 一 第三十七条第一項の規定に違反した者
- 3231 二 第四十七条の規定に違反した者
- 3232 三 第五十五条第一項（第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の四及び第六十八条の十九において準  
 3233 用する場合を含む。）の規定に違反した者
- 3234 四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
- 3235 五 第六十八条の規定に違反した者
- 3236 六 第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
- 3237 七 第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
- 3238 八 第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
- 3239 九 第七十六条の五の規定に違反した者
- 3240 十 第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者
- 3241
- 3242 第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれ  
 3243 を併科する。
- 3244 一 第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二第一項若しくは第二項  
 3245 又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
- 3246 二 第十三条第一項又は第八項の規定に違反した者
- 3247 三 第十四条第十三項の規定による命令に違反した者
- 3248 四 第十七条第一項、第五項又は第十項の規定に違反した者
- 3249 五 第二十三条の二の三第一項の規定に違反した者
- 3250 六 第二十三条の二の五第十三項の規定による命令に違反した者
- 3251 七 第二十三条の二の十四第一項、第五項（第四十条の三において準用する場合を含む。）又は第十項の規定に  
 3252 違反した者
- 3253 八 第二十三条の二十二第一項又は第八項の規定に違反した者
- 3254 九 第二十三条の三十四第一項又は第五項の規定に違反した者
- 3255 十 第三十九条の二第一項の規定に違反した者
- 3256 十一 第四十条の六第一項の規定に違反した者
- 3257 十二 第四十五条の規定に違反した者
- 3258 十三 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
- 3259 十四 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 3260 十五 第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は  
 3261 同条第三項の規定に違反した者
- 3262 十六 毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者
- 3263 十七 第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反した者
- 3264 十八 第六十八条の十六第一項の規定に違反した者
- 3265 十九 第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反した者
- 3266 二十 第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者
- 3267 二十一 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
- 3268 二十二 第七十三条の規定による命令に違反した者
- 3269 二十三 第七十四条の規定による命令に違反した者
- 3270 二十四 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者

- 3271 二十五 第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者
- 3272 二十六 第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反した者
- 3273 二十七 第八十条の八第一項の規定に違反した者
- 3274 2 この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を
- 3275 有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 3276
- 3277 第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 3278 一 第十四条第十四項(同条第十五項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。))及び第十九条の二第
- 3279 五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3280 二 第十四条の四第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3281 三 第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3282 四 第二十三条の二の五第十四項(同条第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。))
- 3283 及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3284 五 第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3285 六 第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3286 七 第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3287 八 第六十八条の五第五項の規定に違反した者
- 3288 九 第六十八条の七第七項の規定に違反した者
- 3289 十 第六十八条の二十二第七項の規定に違反した者
- 3290 十一 第八十条の二第十項の規定に違反した者
- 3291 2 前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 3292
- 3293 第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 3294 一 第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を
- 3295 含む。)又は第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 3296 二 第十四条第十六項の規定に違反した者
- 3297 三 第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反した者
- 3298 四 第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 3299 五 第二十三条の二の五第十六項の規定に違反した者
- 3300 六 第二十三条の二の十二第一項又は第二項の規定に違反した者
- 3301 七 第二十三条の二の十六第一項又は第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した
- 3302 者
- 3303 八 第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反した者
- 3304 九 第二十三条の二十五第十二項の規定に違反した者
- 3305 十 第二十三条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者
- 3306 十一 第三十三条第一項の規定に違反した者
- 3307 十二 第三十九条の三第一項の規定に違反した者
- 3308 十三 第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚
- 3309 偽の報告をし、第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六
- 3310 十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第四項若しくは第六
- 3311 項若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が
- 3312 行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六
- 3313 条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)に
- 3314 対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 3315 十四 第七十一条の規定による命令に違反した者
- 3316 十五 第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者

3317 十六 第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規定に違反した者

3318 十七 第八十条の八第二項の規定に違反した者

3319  
3320 ○ **医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生**  
3321 **省令第1号）抄**

3322 （開設の申請）

3323 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「法」という。）第四条第二項  
3324 の申請書は、様式第一によるものとする。

3325 2 法第四条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

3326 一 通常の営業日及び営業時間

3327 二 薬剤師不在時間（開店時間（営業時間のうち特定販売（その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場  
3328 所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く。第四項第二号ホ、  
3329 第十四条の二、第十四条の三第一項及び第二項、第十五条の六、第一百五十八条の十第一項及び第三項、第二  
3330 百十八条の三、別表第一の二第二並びに別表第一の三において同じ。）の販売又は授与をいう。以下同じ。）の  
3331 みを行う時間を除いた時間をいう。以下同じ。）のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局  
3332 以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在とな  
3333 る時間をいう。以下同じ。）の有無

3334 三 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

3335 四 特定販売の実施の有無

3336 五 健康サポート薬局（患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取  
3337 組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。以下同じ。）である旨の表示の有無

3338 3 法第四条第三項第四号イの厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

3339 一 薬局医薬品（薬局製造販売医薬品を除く。）

3340 二 薬局製造販売医薬品

3341 三 要指導医薬品

3342 四 第一類医薬品

3343 五 指定第二類医薬品（第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものをい  
3344 う。以下同じ。）

3345 六 第二類医薬品（指定第二類医薬品を除く。次項第二号ハ及び第十五条の六第三号において同じ。）

3346 七 第三類医薬品

3347 4 法第四条第三項第四号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

3348 一 特定販売を行う際に使用する通信手段

3349 二 次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分

3350 イ 第一類医薬品

3351 ロ 指定第二類医薬品

3352 ハ 第二類医薬品

3353 ニ 第三類医薬品

3354 ホ 薬局製造販売医薬品

3355 三 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間

3356 四 特定販売を行うことについての広告に、法第四条第二項の申請書に記載する薬局の名称と異なる名称を表  
3357 示するときは、その名称

3358 五 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス  
3359 及び主たるホームページの構成の概要

3360 六 都道府県知事（その所在地が地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の政令で定める市（以下  
3361 「保健所を設置する市」という。）又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第六項、第六条  
3362 第一項及び第十五条の六第四号において同じ。）又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督

- 3363 を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
- 3364 5 法第四条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 3365 一 法人にあつては、登記事項証明書
- 3366 二 薬局の管理者(法第七条第一項の規定によりその薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次号を除き、以
- 3367 下同じ。)の週当たり勤務時間数(一週間当たりの通常の勤務時間数をいう。以下同じ。)並びに薬剤師名簿の
- 3368 登録番号及び登録年月日を記載した書類
- 3369 三 法第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場
- 3370 合にあつては、その薬局の管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬局の管理者に対する使用関係を
- 3371 証する書類
- 3372 四 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあ
- 3373 つては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日
- 3374 又は法第三十六条の八第二項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)の登録番号及び登録年月日を
- 3375 記載した書類
- 3376 五 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあ
- 3377 つては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する
- 3378 使用関係を証する書類
- 3379 六 一日平均取扱処方箋数(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九
- 3380 年厚生省令第三号)第一条第一項第二号に規定する一日平均取扱処方箋数をいう。以下同じ。)を記載した書類
- 3381 七 放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第一条第一号に規定する放
- 3382 射性医薬品をいう。以下同じ。)を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医
- 3383 薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設
- 3384 備の概要を記載した書類
- 3385 八 その薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の種類を記載した書
- 3386 類
- 3387 九 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業
- 3388 務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者であ
- 3389 る場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
- 3390 十 健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が
- 3391 定める基準に適合するものであることを明らかにする書類
- 3392 6 法第四条第三項各号に掲げる書類のうち、法の規定による許可等の申請又は届出(以下「申請等の行為」とい
- 3393 う。)の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を經由して厚生労
- 3394 働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。
- 3395 7 申請者は、その薬局の管理者が薬剤師法(昭和三十五年法律第一百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生
- 3396 労働大臣の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者であるときは、同条第三項の再教育研修修了登録
- 3397 証を提示し、又はその写しを添付するものとする。
- 3398
- 3399 (法第四条第五項第三号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
- 3400 第七条の二 法第四条第五項第三号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、
- 3401 それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
- 3402 一 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間(同
- 3403 条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)
- 3404 二 法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後
- 3405 の安全性に関する調査(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の
- 3406 基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第三百三十五号)第十条第一項に規定する市販直後調査(以下「市販
- 3407 直後調査」という。)を除く。)を実施する義務が課せられている医薬品 製造販売の承認の条件として付され
- 3408 た調査期間

3409 2 法第四条第五項第三号口の厚生労働省令で定める期間は、同号口に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用  
 3410 量、効能、効果等が同一性を有すると認められた同号イに掲げる医薬品に係る前項各号の期間の満了日までの  
 3411 期間とする。

3412

3413 (法第五条第三号への厚生労働省令で定める者)

3414 第八条 法第五条第三号への厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行  
 3415 うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3416

3417 (名称の使用の特例)

3418 第十条 法第六条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所と  
 3419 する。

3420

3421 (薬局開設者の遵守事項)

3422 第十一条の七 法第九条第一項の厚生労働省令で定める薬局開設者が遵守すべき事項は、次条から第十五条の十  
 3423 一までに定めるものとする。

3424

3425 (薬局における調剤)

3426 第十一条の八 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させては  
 3427 ならない。ただし、高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(以下「無菌調剤室」という。)を有する薬局  
 3428 の薬局開設者が、無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該無菌調剤室を有しない薬局  
 3429 で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるときは、この限りでない。

3430 2 前項ただし書の場合においては、当該無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者は、当該無菌調剤室を有しな  
 3431 い薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無  
 3432 菌調剤室を有する薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な  
 3433 措置を講じなければならない。

3434

3435 第十一条の九 薬局開設者は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらない場合には、その薬局で調剤に従事す  
 3436 る薬剤師に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。

3437 2 薬局開設者は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を  
 3438 得た場合を除き、その薬局で調剤に従事する薬剤師にこれを変更して調剤させてはならない。

3439

3440 第十一条の十 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師が処方箋中に疑わしい点があると認める場合に  
 3441 は、その薬局で調剤に従事する薬剤師をして、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせ  
 3442 て、その疑わしい点を確認した後でなければ、これによつて調剤させてはならない。

3443

3444 第十一条の十一 薬局開設者は、調剤の求めがあつた場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で  
 3445 調剤させなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りでない。

3446

3447 (試験検査の実施方法)

3448 第十二条 薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局  
 3449 の管理者に行わせなければならない。ただし、当該薬局の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難で  
 3450 あると薬局の管理者が認めた場合には、薬局開設者は、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣  
 3451 の登録を受けた試験検査機関(以下「登録試験検査機関」という。)を利用して試験検査を行うことができる。

3452 2 薬局開設者は、前項ただし書により試験検査を行った場合は、薬局の管理者に試験検査の結果を確認させな  
 3453 ければならない。

3454

3455 (薬局の管理に関する帳簿)

3456 第十三条 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。

3457 2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければ  
3458 ならない。

3459 3 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。

3460

3461 (医薬品の購入等に関する記録)

3462 第十四条 薬局開設者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業  
3463 者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第  
3464 二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。  
3465 以下同じ。)の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつて  
3466 は、当該医薬品が医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品(以下「医療用医薬品」という。)(体外診断用  
3467 医薬品を除く。))である場合に限る。)を書面に記載しなければならない。

3468 一 品名

3469 二 一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群に付される番号(以  
3470 下「ロット番号」という。)(ロットを構成しない医薬品については製造番号)

3471 三 使用の期限

3472 四 数量

3473 五 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日

3474 六 購入若しくは譲り受けた者又は販売若しくは授与した者(以下「購入者等」という。)の氏名又は名称、住所  
3475 又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないことと  
3476 された場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略することができる。)

3477 七 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する  
3478 確認を行わないこととされた場合を除く。)

3479 八 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人  
3480 である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等  
3481 から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料

3482 2 薬局開設者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購入者等から、薬局開設、医薬品の製造販売業、  
3483 製造業若しくは販売業又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設の許可又は届出に係る許可証又は届  
3484 書の写し(以下「許可証等の写し」という。)その他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、  
3485 電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。ただし、購入者等が当該薬局開設者と常時取引関係にあ  
3486 る場合は、この限りではない。

3487 3 薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品(以下この項において「薬局医薬品等」という。)  
3488 を販売し、又は授与したとき(薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療  
3489 所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与したときを除く。第五項及び第六項並びに第四百四  
3490 十六条第三項、第五項及び第六項において同じ。))は、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

3491 一 品名

3492 二 数量

3493 三 販売又は授与の日時

3494 四 販売し、又は授与した薬剤師の氏名並びに法第三十六条の四第一項若しくは第三十六条の六第一項の規定  
3495 による情報の提供及び指導又は法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を行つた薬剤師の氏名

3496 五 薬局医薬品等を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の四第一項若しくは第三十六条の六  
3497 第一項の規定による情報の提供及び指導の内容又は法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供の内容  
3498 を理解したことの確認の結果

3499 4 薬局開設者は、第一項の書面を、記載の日から三年間、前項の書面を記載の日から二年間、保存しなければ  
3500 ならない。

3501 5 薬局開設者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載  
 3502 し、これを保存するよう努めなければならない。

3503 一 品名

3504 二 数量

3505 三 販売又は授与の日時

3506 四 販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名及び法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供  
 3507 を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名

3508 五 第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供  
 3509 の内容を理解したことの確認の結果

3510 6 薬局開設者は、医薬品を販売し、又は授与したときは、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書  
 3511 面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。

3512

3513 (薬局医薬品の貯蔵等)

3514 第十四条の二 薬局開設者は、薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)を調剤室(薬局等構造設備規則(昭和三十  
 3515 六年厚生省令第二号)第一条第一項第十号に規定する調剤室をいう。)以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはなら  
 3516 ない。ただし、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場  
 3517 所に貯蔵する場合は、この限りでない。

3518

3519 (医薬品を陳列する場所等の閉鎖)

3520 第十四条の三 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、  
 3521 又は授与しない時間は、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所  
 3522 を閉鎖しなければならない。

3523 2 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与し  
 3524 ない時間は、薬局製造販売医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則第一条第一項第十号の二に規定する薬局製造  
 3525 販売医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)、要指導医薬品陳列区画(同項第十一号に規定する要指導医薬品陳列  
 3526 区画をいう。以下同じ。)又は第一類医薬品陳列区画(同項第十二号に規定する第一類医薬品陳列区画をいう。  
 3527 以下同じ。)を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列設備(同項第十号の二に規定する陳列設備を  
 3528 いう。以下同じ。)に薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りで  
 3529 ない。

3530 3 薬局開設者は、薬剤師不在時間は、調剤室を閉鎖しなければならない。

3531

3532 (薬局における従事者の区別等)

3533 第十五条 薬局開設者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者(その薬局において実務に従事する薬剤師又は登録  
 3534 販売者以外の者をいう。第十五条の八第一項において同じ。)であることが容易に判別できるようその薬局に勤  
 3535 務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。

3536 2 薬局開設者は、過去五年間のうち、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者(その薬局、店舗又  
 3537 は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及  
 3538 び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)  
 3539 に従事した期間(以下この項において「従事期間」という。)が通算して二年に満たない登録販売者が付ける前項  
 3540 の名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならない。ただし、次の各号に定め  
 3541 る要件を満たす登録販売者については、この限りでない。

3542 一 従事期間が通算して二年以上であること。

3543 二 店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験があること。

3544 3 薬局開設者は、前項本文に規定する登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(同項本文に規定する登録  
 3545 販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。

3546



3547 (濫用等のおそれのある医薬品の販売等)

3548 第十五条の二 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして  
 3549 厚生労働大臣が指定するもの(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)を販売し、又は授与するときは、  
 3550 次に掲げる方法により行わなければならない。

3551 一 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させ  
 3552 ること。

3553 イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年  
 3554 齢

3555 ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設  
 3556 者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品  
 3557 の購入又は譲受けの状況

3558 ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超え  
 3559 て当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由

3560 ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項

3561 二 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した  
 3562 事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。

3563  
 3564 (使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止)

3565 第十五条の三 薬局開設者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正  
 3566 当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。

3567  
 3568 (競売による医薬品の販売等の禁止)

3569 第十五条の四 薬局開設者は、医薬品を競売に付してはならない。

3570  
 3571 (薬局における医薬品の広告)

3572 第十五条の五 薬局開設者は、その薬局において販売し、又は授与しようとする医薬品について広告をするとき  
 3573 は、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医  
 3574 薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項  
 3575 を表示してはならない。

3576 2 薬局開設者は、医薬品の購入又は譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴その他の情報に基づき、自動的に  
 3577 特定の医薬品の購入又は譲受けを勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法に  
 3578 より、医薬品に関して広告をしてはならない。

3579  
 3580 (特定販売の方法等)

3581 第十五条の六 薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。

3582 一 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。

3583 二 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その  
 3584 他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示す  
 3585 ること。

3586 三 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二类医薬品、第二类医薬品、第三  
 3587 類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。

3588 四 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大  
 3589 臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。

3590  
 3591 (指定第二类医薬品の販売等)

3592 第十五条の七 薬局開設者は、指定第二类医薬品を販売し、又は授与する場合は、当該指定第二类医薬品を購入

3593 し、又は譲り受けようとする者が別表第一の二第二の七に掲げる事項を確実に認識できるようにするために必要  
 3594 な措置を講じなければならない。

3595 (実務の証明及び記録)

3596 第十五条の八 薬局開設者は、その薬局において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に  
 3597 実務に従事した者から、過去五年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにそ  
 3598 の証明を行わなければならない。

3600 2 前項の場合において、薬局開設者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。

3601 3 薬局開設者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

3602 (業務経験の証明及び記録)

3603 第十五条の九 薬局開設者は、その薬局において登録販売者として業務に従事した者から、過去五年間において  
 3604 その業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

3605 2 前項の場合において、薬局開設者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。

3606 3 薬局開設者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

3607 (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師等に対する措置)

3608 第十五条の十 薬局開設者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師若しく  
 3609 は登録販売者であるとき、又はその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者が視  
 3610 覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよ  
 3611 うに、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。

3612 (健康サポート薬局の表示)

3613 第十五条の十一 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、第一条第五項第十号  
 3614 に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。

3615 (薬局開設者の法令遵守体制)

3616 第十五条の十一の二 薬局開設者は、次に掲げるところにより、法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じな  
 3617 ければならない。

3618 一 次に掲げる薬局の管理者の権限を明らかにすること。

3619 イ 薬局に勤務する薬剤師その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関する権限

3620 ロ イに掲げるもののほか、薬局の管理に関する権限

3621 二 次に掲げる法第九条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。

3622 イ 薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要  
 3623 な規程の作成、薬局開設者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及  
 3624 び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

3625 ロ 薬局開設者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収  
 3626 集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

3627 ハ イ及びロに掲げるもののほか、薬局開設者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置そ  
 3628 他の薬局開設者の業務の適正を確保するための体制

3629 三 次に掲げる法第九条の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。

3630 イ 薬局開設者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。

3631 ロ 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。

3632 ハ 薬局開設者が二以上の許可を受けている場合にあつては、当該許可を受けている全ての薬局において法  
 3633 第九条の二による法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要な措置

3634 ニ ハの場合であつて、二以上の薬局の法令遵守体制を確保するために薬局開設者(薬局開設者が法人である

3639 ときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下この二において同じ。）を補佐する者を置くときは、  
 3640 次に掲げる措置

- 3641 (1) 薬局開設者を補佐する者が行う業務を明らかにすること。  
 3642 (2) 薬局開設者を補佐する者が二以上の薬局の法令遵守体制を確保するために薬局の管理者から必要な  
 3643 情報を収集し、当該情報を薬局開設者に速やかに報告するとともに、当該薬局開設者からの指示を受け  
 3644 て、薬局の管理者に対して当該指示を伝達するための措置  
 3645 (3) 薬局開設者が二以上の薬局の法令遵守体制を確保するために薬局開設者を補佐する者から必要な情  
 3646 報を収集し、薬局開設者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措置  
 3647 ホ 医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適切に行われ、かつ、第十四条に規定する薬局  
 3648 開設者の義務が履行されるために必要な措置  
 3649 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置

3650  
 3651 (薬局における登録販売者の継続的研修)

3652 第十五条の十一の三 薬局開設者は、その薬局において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させな  
 3653 ければならない。

3654 2 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。

- 3655 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
 3656 二 研修の実施場所

3657 3 前項の届出を行つた者(以下この条において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとお  
 3658 りとする。

3659 一 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。

- 3660 イ 医薬品に共通する特性と基本的な知識  
 3661 ロ 人体の働きと医薬品  
 3662 ハ 主な医薬品とその作用  
 3663 ニ 薬事に関する法規と制度  
 3664 ホ 医薬品の適正使用と安全対策  
 3665 ヘ リスク区分等の変更があつた医薬品

3666 ト その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

3667 二 前号に掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。

3668 三 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

3669 4 研修実施機関は、研修の修了者に修了証を交付するものとする。

3670 5 研修実施機関は、研修の実施に必要な経費に充てるため、受講者から負担金を徴収することができる。この場  
 3671 合、負担金は実費に相当する額でなければならない。

3672 6 研修実施機関は、第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その変更が生じた日から三十日以内に厚  
 3673 生労働大臣に届け出なければならない。

3674 7 研修実施機関は、研修の実施に関する業務の全部又は一部を廃止し、休止し、又は休止した業務を再開しよう  
 3675 とするときは、あらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。

3676  
 3677 (調剤された薬剤の販売等)

3678 第十五条の十二 薬局開設者は、法第九条の三の規定により、調剤された薬剤につき、次に掲げる方法により、そ  
 3679 の薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

3680 一 法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解  
 3681 したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。

3682 二 当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第九条の四第四項の規定に  
 3683 よる情報の提供又は指導を行つた後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること。

3684 三 法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導のため必要があると認めるときは、当該薬剤を購入

- 3685 し、又は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること。
- 3686 四 当該薬剤を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局の名称及び当該薬局の電話番号その他連絡先を、
- 3687 当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。
- 3688
- 3689 (調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)
- 3690 第十五条の十三 薬局開設者は、法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法によ
- 3691 り、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
- 3692 一 当該薬局内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報
- 3693 を提供し、及び指導を行うための設備がある場所又は居宅等において調剤の業務を行う場合若しくは同条た
- 3694 だし書に規定する特別の事情がある場合にあつては、その調剤の業務を行う場所をいう。)において行わせる
- 3695 こと。
- 3696 二 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な
- 3697 使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者の状況に応じて個別に提供させ、
- 3698 及び必要な指導を行わせること。
- 3699 三 当該薬剤を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳
- 3700 (別表第一を除き、以下単に「手帳」という。)を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持す
- 3701 る場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。
- 3702 四 当該薬剤の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。
- 3703 五 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無につい
- 3704 て確認させること。
- 3705 六 当該情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること。
- 3706 2 法第九条の四第一項の薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令
- 3707 で定めるものは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法
- 3708 であつて、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。この場合において、前項第一号中「設備がある場所」と
- 3709 あるのは、「設備がある場所(次項第二号に規定するオンライン服薬指導を行う場合にあつては、当該薬局内の場
- 3710 所)」とする。
- 3711 一 薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、同一内容又はこれに準じる内
- 3712 容の処方箋により調剤された薬剤について、あらかじめ、対面により、当該薬剤を使用しようとする者に対
- 3713 して法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を行わせている場合に行われること。
- 3714 二 次に掲げる事項を定めた服薬指導計画(この項に定める方法により行われる法第九条の四第一項の規定に
- 3715 よる情報の提供及び指導(以下「オンライン服薬指導」という。)に関する計画であつて、薬局開設者が、その
- 3716 薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、薬剤を使用しようとする者ごとに、当該者の同意を
- 3717 得て策定させるものをいう。)に従つて行われること。
- 3718 イ オンライン服薬指導で取り扱う薬剤の種類及びその授受の方法に関する事項
- 3719 ロ オンライン服薬指導並びに対面による法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導の組合せに
- 3720 関する事項
- 3721 ハ オンライン服薬指導を行うことができない場合に関する事項
- 3722 ニ 緊急時における処方箋を交付した医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所その他の関係医療機関と
- 3723 の連絡体制及び対応の手順に関する事項
- 3724 ホ その他オンライン服薬指導において必要な事項
- 3725 三 薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、オンライン診療(医療法施行規
- 3726 則(昭和二十三年厚生省令第五十号)別表第一に規定するオンライン診療をいう。)又は訪問診療(薬剤を使用し
- 3727 ようとする者の居宅等において、医師又は歯科医師が当該薬剤師との継続的な連携の下に行うものに限る。)
- 3728 において交付された処方箋により調剤された薬剤を販売又は授与させる場合に行われること。
- 3729 3 法第九条の四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、薬剤師法第二十五条に規定
- 3730 する事項が記載されている調剤された薬剤の容器又は被包を用いて、その薬局において薬剤の販売又は授与に

3731 従事する薬剤師に情報の提供を行わせる場合には、第一号から第四号までに掲げる事項を記載することを要し  
 3732 ない。

3733 一 当該薬剤の名称

3734 二 当該薬剤の有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称。以下同じ。)及びその分量  
 3735 (有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨。以下同じ。)

3736 三 当該薬剤の用法及び用量

3737 四 当該薬剤の効能又は効果

3738 五 当該薬剤に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

3739 六 その他当該薬剤を調剤した薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

3740 4 法第九条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又  
 3741 は出力装置の映像面に表示する方法とする。

3742 5 法第九条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

3743 一 年齢

3744 二 他の薬剤又は医薬品の使用の状況

3745 三 性別

3746 四 症状

3747 五 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名

3748 六 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数

3749 七 授乳しているか否かの別

3750 八 当該薬剤に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

3751 九 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別  
 3752 並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量  
 3753 及び服用の状況

3754 十 その他法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

3755  
 3756 第十五条の十四 薬局開設者は、法第九条の四第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法によ  
 3757 り、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

3758 一 当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせるこ  
 3759 と。

3760 二 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な  
 3761 使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局開設者から当  
 3762 該薬剤を購入し、若しくは譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。

3763 三 当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又  
 3764 は指導を行わせること。

3765 四 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

3766  
 3767 第十五条の十四の二 法第九条の四第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報  
 3768 の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が認める場合とす  
 3769 る。

3770 2 前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事す  
 3771 る薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。

3772 一 第十五条の十三第五項第一号から第九号までに掲げる事項

3773 二 当該薬剤の服薬状況

3774 三 当該薬剤を使用する者の服薬中の体調の変化

3775 四 その他法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項

3776 3 薬局開設者は、法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局に

3777 において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

3778 一 当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。

3780 二 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。

3783 三 当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。

3785 四 当該情報の提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること。

3787 第十五条の十四の三 法第九条の四第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければならない事項は、次のとおりとする。

3789 一 法第九条の四第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行った年月日

3790 二 前号の情報の提供及び指導の内容の要点

3791 三 第一号の情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名

3792 四 第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢

3793 2 薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。

3795 (薬局における掲示)

3796 第十五条の十五 法第九条の五の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。

3798 2 法第九条の五の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。

3800 (薬剤師不在時間の掲示)

3801 第十五条の十六 法第九条の五の規定による掲示のうち、薬剤師不在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

3805 (変更の届出)

3806 第十六条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

3807 一 薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員(その氏名を含む。)又は住所)

3809 二 薬局の構造設備の主要部分

3810 三 通常の営業日及び営業時間

3811 四 薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数

3812 五 薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

3814 六 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類

3815 七 当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

3816 八 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条第三項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)

3818 2 法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。ただし、前項第四号の薬局の管理者が再教育研修命令を受けた者であるときは、薬剤師法第八条の二第三項の再教育研修修了登録証を提示し、又はその写しを添付するものとする。

3821 3 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特

別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

- 一 第一項第一号に掲げる薬局開設者の氏名に係る届書 薬局開設者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(薬局開設者が法人であるときは、登記事項証明書)
- 二 第一項第一号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
- 三 第一項第四号又は第五号に掲げる事項に係る届書(新たに管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者となつた者が薬局開設者である場合を除く。) 雇用契約書の写しその他薬局開設者の新たに管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者となつた者に対する使用関係を証する書類

第十六条の二 法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 薬剤師不在時間の有無
- 二 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 三 特定販売の実施の有無
- 四 第一条第四項各号に掲げる事項
- 五 健康サポート薬局である旨の表示の有無

2 法第十条第二項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。

3 当該薬局において新たに特定販売を行おうとする場合にあつては、前項の届書には、第一条第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

4 当該薬局において新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合にあつては、第二項の届書には、当該薬局が、第一条第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えなければならない。

(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)

第一百三十八条 法第二十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。

- 一 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
- 二 助産所(医療法第二条第一項に規定する助産所をいう。)の開設者であつて助産所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 三 救急用自動車等(救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十四条第二項に規定する救急用自動車等をいう。以下同じ。)により業務を行う事業者であつて救急用自動車等に医薬品を備え付けるもの
- 四 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項の許可を受けた者であつて同項に規定する業として行う臓器のあつせんに使用する滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 五 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項に規定する施術所をいう。以下同じ。)の開設者であつて施術所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 六 歯科技工所(歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第三項に規定する歯科技工所をいう。以下同じ。)の開設者であつて歯科技工所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 七 滅菌消毒(医療法施行規則第九条の九第一項に規定する滅菌消毒をいう。以下同じ。)の業務を行う事業者であつて滅菌消毒の業務に滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 八 ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の業務を行う事業者であつて防除の業務に防除用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 九 浄化槽、貯水槽、水泳プールその他これらに類する設備(以下「浄化槽等」という。)の衛生管理を行う事業者であつて浄化槽等で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの

- 3869 十 登録試験検査機関その他検査施設の長であつて検査を行うに当たり必要な体外診断用医薬品その他の医薬  
 3870 品を使用するもの  
 3871 十一 研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの  
 3872 十二 医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な医薬  
 3873 品を使用するもの  
 3874 十三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を行う事業者であつ  
 3875 て航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十条第二項の規定に基づく医薬品を使用するも  
 3876 の  
 3877 十四 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者であつて船員法施行規則(昭和二十二年運輸  
 3878 省令第二十三号)第五十三条第一項の規定に基づく医薬品を使用するもの  
 3879 十五 前各号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの

3880  
 3881 (店舗販売業の許可の申請)

3882 第百三十九条 法第二十六条第二項の申請書は、様式第七十六によるものとする。

3883 2 法第二十六条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、第一条第二項各号(同項第五号を除く。)に掲げる  
 3884 事項とする。

3885 3 法第二十六条第三項第四号の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

3886 一 要指導医薬品

3887 二 第一類医薬品

3888 三 指定第二類医薬品

3889 四 第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。次項第二号ハ及び第百四十七条の七第三号において同じ。)

3890 五 第三類医薬品

3891 4 法第二十六条第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

3892 一 特定販売を行う際に使用する通信手段

3893 二 次のイからニまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分

3894 イ 第一類医薬品

3895 ロ 指定第二類医薬品

3896 ハ 第二類医薬品

3897 ニ 第三類医薬品

3898 三 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間

3899 四 特定販売を行うことについての広告に、法第二十六条第二項の申請書に記載する店舗の名称と異なる名称  
 3900 を表示するときは、その名称

3901 五 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス  
 3902 及び主たるホームページの構成の概要

3903 六 都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は  
 3904 区長。第百四十七条の七第四号において同じ。)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督  
 3905 を行うために必要な設備の概要(その店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)

3906 5 法第二十六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

3907 一 法人にあつては、登記事項証明書

3908 二 店舗管理者(法第二十八条第一項の規定によりその店舗を実地に管理する店舗販売業者を含む。次号を除き、  
 3909 以下同じ。)の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号  
 3910 及び登録年月日を記載した書類

3911 三 法第二十八条第一項の規定により店舗管理者を指定してその店舗を実地に管理させる場合にあつては、そ  
 3912 の店舗管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその店舗管理者に対する使用関係を証する書類

3913 四 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつ  
 3914 ては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又



3915 は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類

3916 五 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類

3917 六 その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、その業務の種類を記載した書類

3918 七 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3919 6 法第二十六条第二項の申請については、第一条第六項及び第七項並びに第九条の規定を準用する。この場合において、第一条第六項中「第四条第三項各号」とあるのは、「第二十六条第三項各号」と読み替えるものとする。

3920 7 法第二十六条第五項において準用する法第五条第三号への厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3930  
3931 (店舗管理者の指定)

3932 第一百四十条 店舗管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であつて、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければならない。

3933 一 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗 薬剤師

3934 二 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する店舗 薬剤師又は登録販売者(第十五条第二項本文に規定する登録販売者を除く。)

3935 2 前項第一号の規定にかかわらず、第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、過去五年間のうち次の各号に掲げる期間が通算して三年以上である登録販売者であつて、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができる。

3936 一 要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として業務に従事した期間

3937 二 第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗の店舗管理者又は第一類医薬品を配置販売する区域の区域管理者であつた期間

3946  
3947 (店舗管理者を補佐する者)

3948 第一百四十一条 第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗販売業者は、当該店舗の店舗管理者が薬剤師でない場合には、店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置かなければならない。

3949 2 前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し必要な意見を書面により述べなければならない。

3950 3 店舗販売業者及び店舗管理者は、第一項の規定により店舗管理者を補佐する者を置いたときは、前項の規定により述べられた店舗管理者を補佐する者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

3956  
3957 (準用)

3958 第一百四十二条 店舗販売業者については、第二条から第七条まで(同条第九号及び第十号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第七条第十一号中「医薬品の販売業」とあるのは「店舗販売業以外の医薬品の販

3961 売業」と、同条第十二号中「第一条第三項各号」とあるのは「第百三十九条第三項各号」と、同条第十三号中「第  
 3962 一条第四項各号」とあるのは「第百三十九条第四項各号」と、「除く。第十六条の二第一項第三号において同じ」  
 3963 とあるのは「除く」と読み替えるものとする。

3964  
 3965 (店舗管理者の業務及び遵守事項)

3966 第百四十二条の二 法第二十九条第三項の店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務は、次のとおりとする。

- 3967 一 法第二十九条の三第一項第一号に規定する店舗管理者が有する権限に係る業務
- 3968 二 第百四十四条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二項の規定による試験検査の結果の確認
- 3969 三 第百四十五条第二項の規定による帳簿の記載

3970 2 法第二十九条第三項の店舗管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

- 3971 一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を  
 3972 監督し、その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗の業務につき、必要な注意  
 3973 をすること。
- 3974 二 法第二十九条第二項の規定により店舗販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存す  
 3975 ること。

3976  
 3977 (店舗販売業者の遵守事項)

3978 第百四十三条 法第二十九条の二第一項の厚生労働省令で定める店舗販売業者が遵守すべき事項は、次条から第  
 3979 百四十七条の十一までに定めるものとする。

3980  
 3981 (試験検査の実施方法)

3982 第百四十四条 店舗販売業者は、店舗管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、  
 3983 店舗管理者に行わせなければならない。ただし、当該店舗の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難  
 3984 であると店舗管理者が認めた場合には、店舗販売業者は、当該店舗販売業者の他の試験検査設備又は登録試験  
 3985 検査機関を利用して試験検査を行うことができる。

3986 2 店舗販売業者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、店舗管理者に試験検査の結果を確認させな  
 3987 ければならない。

3988  
 3989 (店舗の管理に関する帳簿)

3990 第百四十五条 店舗販売業者は、店舗に当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければなら  
 3991 ない。

3992 2 店舗管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該店舗の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければ  
 3993 ならない。

3994 3 店舗販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。

3995  
 3996 (医薬品の購入等に関する記録)

3997 第百四十六条 店舗販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、  
 3998 製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与したとき  
 3999 は、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

- 4000 一 品名
- 4001 二 数量
- 4002 三 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
- 4003 四 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に  
 4004 規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略するこ  
 4005 とができる。)

4007 五 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する  
 4008 確認を行わないこととされた場合を除く。)

4009 六 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人  
 4010 である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等  
 4011 から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料

4012 2 店舗販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購入者等から、許可証等の写しその他の資料の  
 4013 提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。ただ  
 4014 し、購入者等が当該店舗販売業者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。

4015 3 店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品(以下この項において「要指導医薬品等」という。)を販売し、  
 4016 又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

4017 一 品名

4018 二 数量

4019 三 販売又は授与の日時

4020 四 販売し、又は授与した薬剤師の氏名並びに法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導又は  
 4021 法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を行つた薬剤師の氏名

4022 五 要指導医薬品等を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の六第一項の規定による情報の提  
 4023 供及び指導の内容又は法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果

4024 4 店舗販売業者は、第一項の書面を記載の日から三年間、前項の書面を記載の日から二年間、保存しなければな  
 4025 らない。

4026 5 店舗販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記  
 4027 載し、これを保存するよう努めなければならない。

4028 一 品名

4029 二 数量

4030 三 販売又は授与の日時

4031 四 販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名及び法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供  
 4032 を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名

4033 五 第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供  
 4034 の内容を理解したことの確認の結果

4035 6 店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与したときは、当該要指導医薬品又は一般  
 4036 用医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。

4037  
 4038 (医薬品を陳列する場所等の閉鎖)

4039 第一百四十七条 店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間  
 4040 は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。

4041 2 店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導  
 4042 医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導  
 4043 医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。

4044  
 4045 (店舗における従事者の区別等)

4046 第一百四十七条の二 店舗販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者(その店舗において実務に従事する薬剤  
 4047 師又は登録販売者以外の者をいう。第一百四十七条の九第一項において同じ。)であることが容易に判別できるよ  
 4048 うその店舗に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。

4049 2 店舗販売業者は、第十五条第二項本文に規定する登録販売者が付ける前項の名札については、その旨が容易  
 4050 に判別できるよう必要な表記をしなければならない。

4051 3 店舗販売業者は、第十五条第二項本文に規定する登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(同項本文に  
 4052 規定する登録販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。

4053  
4054  
4055  
4056  
4057  
4058  
4059  
4060  
4061  
4062  
4063  
4064  
4065  
4066  
4067  
4068  
4069  
4070  
4071  
4072  
4073  
4074  
4075  
4076  
4077  
4078  
4079  
4080  
4081  
4082  
4083  
4084  
4085  
4086  
4087  
4088  
4089  
4090  
4091  
4092  
4093  
4094  
4095  
4096  
4097  
4098

(濫用等のおそれのある医薬品の販売等)

第一百四十七条の三 店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。

- 一 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。
  - イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢
  - ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
  - ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
- 二 その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項
- 二 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。

(使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止)

第一百四十七条の四 店舗販売業者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。

(競売による医薬品の販売等の禁止)

第一百四十七条の五 店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならない。

(店舗における医薬品の広告)

第一百四十七条の六 店舗販売業者は、その店舗において販売し、又は授与しようとする医薬品について広告をするときは、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならない。

2 店舗販売業者は、医薬品の購入又は譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴その他の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入又は譲受けを勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により、医薬品に関して広告をしてはならない。

(特定販売の方法等)

第一百四十七条の七 店舗販売業者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。

- 一 当該店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与すること。
- 二 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。
- 三 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二类医薬品、第二类医薬品及び第三類医薬品の区分ごとに表示すること。
- 四 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。

(指定第二类医薬品の販売等)

4099 第四百四十七条の八 店舗販売業者は、指定第二类医薬品を販売し、又は授与する場合は、当該指定第二类医薬品を  
 4100 購入し、又は譲り受けようとする者が別表第一の二第二の七に掲げる事項を確実に認識できるようにするために  
 4101 必要な措置を講じなければならない。

4102  
 4103 (実務の証明及び記録)

4104 第四百四十七条の九 店舗販売業者は、その店舗において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導  
 4105 の下に実務に従事した者から、過去五年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速や  
 4106 かにその証明を行わなければならない。

4107 2 前項の場合において、店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。

4108 3 店舗販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

4109  
 4110 (業務経験の証明及び記録)

4111 第四百四十七条の十 店舗販売業者は、その店舗において登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。  
 4112 以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められ  
 4113 たときは、速やかにその証明を行わなければならない。

4114 2 前項の場合において、店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。

4115 3 店舗販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

4116  
 4117 (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師等に対する措置)

4118 第四百四十七条の十一 店舗販売業者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤  
 4119 師若しくは登録販売者であるとき、又はその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販  
 4120 売業者が視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれ  
 4121 がないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。

4122  
 4123 (店舗販売業者の法令遵守体制)

4124 第四百四十七条の十一の二 店舗販売業者は、次に掲げるところにより、法第二十九条の三第一項各号に掲げる措  
 4125 置を講じなければならない。

4126 一 次に掲げる店舗管理者の権限を明らかにすること。

4127 イ 店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関する権限

4128 ロ イに掲げるもののほか、店舗の管理に関する権限

4129 二 次に掲げる法第二十九条の三第一項第二号に規定する体制を整備すること。

4130 イ 店舗の管理に関する業務その他の店舗販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必  
 4131 要な規程の作成、店舗販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実  
 4132 施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

4133 ロ 店舗販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を  
 4134 収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

4135 ハ イ及びロに掲げるもののほか、店舗販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置  
 4136 その他の店舗販売業者の業務の適正を確保するための体制

4137 三 次に掲げる法第二十九条の三第一項第三号に規定する措置を講ずること。

4138 イ 店舗販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。

4139 ロ 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。

4140 ハ 店舗販売業者が二以上の許可を受けている場合にあっては、当該許可を受けている全ての店舗において  
 4141 法第二十九条の三による法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要な措置

4142 ニ ハの場合であつて、二以上の店舗の法令遵守体制を確保するために店舗販売業者(店舗販売業者が法人で  
 4143 あるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下この二において同じ。)を補佐する者を置くとき  
 4144 は、次に掲げる措置

- 4145 (1) 店舗販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにすること。
- 4146 (2) 店舗販売業者を補佐する者が二以上の店舗の法令遵守体制を確保するために店舗管理者から必要な
- 4147 情報を収集し、当該情報を店舗販売業者に速やかに報告するとともに、当該店舗販売業者からの指示を
- 4148 受けて、店舗管理者に対して当該指示を伝達するための措置
- 4149 (3) 店舗販売業者が二以上の店舗の法令遵守体制を確保するために店舗販売業者を補佐する者から必要
- 4150 な情報を収集し、店舗販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措置
- 4151 ホ 医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適切に行われ、かつ、第四百六十六条に規定する
- 4152 店舗販売業者の義務が履行されるために必要な措置
- 4153 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置
- 4154

4155 (店舗における登録販売者の継続的研修)

4156 第四百四十七条の十一の三 店舗販売業者は、その店舗において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講

4157 させなければならない。

4158 2 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。

4159 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

4160 二 研修の実施場所

4161 3 前項の届出を行った者(次項において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。

4162

4163 一 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。

4164 イ 医薬品に共通する特性と基本的な知識

4165 ロ 人体の働きと医薬品

4166 ハ 主な医薬品とその作用

4167 ニ 薬事に関する法規と制度

4168 ホ 医薬品の適正使用と安全対策

4169 ヘ リスク区分等の変更があつた医薬品

4170 ト 店舗の管理に関する事項

4171 チ その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

4172 二 前号に掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。

4173 三 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

4174 4 研修実施機関については、第十五条の十一の三第四項から第七項までの規定を準用する。

4175

4176 (店舗における掲示)

4177 第四百四十七条の十二 法第二十九条の四の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を

4178 表示した掲示板によるものとする。

4179 2 法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。

4180

4181

4182 (販売又は授与する開店時間の掲示)

4183 第四百四十七条の十三 法第二十九条の四の規定による掲示のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又

4184 は授与する開店時間は、当該店舗内の見やすい場所及び当該店舗の外側の見やすい場所に掲示することにより

4185 行うものとする。

4186

4187 (配置販売業の許可の申請)

4188 第四百四十八条 法第三十条第二項の申請書は、様式第八十三によるものとする。

4189 2 法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

4190 一 営業の区域

- 4191 二 通常の営業日及び営業時間
- 4192 三 相談時及び緊急時の連絡先
- 4193 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出
- 4194 先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類に
- 4195 ついては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
- 4196 一 法人にあつては、登記事項証明書
- 4197 二 法第三十一条の二第一項の規定により区域管理者を指定してその業務に係る都道府県の区域(以下単に「区
- 4198 域」という。)を管理させる場合にあつては、その区域管理者の氏名及び住所を記載した書類
- 4199 三 区域管理者(法第三十一条の二第一項の規定によりその区域を管理する配置販売業者を含む。次号を除き、
- 4200 以下同じ。)の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号
- 4201 及び登録年月日を記載した書類
- 4202 四 法第三十一条の二第一項の規定により区域管理者を指定してその区域を管理させる場合にあつては、その
- 4203 区域管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその区域管理者に対する使用関係を証する書類
- 4204 五 区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつ
- 4205 ては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
- 4206 六 区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつ
- 4207 ては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又
- 4208 は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類
- 4209 七 区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつ
- 4210 ては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使
- 4211 用関係を証する書類
- 4212 八 その区域において配置販売によつて販売し、又は授与する医薬品の次に掲げる区分を記載した書類
- 4213 イ 第一類医薬品
- 4214 ロ 指定第二類医薬品
- 4215 ハ 第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。)
- 4216 ニ 第三類医薬品
- 4217 九 その区域において配置販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の
- 4218 種類を記載した書類
- 4219 十 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業
- 4220 務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者であ
- 4221 る場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
- 4222 4 法第三十条第二項の申請については、前項の規定によるほか、第一条第七項及び第九条の規定を準用する。こ
- 4223 の場合において、第九条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
- 4224 いては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
- 4225 5 法第三十条第四項において準用する法第五条第三号への厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によ
- 4226 り配置販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 4227 とする。
- 4228
- 4229 (準用)
- 4230 第一百四十九条 配置販売業者については、第二条及び第四条から第七条まで(同条第三号、第八号、第九号及び第
- 4231 十三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、
- 4232 第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第七条第十一号中「医薬品の販売業」とあるのは
- 4233 「配置販売業以外の医薬品の販売業」と、同条第十二号中「第一条第三項各号」とあるのは「第一百四十八条第二
- 4234 項第八号イからニまで」と読み替えるものとする。
- 4235
- 4236 (区域管理者の指定)

4237 第四百九十九条の二 区域管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であつて、その区域において  
 4238 医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければならない。

4239 一 第一類医薬品を販売し、又は授与する区域 薬剤師

4240 二 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する区域 薬剤師又は登録販売者(第十五条第二項本文  
 4241 に規定する登録販売者を除く。)

4242 2 前項第一号の規定にかかわらず、第一類医薬品を販売し、又は授与する区域において薬剤師を区域管理者と  
 4243 することができない場合には、過去五年間のうち次の各号に掲げる期間が通算して三年以上である登録販売者  
 4244 であつて、その区域において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを区域管理者とすることができる。

4246 一 要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導  
 4247 医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類  
 4248 医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として業務に従事した期間

4249 二 第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗の店舗管理者又は第一類医薬品を配置販売する区域の区域  
 4250 管理者であつた期間

4251 3 前項の場合においては、第四百四十一条の規定を準用する。

4252

4253 (区域管理者の業務及び遵守事項)

4254 第四百九十九条の二の二 法第三十一条の三第三項の区域管理者が行う区域の管理に関する業務は、次のとおりと  
 4255 する。

4256 一 法第三十一条の五第一項第一号に規定する区域管理者が有する権限に係る業務

4257 二 第四百九十九条の四第二項の規定による帳簿の記載

4258 2 法第三十一条の三第三項の区域管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

4259 一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員その他の従業者を監督し、医薬品そ  
 4260 他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をすること。

4261 二 法第三十一条の三第二項の規定により配置販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保  
 4262 存すること。

4263

4264 (配置販売業者の遵守事項)

4265 第四百九十九条の三 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める配置販売業者が遵守すべき事項は、次条か  
 4266 ら第四百九十九条の十四までに定めるものとする。

4267

4268 (区域の管理に関する帳簿)

4269 第四百九十九条の四 配置販売業者は、当該区域の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない  
 4270 い。

4271 2 区域管理者は、不良品の処理その他当該区域の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。

4272 3 配置販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。

4273

4274 (医薬品の購入等に関する記録)

4275 第四百九十九条の五 配置販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたときは、次に掲げる事項を書面に記載しな  
 4276 ければならない。

4277 一 品名

4278 二 数量

4279 三 購入又は譲受けの年月日

4280 四 当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号そ  
 4281 他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名  
 4282 又は名称以外の事項は、その記載を省略することができる。)



4283 五 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する  
 4284 確認を行わないこととされた場合を除く。)

4285 六 当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者が自然人であり、かつ、当該者以外の者が医薬品  
 4286 の取引の任に当たる場合及び当該者が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購  
 4287 入者等と雇用関係にあること又は当該者から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料

4288 2 配置販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は  
 4289 授与した者から、許可証等の写しその他の資料の提示を受けることで、当該者の住所又は所在地、電話番号その  
 4290 他の連絡先を確認しなければならない。ただし、当該者が当該配置販売業者と常時取引関係にある場合は、この  
 4291 限りではない。

4292 3 配置販売業者は、第一類医薬品を配置したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

4293 一 品名

4294 二 数量

4295 三 配置した日時

4296 四 配置した薬剤師の氏名及び法第三十六条の十第七項において準用する同条第一項の規定による情報の提供  
 4297 を行った薬剤師の氏名

4298 五 第一類医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第七項におい  
 4299 て準用する同条第一項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果

4300 4 配置販売業者は、第一項の書面を記載の日から三年間、前項の書面を記載の日から二年間、保存しなければな  
 4301 らない。

4302 5 配置販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を配置したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、これを  
 4303 保存するよう努めなければならない。

4304 一 品名

4305 二 数量

4306 三 配置した日時

4307 四 配置した薬剤師又は登録販売者の氏名及び法第三十六条の十第七項において準用する同条第三項の規定に  
 4308 よる情報の提供を行った薬剤師又は登録販売者の氏名

4309 五 第二類医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第七項におい  
 4310 て準用する同条第三項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果

4311 6 配置販売業者は、一般用医薬品を配置したときは、当該一般用医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受  
 4312 けようとする者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。

4313  
 4314 (区域における従事者の区別等)

4315 第四百九条の六 配置販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者(その区域において実務に従事する薬剤  
 4316 師又は登録販売者以外の者をいう。第四百九条の十二第一項において同じ。)であることが容易に判別できる  
 4317 ようその区域に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。

4318 2 配置販売業者は、第十五条第二項本文に規定する登録販売者が付ける前項の名札については、その旨が容易  
 4319 に判別できるよう必要な表記をしなければならない。

4320 3 配置販売業者は、第十五条第二項本文に規定する登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(同項本文に  
 4321 規定する登録販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。

4322  
 4323 (濫用等のおそれのある医薬品の配置)

4324 第四百九条の七 配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を配置するときは、次  
 4325 に掲げる方法により行わなければならない。

4326 一 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させるこ  
 4327 と。

4328 イ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当

- 4329 該者の氏名及び年齢
- 4330 ロ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする
- 4331 者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のお
- 4332 それのある医薬品の購入又は譲受けの状況
- 4333 ハ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認め
- 4334 られる数量を超えて当該医薬品の配置を求める場合は、その理由
- 4335 ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする配置販売による購入又は譲受けであることを確認するため
- 4336 に必要な事項
- 4337 二 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項
- 4338 を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、配置させること。

4339 (使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止)

- 4340 第四百九十九条の八 配置販売業者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品
- 4341 を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはな
- 4342 らない。

4343 (配置販売業における医薬品の広告)

- 4344 第四百九十九条の九 配置販売業者は、その区域において販売し、又は授与しようとする医薬品について広告をす
- 4345 るときは、当該医薬品を配置販売によつて購入し、若しくは譲り受けた者又は配置した医薬品を使用した者によ
- 4346 る当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならな
- 4347 い。
- 4348 2 配置販売業者は、医薬品の配置販売による購入又は譲受けの履歴その他の情報に基づき、自動的に特定の医
- 4349 薬品の配置販売による購入又は譲受けを勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある
- 4350 方法により、医薬品に関して広告をしてはならない。

4351 (配置販売に関する文書の添付)

- 4352 第四百九十九条の十 配置販売業者は、一般用医薬品を配置するときは、別表第一の四に掲げる事項を記載した書
- 4353 面を添えて配置しなければならない。

4354 (指定第二类医薬品の配置)

- 4355 第四百九十九条の十一 配置販売業者は、指定第二类医薬品を配置する場合は、当該指定第二类医薬品を配置販売
- 4356 によつて購入し、又は譲り受けようとする者が別表第一の四第二の五に掲げる事項を確実に認識できるように
- 4357 するために必要な措置を講じなければならない。

4358 (実務の証明及び記録)

- 4359 第四百九十九条の十二 配置販売業者は、その区域において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指
- 4360 導の下に実務に従事した者から、過去五年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速
- 4361 やかにその証明を行わなければならない。
- 4362 2 前項の場合において、配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。
- 4363 3 配置販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

4364 (業務経験の証明及び記録)

- 4365 第四百九十九条の十三 配置販売業者は、その区域において登録販売者として業務(区域管理者としての業務を含む。
- 4366 以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められ
- 4367 たときは、速やかにその証明を行わなければならない。
- 4368 2 前項の場合において、配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。

3 配置販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

(視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師等に対する措置)

第四百四十九条の十四 配置販売業者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師若しくは登録販売者であるとき、又はその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者が視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。

(配置販売業者の法令遵守体制)

第四百四十九条の十五 配置販売業者は、次に掲げるところにより、法第三十一条の五第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 次に掲げる区域管理者の権限を明らかにすること。

イ 区域内において配置販売に従事する配置員その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関する権限

ロ イに掲げるもののほか、区域の管理に関する権限

二 次に掲げる法第三十一条の五第一項第二号に規定する体制を整備すること。

イ 区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

ロ 配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

ハ イ及びロに掲げるもののほか、配置販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の配置販売業者の業務の適正を確保するための体制

三 次に掲げる法第三十一条の五第一項第三号に規定する措置を講ずること。

イ 配置販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。

ロ 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。

ハ 配置販売業者が二以上の許可を受けている場合にあつては、当該許可を受けている全ての区域において法第三十一条の五による法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要な措置

ニ ハの場合であつて、二以上の区域の法令遵守体制を確保するために配置販売業者(配置販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置

(1) 配置販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにすること。

(2) 配置販売業者を補佐する者が二以上の区域の法令遵守体制を確保するために区域管理者から必要な情報を収集し、当該情報を配置販売業者に速やかに報告するとともに、当該配置販売業者からの指示を受けて、区域管理者に対して当該指示を伝達するための措置

(3) 配置販売業者が二以上の区域の法令遵守体制を確保するために配置販売業者を補佐する者から必要な情報を収集し、配置販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措置

ホ 医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適切に行われ、かつ、第四百四十九条の五に規定する配置販売業者の義務が履行されるために必要な措置

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置

(区域における登録販売者の継続的研修)

第四百四十九条の十六 配置販売業者は、その区域において実務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならない。

2 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 研修の実施場所

4421 3 前項の届出を行った者(次項において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。

4422 一 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。

4424 イ 医薬品に共通する特性と基本的な知識

4425 ロ 人体の働きと医薬品

4426 ハ 主な医薬品とその作用

4427 ニ 薬事に関する法規と制度

4428 ホ 医薬品の適正使用と安全対策

4429 ヘ リスク区分等の変更があつた医薬品

4430 ト 区域の管理に関する事項

4431 チ その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

4432 二 前号に掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。

4433 三 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

4434 4 研修実施機関については、第十五条の十一の三第四項から第七項までの規定を準用する。

4435

4436 (配置従事の届出事項)

4437 第五十条 法第三十二条の規定により、配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次の

4438 とおりとする。

4439 一 配置販売業者の氏名及び住所

4440 二 配置販売に従事する者の氏名及び住所

4441 三 配置販売に従事する区域及びその期間

4442

4443 (配置従事者の身分証明書)

4444 第五十一条 法第三十三条第一項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第八十四による申請書を

4445 住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

4446 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先

4447 とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を經由して厚生労働大臣に提出された書類(第二

4448 号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

4449 一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・二センチメートル、横の長さ二・

4450 四センチメートルの写真

4451 二 申請者が配置員であるときは、雇用契約書の写しその他配置販売業者のその配置員に対する使用関係を証

4452 する書類

4453

4454 第五十二条 法第三十三条第一項の身分証明書は、様式第八十五によるものとする。

4455 2 前項の身分証明書の有効期間は、発行の日から発行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。

4456

4457 (卸売販売業者からの医薬品の販売等)

4458 第五十八条の二 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品を、配置

4459 販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。

4460

4461 (薬局医薬品の販売等)

4462 第五十八条の七 薬局開設者は、法第三十六条の三第一項の規定により、薬局医薬品につき、次に掲げる方法に

4463 より、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

4464 一 当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該薬局医薬品を使用しようとする者であるこ

4465 とを確認させること。この場合において、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該薬

4466 局医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該者が法第三十六条の三第二項に規定する薬剤師等である

- 4467 場合を除き、同項の正当な理由の有無を確認させること。
- 4468 二 当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該薬局医薬品を使用しようとする者の他の薬
- 4469 局開設者からの当該薬局医薬品の購入又は譲受けの状況を確認させること。
- 4470 三 前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又
- 4471 は授与させること。
- 4472 四 法第三十六条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を
- 4473 理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。
- 4474 五 当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第三十六条の四第四
- 4475 項の規定による情報の提供又は指導を行つた後に、当該薬局医薬品を販売し、又は授与させること。
- 4476 六 法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導のため必要があると認めるときは、当該薬局医
- 4477 薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬局医薬品を販売し、又は授与さ
- 4478 せること。
- 4479 七 当該薬局医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局の名称及び当該薬局の電話番号その他連
- 4480 絡先を、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

4481  
4482 (薬局医薬品に係る情報提供及び指導の方法等)

4483 第五十八条の八 薬局開設者は、法第三十六条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方

4484 法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

- 4485 一 当該薬局内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報
- 4486 を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。)において行わせること。
- 4487 二 当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該
- 4488 薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者
- 4489 又は当該薬局医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。
- 4490 三 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持
- 4491 する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。
- 4492 四 当該薬局医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させ
- 4493 ること。
- 4494 五 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無につい
- 4495 て確認させること。
- 4496 六 必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。
- 4497 七 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。
- 4498 八 当該情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

4499 2 法第三十六条の四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 4500 一 当該薬局医薬品の名称
- 4501 二 当該薬局医薬品の有効成分の名称及びその分量
- 4502 三 当該薬局医薬品の用法及び用量
- 4503 四 当該薬局医薬品の効能又は効果
- 4504 五 当該薬局医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
- 4505 六 その他当該薬局医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

4506 3 法第三十六条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙

4507 面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

4508 4 法第三十六条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 4509 一 年齢
- 4510 二 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
- 4511 三 性別
- 4512 四 症状

- 4513 五 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはそ
- 4514 の診断の内容
- 4515 六 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
- 4516 七 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
- 4517 八 授乳しているか否かの別
- 4518 九 当該薬局医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
- 4519 十 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別
- 4520 並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量
- 4521 及び服用の状況
- 4522 十一 その他法第三十六条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

4523

4524 第一百五十八条の九 薬局開設者は、法第三十六条の四第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方

4525 法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

- 4526 一 当該薬局医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わ
- 4527 せること。
- 4528 二 当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該
- 4529 薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局において当該薬局医薬品を購入し、若しくは譲り
- 4530 受けようとする者又はその薬局において当該薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの
- 4531 者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該薬局医薬品を使用する者の状況に応じて個別に提供させ、
- 4532 又は必要な指導を行わせること。
- 4533 三 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の
- 4534 提供又は指導を行わせること。
- 4535 四 必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。
- 4536 五 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。
- 4537 六 当該情報の提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること。

4538

4539 第一百五十八条の九の二 法第三十六条の四第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬局医薬品の適正な使用

4540 のため、情報の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が

4541 認める場合とする。

- 4542 2 前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事
- 4543 する薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。
- 4544 一 第一百五十八条の八第四項第一号から第十号までに掲げる事項
- 4545 二 当該薬局医薬品の服薬状況
- 4546 三 当該薬局医薬品を使用する者の服薬中の体調の変化
- 4547 四 その他法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項

4548 3 薬局開設者は、法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬

4549 局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

- 4550 一 当該薬局医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わ
- 4551 せること。
- 4552 二 当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該
- 4553 薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局において当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受け
- 4554 た者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。
- 4555 三 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の
- 4556 提供又は指導を行わせること。
- 4557 四 必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。

4558

4559 五 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。

4560 六 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

4561  
4562 (薬局製造販売医薬品の特例)

4563 第一百五十八条の十 薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する場合について第  
4564 百五十八条の七(第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)、第一百五十八条の八第一項(第六号に係る部分を  
4565 除く。)及び第四項並びに第一百五十八条の九(第四号に係る部分を除く。)の規定を適用する場合には、第百  
4566 五十八条の七第四号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第五号  
4567 中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、第一百五十八条の八第一項各号列記以外の部分中「提供及び指導」と  
4568 あるのは「提供」と、同項第一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「提供し、及び指導を行う」とあ  
4569 るのは「提供する」と、「ある場所」とあるのは「ある場所、同令第一条第一項第五号に規定する医薬品を通常  
4570 陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局内の場所」と、同項第二号中「提  
4571 供させ、及び必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同項第三号中「所持しない場合はその所持  
4572 を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は」とあるのは「所持する場合は」と、「提供及び指導」とあるのは「提  
4573 供」と、同項第五号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同項第八号  
4574 及び同条第四項第十一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、第一百五十八条の九各号列記以外の部分中  
4575 「提供又は指導」とあるのは「提供」と、同条第二号中「提供させ、又は必要な指導を行わせる」とあるのは「提  
4576 供させる」と、同条第三号及び第六号中「提供又は指導」とあるのは「提供」とする。

4577 2 前項に規定する場合には、第一百五十八条の七(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。)、  
4578 第一百五十八条の八第一項(第六号に係る部分に限る。)、第一百五十八条の九(第四号に係る部分に限る。)  
4579 及び第一百五十八条の九の二の規定を適用しない。

4580 3 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品の特定販売を行う場合においては、当該薬局製造販売医薬品を購入し、若  
4581 しくは譲り受けようとする者又は当該薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの  
4582 者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該薬局製造販売医薬品を使用する者が令第七十四条の二第一  
4583 項の規定により読み替えて適用される法第三十六条の四第四項の規定による情報の提供を対面又は電話により  
4584 行うことを希望する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面又は電話によ  
4585 り、当該情報の提供を行わせなければならない。

4586  
4587 (要指導医薬品の販売等)

4588 第一百五十八条の十一 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の五第一項の規定により、要指導医薬品に  
4589 つき、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、  
4590 又は授与させなければならない。

4591 一 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であ  
4592 ることを確認させること。この場合において、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、  
4593 当該要指導医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該者が法第三十六条の五第二項の薬剤師等である  
4594 場合を除き、同項の正当な理由の有無を確認させること。

4595 二 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該要指導医薬品を使用しようとする者の他  
4596 の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認させること。

4597 三 前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又  
4598 は授与させること。

4599 四 法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を  
4600 理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。

4601 五 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第三十六条の六第  
4602 四項の規定による情報の提供又は指導を行つた後に、当該要指導医薬品を販売し、又は授与させること。

4603 六 当該要指導医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局又は店舗  
4604 の電話番号その他連絡先を、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

4605  
4606  
4607  
4608  
4609  
4610  
4611  
4612  
4613  
4614  
4615  
4616  
4617  
4618  
4619  
4620  
4621  
4622  
4623  
4624  
4625  
4626  
4627  
4628  
4629  
4630  
4631  
4632  
4633  
4634  
4635  
4636  
4637  
4638  
4639  
4640  
4641  
4642  
4643  
4644  
4645  
4646  
4647  
4648  
4649  
4650

(要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等)

第一百五十八条の十二 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

一 当該薬局又は店舗内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。)において行わせること。

二 当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該要指導医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。

三 当該要指導医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。

四 当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。

五 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること。

六 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。

七 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。

八 当該情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること。

2 法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該要指導医薬品の名称

二 当該要指導医薬品の有効成分の名称及びその分量

三 当該要指導医薬品の用法及び用量

四 当該要指導医薬品の効能又は効果

五 当該要指導医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

六 その他当該要指導医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

3 法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

4 法第三十六条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 年齢

二 他の薬剤又は医薬品の使用の状況

三 性別

四 症状

五 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容

六 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名

七 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数

八 授乳しているか否かの別

九 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

十 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況

十一 その他法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項



4651  
4652  
4653  
4654  
4655  
4656  
4657  
4658  
4659  
4660  
4661  
4662  
4663  
4664  
4665  
4666  
4667  
4668  
4669  
  
4670  
4671  
4672  
4673  
4674  
4675  
4676  
4677  
4678  
4679  
4680  
4681  
4682  
4683  
4684

第百五十九条 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

- 一 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。
- 二 当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局若しくは店舗において当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該要指導医薬品を使用する者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。
- 三 当該要指導医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。
- 四 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。
- 五 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。
- 六 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

(法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間)

第百五十九条の二 法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

<u>一 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品</u>	<u>法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間（同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間）に一年を加えた期間</u>
<u>二 法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査（医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第二条第三項に規定する市販直後調査を除く。）を実施する義務が課せられている医薬品</u>	<u>製造販売の承認の条件として付された調査期間に一年を加えた期間</u>
<u>三 前二号に掲げる医薬品以外の医薬品</u>	<u>零</u>

(登録販売者試験)

第百五十九条の三 法第三十六条の八第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。

2 筆記試験は、次の事項について行う。

- 一 医薬品に共通する特性と基本的な知識
- 二 人体の働きと医薬品
- 三 主な医薬品とその作用
- 四 薬事に関する法規と制度
- 五 医薬品の適正使用と安全対策

第百五十九条の四 登録販売者試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。

2 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。

(受験の申請)

4685 第一百五十九条の五 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者につい  
 4686 ては、その国籍。第一百五十九条の八第一項第二号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を  
 4687 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場  
 4688 所の都道府県知事に提出しなければならない。

4689 (合格の通知及び公示)

4691 第一百五十九条の六 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを通知するとと  
 4692 もに、合格した者の受験番号を公示する。

4693 (販売従事登録の申請)

4694 第一百五十九条の七 販売従事登録を受けようとする者は、様式第八十六の二による申請書を医薬品の販売又は授  
 4695 与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあつては、配置しようとする  
 4696 区域をその区域に含む都道府県の知事。以下この条において同じ。))に提出しなければならない。

4697 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先  
 4698 とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類につ  
 4699 いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

4700 一 販売従事登録を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)が登録販売者試験に合格し  
 4701 たことを証する書類

4702 二 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記  
 4703 載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本  
 4704 又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二  
 4705 年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限り。))又は住民票記載事項証明書  
 4706 (同法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したも  
 4707 の)に限る。))

4708 三 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行  
 4709 うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

4710 四 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品  
 4711 の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類

4712 3 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようとする者は、当該申請を行った都道府県知事のうち  
 4713 いずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

4714 4 法第三十六条の八第三項において準用する法第五条第三号への厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障  
 4715 害により登録販売者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな  
 4716 い者とする。

4717 (登録販売者名簿及び登録証の交付)

4718 第一百五十九条の八 販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。

4719 一 登録番号及び登録年月日

4720 二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別

4721 三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名

4722 四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知  
 4723 事が必要と認める事項

4724 2 都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、様式第八十六の三に  
 4725 よる登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。

4726 (登録販売者名簿の登録事項の変更)

4727 第一百五十九条の九 登録販売者は、前条第一項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出

なければならぬ。

2 前項の届出をするには、様式第八十六の四による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

(販売従事登録の消除)

第一百五十九条の十 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

2 登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3 前二項の申請をするには、様式第八十六の五による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

4 登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。

5 都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。

一 第一項又は第二項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたことが確認されたとき

二 法第五条第三号イからへまでのいずれかに該当するに至ったとき

三 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき

(販売従事登録証の書換え交付)

第一百五十九条の十一 登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第八十六の六による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

(販売従事登録証の再交付)

第一百五十九条の十二 登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失つたときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第八十六の七による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

3 販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が第一項の申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。

4 登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失つた販売従事登録証を発見したときは、五日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

(販売従事登録証の返納)

第一百五十九条の十三 登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。第一百五十九条の十第二項の規定により販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2 登録販売者は、登録を消除されたときは、前項に規定する場合を除き、五日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。

(一般用医薬品の販売等)

第一百五十九条の十四 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、第一類医

4777 薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局、店舗又は区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販売  
 4778 に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

4779 一 法第三十六条の十第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を受けた者  
 4780 が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。

4781 二 当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第三十六条の十第  
 4782 五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を行つた後に、当該第一類医薬品を  
 4783 販売し、又は授与させること。

4784 三 当該第一類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又  
 4785 は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝え  
 4786 させること。

4787 2 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、第二類医薬品又は第三類医  
 4788 薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局、店舗又は区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販売  
 4789 に従事する薬剤師又は登録販売者に販売させ、又は授与させなければならない。

4790 一 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法  
 4791 第三十六条の十第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を行つた後に、当  
 4792 該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与させること。

4793 二 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該薬局又は  
 4794 店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第二類医薬品又は第三類  
 4795 医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

4796  
 4797 (一般用医薬品に係る情報提供の方法等)

4798 第一百五十九条の十五 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を、次  
 4799 に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければな  
 4800 らない。

4801 一 当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条  
 4802 第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一条第一項第五号若しくは第二条  
 4803 第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬  
 4804 局若しくは店舗内の場所をいう。次条において同じ。)において行わせること。

4805 二 当該第一類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第一類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の  
 4806 当該第一類医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該第一類医薬品を購入し、若しくは譲り受けよう  
 4807 とする者又は当該第一類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること。

4808 三 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報  
 4809 の提供を行わせること。

4810 四 当該第一類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明さ  
 4811 せること。

4812 五 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問の有無について確認させること。

4813 六 必要に応じ、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。

4814 七 当該情報の提供を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

4815 2 法第三十六条の十第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

4816 一 当該第一類医薬品の名称

4817 二 当該第一類医薬品の有効成分の名称及びその分量

4818 三 当該第一類医薬品の用法及び用量

4819 四 当該第一類医薬品の効能又は効果

4820 五 当該第一類医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

4821 六 その他当該第一類医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

4822 3 法第三十六条の十第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙

- 4823 面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
- 4824 4 法第三十六条の十第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 4825 一 年齢
- 4826 二 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
- 4827 三 性別
- 4828 四 症状
- 4829 五 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその
- 4830 診断の内容
- 4831 六 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
- 4832 七 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
- 4833 八 授乳しているか否かの別
- 4834 九 当該第一類医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
- 4835 十 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別
- 4836 並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量
- 4837 及び服用の状況
- 4838 十一 その他法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を行うために確認が必要な事項
- 4839
- 4840 第一百五十九条の十六 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を、次
- 4841 に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行
- 4842 わせるよう努めなければならない。
- 4843 一 当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所において行わせること。
- 4844 二 前条第二項各号に掲げる事項について説明を行わせること。この場合において、同項各号中「第一類医薬
- 4845 品」とあるのは「第二類医薬品」と、同項第六号中「薬剤師」とあるのは「薬剤師又は登録販売者」と読み替
- 4846 えて適用する。
- 4847 三 当該第二類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第二類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の
- 4848 当該第二類医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該第二類医薬品を購入し、若しくは譲り受けよう
- 4849 とする者又は当該第二類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること。
- 4850 四 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報
- 4851 の提供を行わせること。
- 4852 五 当該第二類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明さ
- 4853 せること。
- 4854 六 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問の有無について確認させること。
- 4855 七 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。
- 4856 八 当該情報の提供を行った薬剤師又は登録販売者の氏名を伝えさせること。
- 4857 2 法第三十六条の十第四項の厚生労働省令で定める事項は、前条第四項各号に掲げる事項とする。この場合に
- 4858 において、同項第九号中「第一類医薬品」とあるのは「第二類医薬品」と、同項第十一号中「第三十六条の第十
- 4859 一項」とあるのは「第三十六条の十第三項」と読み替えて適用する。
- 4860
- 4861 第一百五十九条の十七 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第五項の規定による情報の提供を、次
- 4862 に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行
- 4863 わせなければならない。
- 4864 一 第一類医薬品の情報の提供については、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤
- 4865 師に行わせること。
- 4866 二 第二類医薬品又は第三類医薬品の情報の提供については、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授
- 4867 与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせること。
- 4868 三 当該一般用医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行

4869 わせること。

4870 四 当該一般用医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該一般用医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の  
4871 当該一般用医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を  
4872 購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若  
4873 しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用  
4874 する者の状況に応じて個別に提供させること。

4875 五 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報  
4876 の提供を行わせること。

4877 六 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。

4878 七 当該情報の提供を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名を伝えさせること。

4879 2 薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の特定販売を行う場合においては、当該一般用医薬品を購入  
4880 し、若しくは譲り受けようとする者又は当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの  
4881 者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者が法第三十六条の十第五項の規  
4882 定による情報の提供を対面又は電話により行うことを希望する場合は、その薬局又は店舗において医薬品の販  
4883 売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により、当該情報の提供を行わせなければならない。

4885 (準用)

4887 第五十九条の十八 配置販売業者については、前三条(前条第二項を除く。)の規定を準用する。この場合におい  
4888 て、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第五十九条の十五第一項  
4889 各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一  
4890 項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所  
4891 (薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備があ  
4892 る場所若しくは同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付  
4893 する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条において同じ。)」  
4894 とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「情報を、」とあるのは「情報を、配  
4895 置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項各号列記以外の部分中「第三十六条  
4896 の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、同項第六号中「販売し、又  
4897 は授与する」とあるのは「配置する」と、同条第三項中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十  
4898 第七項において準用する同条第一項」と、同条第四項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第二項」とあるの  
4899 は「第三十六条の十第七項において準用する同条第二項」と、同項第十一号中「第三十六条の十第一項」とある  
4900 のは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、第五十九条の十六第一項各号列記以外の部分  
4901 中「第三十六条の十第三項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第三項」と、「薬局又は  
4902 店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所」とあるのは「当該  
4903 区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「前条第二項各号」とあるのは「第五十九条の十八に  
4904 において準用する前条第二項各号」と、同項第三号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、  
4905 「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項中「第三十六条の十第四項」とあるのは「第三十六条の十  
4906 第七項において準用する同条第四項」と、「前条第四項各号」とあるのは「第五十九条の十八において準用す  
4907 る前条第四項各号」と、「第三十六条の十第一項」とあるのは「同条第一項」と、「第三十六条の十第三項」とあ  
4908 るのは「同条第三項」と、前条第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第五項」とあるのは「第三十六条  
4909 の十第七項において準用する同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号及び第二号  
4910 中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第四号中「その薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を  
4911 購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若し  
4912 しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用す  
4913 る者」とあるのは「配置販売によつて当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した  
4914 当該一般用医薬品を使用する者」と読み替えるものとする。

4915  
4916  
4917  
4918  
4919  
4920  
4921  
4922  
4923  
4924  
4925  
4926  
4927  
4928  
4929  
4930  
4931  
4932  
4933  
4934  
4935  
4936  
4937  
4938  
4939  
4940  
4941  
4942  
4943  
4944  
4945  
4946  
4947  
4948  
4949  
4950  
4951  
4952  
4953  
4954  
4955  
4956  
4957  
4958  
4959  
4960

(変更の届出)

第一百五十九条の十九 法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所
- 二 店舗の構造設備の主要部分
- 三 通常の営業日及び営業時間
- 四 店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
- 五 店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
- 六 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の第三十九条第三項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
- 七 当該店舗において併せ行う店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

2 法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第一百五十九条の十九第一項第四号」と、同条第三項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第一百五十九条の十九第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第一百五十九条の十九第一項第四号又は第五号」と読み替えるものとする。

第一百五十九条の二十 法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 二 特定販売の実施の有無
- 三 第三十九条第四項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。)

2 法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の規定による届出については、第十六条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第一百五十九条の二十第二項において準用する前項」と、「第一条第四項各号」とあるのは「第三十九条第四項各号」と読み替えるものとする。

第一百五十九条の二十一 法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 配置販売業者の氏名(配置販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所
- 二 営業の区域
- 三 通常の営業日及び営業時間
- 四 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 五 区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
- 六 区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
- 七 当該区域において配置販売によつて販売し、又は授与する医薬品の第四十八条第二項第八号イからニまでに掲げる区分
- 八 当該区域において併せ行う配置販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

2 法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第一百五十九条の二十一第一項第五号」と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を

4961 設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。）」とあるのは  
 4962 「都道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第二百五十九条の二十一第一項第一  
 4963 号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第二百五十九条の二十一第一項第五号又は第六号」  
 4964 と読み替えるものとする。

4965  
 4966 第二百五十九条の二十二 法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の厚生労働省  
 4967 令で定める事項は、次のとおりとする。

4968 一 卸売販売業者の氏名(卸売販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を合  
 4969 む。)又は住所

4970 二 営業所の名称

4971 三 営業所の構造設備の主要部分

4972 四 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

4973 五 医薬品営業所管理者の氏名又は住所

4974 六 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類

4975 七 当該営業所において併せ行う卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

4976 2 法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出については、第  
 4977 十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百  
 4978 五十九条の二十二第一項第五号」と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を  
 4979 設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。）」とあるのは  
 4980 「都道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第二百五十九条の二十二第一項第一  
 4981 号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第二百五十九条の二十二第一項第五号」と、「管  
 4982 理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは「医薬品営業  
 4983 所管理者」と読み替えるものとする。

4984  
 4985 (休廃止等の届書の様式)

4986 第二百五十九条の二十三 店舗販売業の店舗、配置販売業若しくは卸売販売業の営業所を廃止し、休止し、又は休止  
 4987 した店舗販売業の店舗、配置販売業若しくは卸売販売業の営業所を再開した場合における法第三十八条第一項  
 4988 又は第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつ  
 4989 て行うものとする。

4990  
 4991 (毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)

4992 第二百五条 法第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。

4993  
 4994 (処方箋医薬品の譲渡に関する帳簿)

4995 第二百九条 法第四十九条第二項の規定により、同条第一項に規定する医薬品の販売又は授与に関して帳簿に記  
 4996 載しなければならない事項は、次のとおりとする。

4997 一 品名

4998 二 数量

4999 三 販売又は授与の年月日

5000 四 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名及びその者の住所又はその者の勤務する病院若しくは  
 5001 診療所若しくは家畜診療施設の名称及び所在地

5002 五 購入者又は譲受人の氏名及び住所

5003  
 5004 (要指導医薬品の表示)

5005 第二百九条の二 法第五十条第六号の厚生労働省令で定める事項は、「要指導医薬品」の文字とする。

5006



2 前項の文字は黒枠の中に黒字で記載しなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明瞭に判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。

3 第一項の文字については、産業標準化法(昭和二十四年法律第八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)の八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため当該文字を明瞭に記載することができない場合は、この限りではない。

(法第三十六条の七第一項に規定する区分ごとの表示)

第二百九条の三 法第五十条第七号の厚生労働省令で定める事項については、次の表の上欄に掲げる法第三十六条の七第一項に規定する区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

一 第一類医薬品	第1類医薬品
二 第二類医薬品	第2類医薬品
三 第三類医薬品	第3類医薬品

2 前項の表の下欄に掲げる字句の記載については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の文字」とあるのは「第二百九条の三第一項の表の下欄に掲げる字句」と、同条第三項中「第一項の文字」とあるのは「第二百九条の三第一項の表の下欄に掲げる字句」と、「文字を」とあるのは「文字及び数字を」と読み替えるものとする。

(医薬品の直接の容器等の記載事項)

第二百十条 法第五十条第十五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 専ら他の医薬品の製造の用に供されることを目的として医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される医薬品(以下「製造専用医薬品」という。)にあつては、「製造専用」の文字
- 二 法第十九条の二第一項の承認を受けた医薬品にあつては、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所
- 三 法第二十三条の二の十七第一項の承認を受けた体外診断用医薬品にあつては、外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所
- 四 基準適合性認証を受けた指定高度管理医療機器等(体外診断用医薬品に限る。)であつて本邦に輸出されるものにあつては、外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所
- 五 法第三十一条に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の一般用医薬品にあつては、「店舗専用」の文字
- 六 指定第二類医薬品にあつては、枠の中に「2」の数字
- 七 分割販売される医薬品にあつては、分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う薬局、店舗又は営業所の名称及び所在地

(容器等への符号の記載)

第二百十条の二 法第五十二条第一項(令第七十五条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の厚生労働省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、同項に規定する符号(同項に規定する医薬品の容器又は被包に記載されたバーコード又は二次元コードをいう。以下同じ。)を用いて法第六十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する注意事項等情報が掲載されている機構のホームページを閲覧する方法とする。

(添付文書等への記載を要する医薬品)

第二百十条の三 法第五十二条第二項の厚生労働省令で定める医薬品は、次に掲げるものとする。

- 一 要指導医薬品

5048 二 一般用医薬品

5049 三 薬局製造販売医薬品

5050  
5051 (添付文書等の記載)

5052 第二百十七条 法の規定により医薬品に添付する文書又はその容器若しくは被包(以下「添付文書等」という。)に  
5053 記載されていない事項は、特に明瞭に記載されていない。

5054 2 日本薬局方に収められている医薬品であつて、添付文書等に日本薬局方で定められた名称と異なる名称が記  
5055 載されているものについては、日本薬局方で定められた名称は、少なくとも他の名称と同等程度に明瞭に記載  
5056 されていない。

5057  
5058 (邦文記載)

5059 第二百十八条 法第五十条から第五十二条までに規定する事項の記載は、邦文でされていない。

5060  
5061 (販売、授与等の禁止の特例)

5062 第二百十八条の二 製造販売業者が、その製造販売する医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定  
5063 める医薬品に限る。以下この条において同じ。)の法第五十二条第二項各号に掲げる事項(以下この条において「二  
5064 項医薬品注意事項等情報」という。)を変更した場合には、当該変更の際現に変更前の二項医薬品注意事項等情  
5065 報が記載された添付文書等が使用されている医薬品であつて、当該変更前に既に製造販売されているものにつ  
5066 いては、同項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを  
5067 要しない。

5068 2 製造販売業者が、その製造販売する医薬品の二項医薬品注意事項等情報を変更した場合には、当該変更の際  
5069 現に変更前の二項医薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用されている医薬品(前項に規定するもの  
5070 を除く。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、法第五十二条第二項の規定にかかわ  
5071 らず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。

5072 一 当該医薬品が、当該変更の日から起算して六月(法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとし  
5073 て厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の医薬品の二項医薬品注意事項等情報が変更された場合であつて、  
5074 変更後の二項医薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用された製品を速やかに製造販売すること  
5075 ができない場合にあつては、一年)以内に製造販売されるものであること。

5076 二 機構のホームページに変更後の二項医薬品注意事項等情報が掲載されていること。

5077 三 当該医薬品の製造販売業者が、当該医薬品を取り扱う薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施  
5078 設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その  
5079 他の医薬関係者に対して、二項医薬品注意事項等情報を変更した旨を速やかに情報提供すること。

5080 3 前項の場合であつても、当該医薬品の製造販売業者は、変更後の二項医薬品注意事項等情報が記載された添  
5081 付文書等が使用された医薬品を、できるだけ速やかに製造販売しなければならない。

5082  
5083 (薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列)

5084 第二百十八条の三 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条の二第二項(令第七十四条の四第一項の規定に  
5085 より読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品を  
5086 次に掲げる方法により陳列しなければならない。

5087 一 薬局製造販売医薬品を陳列する場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。  
5088 ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、  
5089 若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者  
5090 が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

5091 二 要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵  
5092 をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲  
5093 り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の

5094 触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

5095 三 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。

5096  
5097 (一般用医薬品の陳列)

5098 第二百十八条の四 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条の二第三項の規定により、一般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなければならない。

5100 一 第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

5104 二 指定第二類医薬品を陳列する場合には、薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号又は第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備から七メートル以内の範囲に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・ニメートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。

5110 三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように陳列すること。

5111 2 配置販売業者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。

5112  
5113  
5114 (封)

5115 第二百十九条 法第五十八条に規定する封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないように施さなければならない。

5116  
5117  
5118 (法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示)

5119 第二百十九条の二 法第五十九条第三号の厚生労働省令で定める文字は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

<u>一 法第二条第二項第二号に規定する医薬部外品</u>	<u>防除用医薬部外品</u>
<u>二 法第二条第二項第三号に規定する医薬部外品のうち、法第五十九条第七号に規定する厚生労働大臣が指定する医薬部外品</u>	<u>指定医薬部外品</u>
<u>三 法第二条第二項第三号に規定する医薬部外品のうち、前号に掲げる医薬部外品以外のもの</u>	<u>医薬部外品</u>

5121  
5122 第二百八十九条 法の規定により許可を受けて医薬品を業として販売又は授与する者(以下この条において「許可事業者」という。)が、二以上の許可を受けている場合であつて、当該者の保有する医薬品を、当該二以上の許可のうちの一の許可に基づき業務を行う場所から他の許可に基づき業務を行う場所へ移転したときは、当該移転前及び移転後の場所において、それぞれ次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、当該医薬品が医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)である場合に限る。)を書面に記載しなければならない。

- 5127 一 品名
- 5128 二 ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号)
- 5129 三 使用の期限
- 5130 四 数量
- 5131 五 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日

5132 2 許可事業者は、前項の書面を、法の規定により許可を受けて業務を行う場所ごとに、記載の日から三年間、保存しなければならない。

5133

5134  
5135  
5136  
5137  
5138  
5139  
5140  
5141  
5142  
5143  
5144  
5145  
5146  
5147  
5148  
5149  
5150  
5151  
5152  
5153  
5154  
5155  
5156  
5157  
5158  
5159  
5160  
5161  
5162  
5163  
5164  
5165  
5166  
5167  
5168  
5169  
5170  
5171  
5172  
5173  
5174  
5175  
5176  
5177  
5178  
5179

## ○ 薬局等構造設備規則（昭和36年厚生省令第2号）

### （薬局の構造設備）

#### 第一条 薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。
  - 二 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
  - 三 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  - 四 面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。
  - 五 医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所にあつては六〇ルツクス以上、調剤台の上にあつては一二〇ルツクス以上の明るさを有すること。
  - 六 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く。以下同じ。）、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、開店時間（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。）第十四条の三第一項に規定する開店時間をいう。以下同じ。）のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。
  - 七 冷暗貯蔵のための設備を有すること。
  - 八 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。
  - 九 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。
  - 十 次に定めるところに適合する調剤室を有すること。
    - イ 六・六平方メートル以上の面積を有すること。
    - ロ 天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
  - ハ 調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。
  - ニ 薬剤師不在時間（施行規則第一条第二項第二号に規定する薬剤師不在時間をいう。）がある薬局にあつては、閉鎖することができる構造であること。
- 十の二 薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
- イ 薬局製造販売医薬品を陳列するために必要な陳列棚その他の設備（以下「陳列設備」という。）を有すること。
  - ロ 薬局製造販売医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲（以下「薬局製造販売医薬品陳列区画」という。）に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、薬局製造販売医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
  - ハ 開店時間のうち、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。
- 十一 要指導医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
    - イ 要指導医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。
    - ロ 要指導医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲（以下「要指導医薬品陳列区画」という。）

5180 に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくは  
 5181 これらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよ  
 5182 う必要な措置が採られていること。ただし、要指導医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その  
 5183 他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若し  
 5184 くはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない  
 5185 陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

5186 ハ 開店時間のうち、要指導医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品陳列区画  
 5187 を閉鎖することができる構造のものであること。

5188 十二 第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。

5189 イ 第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。

5190 ロ 第一類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「第一類医薬品陳列区画」という。)

5191 に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくは  
 5192 これらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよ  
 5193 う必要な措置が採られていること。ただし、第一類医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その  
 5194 他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若し  
 5195 くはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない  
 5196 陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

5197 ハ 開店時間のうち、第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画  
 5198 を閉鎖することができる構造のものであること。

5199 十三 次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和  
 5200 三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四項及び第五項、第三十六条の四第  
 5201 一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行うた  
 5202 めの設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有するこ  
 5203 と。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。

5204 イ 調剤室に近接する場所にあること。

5205 ロ 薬局製造販売医薬品を陳列する場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にある  
 5206 こと。

5207 ハ 要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。

5208 ニ 第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。

5209 ホ 指定第二類医薬品(施行規則第一条第三項第五号に規定する指定第二類医薬品をいう。以下同じ。)を陳列  
 5210 する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵  
 5211 をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範  
 5212 囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若  
 5213 しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができ  
 5214 ないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。

5215 ヘ 二以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の医薬品を通常陳列し、又  
 5216 は交付する場所の内部にあること。

5217 十四 次に掲げる調剤に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、イからカまでに掲げる設備及び器具  
 5218 については、それぞれ同等以上の性質を有する設備及び器具を備えていれば足りるものとする。

5219 イ 液量器

5220 ロ 温度計(一〇〇度)

5221 ハ 水浴

5222 ニ 調剤台

5223 ホ 軟膏板

5224 ヘ 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒

5225 ト はかり(感量一〇ミリigramのものと感量一〇〇ミリigramのもの)

- 5226 チ ビーカー
- 5227 リ ふるい器
- 5228 ヌ へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
- 5229 ル メスピペット
- 5230 ヲ メスフラスコ又はメスシリンダー
- 5231 ワ 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
- 5232 カ ロート
- 5233 ヨ 調剤に必要な書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。))をもつて調製するものを含む。以下同じ。)
- 5234
- 5235 十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)
- 5236 第十条ただし書に規定する許可に係る薬局については、次に掲げる試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、試験検査台については、調剤台を試験検査台として用いる場合であつて、試験検査及び
- 5237 調剤の双方に支障がないと認められるとき、二、ホ、ト及びリに掲げる設備及び器具については、施行規則
- 5238 第十二条第一項に規定する登録試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合であつて、
- 5239 支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
- 5240
- 5241 イ 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回折装置
- 5242 ロ 試験検査台
- 5243 ハ デシケーター
- 5244 ニ はかり(感量一ミリグラムのもの)
- 5245 ホ 薄層クロマトグラフ装置
- 5246 ヘ 比重計又は振動式密度計
- 5247 ト pH計
- 5248 チ ブンゼンバーナー又はアルコールランプ
- 5249 リ 崩壊度試験器
- 5250 ヌ 融点測定器
- 5251 ル 試験検査に必要な書籍
- 5252 十六 営業時間のうち、特定販売(施行規則第一条第二項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)のみを
- 5253 行う時間がある場合には、都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項
- 5254 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。))又は特別区の区域にある場合においては、市長又は
- 5255 区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えているこ
- 5256 と。
- 5257 2 (略)
- 5258
- 5259 (店舗販売業の店舗の構造設備)
- 5260 第二条 店舗販売業の店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 5261 一 医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、店舗であることがその外
- 5262 観から明らかであること。
- 5263 二 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
- 5264 三 当該店舗販売業以外の店舗販売業の店舗又は薬局の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区
- 5265 別されていること。
- 5266 四 面積は、おおむね一三・二平方メートル以上とし、店舗販売業の業務を適切に行なうことができるもので
- 5267 あること。
- 5268 五 医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては六〇ルツクス以上の明るさを有すること。
- 5269 六 開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導
- 5270 医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。
- 5271 七 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限り

- 5272 でない。
- 5273 八 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。
- 5274 九 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。
- 5275 十 要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
- 5276 イ 要指導医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。
- 5277 ロ 要指導医薬品陳列区画に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しく
- 5278 は譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進
- 5279 入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、要指導医薬品を陳列しない場合又は
- 5280 鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若
- 5281 しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者
- 5282 が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
- 5283 ハ 開店時間のうち、要指導医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品陳列区画
- 5284 を閉鎖することができる構造のものであること。
- 5285 十一 第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
- 5286 イ 第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。
- 5287 ロ 第一類医薬品陳列区画に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購
- 5288 入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬
- 5289 品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、第一類医薬品を
- 5290 陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若
- 5291 しくは一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲
- 5292 り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りで
- 5293 ない。
- 5294 ハ 開店時間のうち、第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画
- 5295 を閉鎖することができる構造のものであること。
- 5296 十二 次に定めるところに適合する法第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行
- 5297 うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有す
- 5298 ること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。
- 5299
- 5300 イ 要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。
- 5301 ロ 第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。
- 5302 ハ 指定第二类医薬品を陳列する場合には、指定第二类医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範
- 5303 囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二类医薬品を陳列する陳列設備か
- 5304 ら一・二メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは一般用医
- 5305 薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一
- 5306 般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでな
- 5307 い。
- 5308 ニ 二以上の階に要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の
- 5309 要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。
- 5310 十三 営業時間のうち、特定販売のみを行う時間がある場合には、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を
- 5311 設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法
- 5312 に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えていること。

- 5313
- 5314 ○ **薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3**
- 5315 **号)抄**
- 5316 (薬局の業務を行う体制)

- 5317 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。  
5318 以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤  
5319 又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
- 5320 一 薬局の開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六  
5321 年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定する開店時間をいう。以下同じ。)  
5322 内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。ただし、薬剤師不在時間(同号に  
5323 規定する薬剤師不在時間をいう。以下同じ。)内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当  
5324 該薬局の業務を行うために勤務していること。
- 5325 二 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(前年における  
5326 総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じ  
5327 た数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数と  
5328 する。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によ  
5329 るものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生  
5330 じたときは、その端数は一とする。)以上であること。
- 5331 三 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、要指導医薬品又は第一類医薬品  
5332 を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が  
5333 勤務していること。
- 5334 四 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、第二類医薬品又は第三類医薬品  
5335 を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又  
5336 は登録販売者が勤務していること。
- 5337 五 営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲  
5338 り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの  
5339 者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第九条の四  
5340 第四項、第三十六条の四第四項、第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供  
5341 又は指導を行うための体制を備えていること。
- 5342 六 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数(施行規則第一条第五項第二号に規定する  
5343 週当たり勤務時間数をいい、特定販売(施行規則第一条第二項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)  
5344 のみに従事する勤務時間数を除く。以下この条及び次条において同じ。)の総和が、当該薬局の開店時間の一  
5345 週間の総和以上であること。
- 5346 七 一日当たりの薬剤師不在時間は、四時間又は当該薬局の一日の開店時間の二分の一のうちいずれか短い時  
5347 間を超えないこと。
- 5348 八 薬剤師不在時間内は、法第七条第一項又は第二項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時  
5349 間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること。
- 5350 九 薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合に近隣の薬局を紹介すること又は調剤に従事する薬剤師  
5351 が速やかに当該薬局に戻る事その他必要な措置を講じる体制を備えていること。
- 5352 十 要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局において要指導医薬品  
5353 又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局  
5354 内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一  
5355 条第一項第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。第九号において  
5356 同じ。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する  
5357 情報を提供するための設備がある場所をいう。第九号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬品  
5358 又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
- 5359 十一 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局において要指導医薬  
5360 品又は第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医  
5361 薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第一類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、  
5362 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。



十二 調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。

十三 法第九条の四第一項、第四項及び第五項の規定による情報の提供及び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。

十四 医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、法第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項の規定による情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務(医薬品の貯蔵及び要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う薬局にあつては、特定販売に関する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。

2 前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

一 医薬品の使用に係る安全な管理(以下「医薬品の安全使用」という。)のための責任者の設置

二 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備

三 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定

四 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施

五 調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施

六 薬剤師不在時間がある薬局にあつては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施

七 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のために必要となる情報の収集その他調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施

(店舗販売業の業務を行う体制)

第二条 法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

一 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師が勤務していること。

二 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。

三 営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。

四 当該店舗において、要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十二号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。第六号において同じ。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。第六号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。

五 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、当該店舗において要指導医薬品又は第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第一類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要

- 5409 指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
- 5410 六 法第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第
- 5411 三項及び第五項の規定による情報の提供その他の要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与の業務(要
- 5412 指導医薬品及び一般用医薬品の貯蔵並びに要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間
- 5413 以外の時間における対応に関する業務を含む。)に係る適正な管理(以下「要指導医薬品等の適正販売等」とい
- 5414 う。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う店舗にあつては、特定販売に関する
- 5415 研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
- 5416 2 前項第六号に掲げる店舗販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 5417 一 従事者から店舗販売業者への事故報告の体制の整備
- 5418 二 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定
- 5419 三 要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
- 5420 四 要指導医薬品等の適正販売等のために必要となる情報の収集その他要指導医薬品等の適正販売等の確保を
- 5421 目的とした改善のための方策の実施

5422

5423 (配置販売業の業務を行う体制)

- 5424 第三条 法第三十条第三項の規定に基づく厚生労働省令で定める配置販売業の都道府県の区域において医薬品の
- 5425 配置販売の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
- 5426 一 第一類医薬品を配置販売する配置販売業にあつては、第一類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該
- 5427 区域において薬剤師が勤務していること。
- 5428 二 第二类医薬品又は第三類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師又は登録販売者
- 5429 が勤務していること。
- 5430 三 当該区域において、薬剤師及び登録販売者が一般用医薬品を配置する勤務時間数の一週間の総和が、当該
- 5431 区域における薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の二分の一以上であること。
- 5432 四 第一類医薬品を配置販売する配置販売業にあつては、当該区域において第一類医薬品の配置販売に従事す
- 5433 る薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、当該区域において一般用医薬品の配置販売に従事する薬剤師及び
- 5434 登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の二分の一以上であること。
- 5435 五 法第三十六条の十第七項において準用する同条第一項、第三項及び第五項の規定による情報の提供その他
- 5436 の一般用医薬品の配置販売の業務に係る適正な管理(以下「一般用医薬品の適正配置」という。)を確保するた
- 5437 め、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
- 5438 2 前項第五号に掲げる配置販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 5439 一 従事者から配置販売業者への事故報告の体制の整備
- 5440 二 一般用医薬品の適正配置のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
- 5441 三 一般用医薬品の適正配置のために必要となる情報の収集その他一般用医薬品の適正配置の確保を目的とし
- 5442 た改善のための方策の実施

5443

5444

5445 ○ 医療法（昭和23年法律第205号）抄

5446 (医療の基本理念)

5447 第一条の二

- 5448 2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病
- 5449 院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設（以下「医療提供施設」とい
- 5450 う。）、医療を受ける者の居宅等（居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。）において、医療提
- 5451 供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提
- 5452 供されなければならない。
- 5453

5454 ○ 食品安全基本法（平成15年法律第48号）抄

5455 （定義）

5456 第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等  
5457 に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。）  
5458 をいう。

5459

5460 ○ 食品衛生法（昭和22年法律第233号）抄

5461 （国及び都道府県等の責務）

5462 第二条 国、都道府県、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める市  
5463 （以下「保健所を設置する市」という。）及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正し  
5464 い知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に  
5465 関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置  
5466 を講じなければならない。

5467

5468 （定義）

5469 第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確  
5470 保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、こ  
5471 れを含まない。

5472

5473 ○ 健康増進法（平成14年法律第103号）抄

5474 （特別用途表示の許可）

5475 第四十三条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に  
5476 適する旨の表示（以下「特別用途表示」という。）をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければなら  
5477 ない。

5478 2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成  
5479 分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総  
5480 理大臣に提出しなければならない。

5481 3 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」という。）に、第一項の  
5482 許可を行うについて必要な試験（以下「許可試験」という。）を行わせるものとする。

5483 4 第一項の許可を申請する者は、実費（許可試験に係る実費を除く。）を勘案して政令で定める額の手数料を国に、  
5484 研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試  
5485 験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登  
5486 録試験機関に納めなければならない。

5487 5 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければなら  
5488 ない。

5489 6 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品（以下「特別用途食品」という。）につき、  
5490 内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。

5491 7 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働  
5492 大臣に協議しなければならない。

5493

5494 （特別用途表示の承認）

5495 第六十三条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理  
5496 大臣の承認を受けることができる。

5497 2 第四十三条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の規定は同項の承認に

5498 係る食品について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、  
 5499 「貯蔵施設」と読み替えるものとする。

5500  
 5501 (誇大表示の禁止)

5502 第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効  
 5503 果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実  
 5504 に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

5505 2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議  
 5506 しなければならない。

5507  
 5508 (権限の委任)

5509 第六十九条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に  
 5510 委任することができる。

5511 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長  
 5512 に委任することができる。

5513 3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

5514 4 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は  
 5515 地方厚生支局長に委任することができる。

5516 5 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果につい  
 5517 て消費者庁長官に報告するものとする。

5518  
 5519 ○ **食品表示法（平成25年法律第70号）抄**

5520 (食品表示基準の策定等)

5521 第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分  
 5522 に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容  
 5523 とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。

- 5524 一 名称、アレルギー（食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。）、  
 5525 保存の方法、消費期限（食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条  
 5526 において同じ。）、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売を  
 5527 する際に表示されるべき事項

- 5528 二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項

5529 2～6 (略)

5530  
 5531 ○ **食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）抄**

5532 (定義)

5533 第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

5534 一～八 (略)

5535 九 特定保健用食品 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令（平成二十一年内閣府令  
 5536 第五十七号）第二条第一項第五号に規定する食品（容器包装に入れられたものに限る。）をいう。

5537 十 機能性表示食品 疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳  
 5538 婦を除く。）に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的（疾病リスクの  
 5539 低減に係るものを除く。）が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品（健康増進法（平  
 5540 成十四年法律第百三号）第四十三条第一項の規定に基づく許可又は同法第六十三条第一項の規定に基づく承  
 5541 認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品（以下「特別用途食品」という。）、栄養機能食品、アルコ  
 5542 ールを含有する飲料及び国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与

えているものとして健康増進法施行規則（平成十五年厚生労働省令第八十六号）第十一条第二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除く。）であつて、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。

十一 栄養機能食品 食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分（ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあつては、カリウムを除く。）の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品（特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。）をいう。

十二～二十 （略）

## ○ 不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）抄

（目的）

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第三十一条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。

2 この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。第四十条において同じ。）の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。

一 二以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である一般社団法人その他の社団

二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団

三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体

3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引（不動産に関する取引を含む。以下同じ。）に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

4 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

（景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示）

第三条 内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

2 前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

5588 (景品類の制限及び禁止)

5589 第四条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するた  
5590 め必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の  
5591 提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

5592  
5593 (不当な表示の禁止)

5594  
5595 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしては  
5596 ならない。

- 5597 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であ  
5598 ると示し、又は事実と相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業  
5599 者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的  
5600 かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
- 5601 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若  
5602 しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤  
5603 認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ  
5604 があると認められるもの
- 5605 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれが  
5606 ある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ  
5607 ると認めて内閣総理大臣が指定するもの

5608  
5609  
5610  
5611 (景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)

5612 第六条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定をし、又  
5613 はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業  
5614 者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

5615 2 前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

5616  
5617  
5618 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、  
5619 当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又は  
5620 これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既にな  
5621 くなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

- 5622 一 当該違反行為をした事業者
- 5623 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併  
5624 後存続し、又は合併により設立された法人
- 5625 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業  
5626 の全部又は一部を承継した法人
- 5627 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

5628 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断  
5629 するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合  
5630 理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しない  
5631 ときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

5632  
5633 (事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)

5634

5635 第二十六条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客  
5636 を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額  
5637 その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適  
5638 正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

5639 2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため  
5640 に必要な指針（以下この条において単に「指針」という。）を定めるものとする。

5641 3 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員  
5642 会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

5643 4 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5644 5 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

5645

5646 （指導及び助言）

5647

5648 第二十七条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な  
5649 実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をする  
5650 ことができる。

5651

5652 （勧告及び公表）

5653 第二十八条 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなく第二十六条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき  
5654 措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべ  
5655 き旨の勧告をすることができる。

5656 2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、そ  
5657 の旨を公表することができる。

5658

5659

5660 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項の規定による勧  
5661 告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に  
5662 対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員  
5663 に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う  
5664 場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

5665 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。  
5666

5667 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5668

5669 第三十条 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適格消費者団体（以下この条及び  
5670 第四十一条において単に「適格消費者団体」という。）は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次  
5671 の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予  
5672 防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に  
5673 必要な措置をとることを請求することができる。

5674 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品  
5675 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。

5676 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若  
5677 しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示  
5678 をすること。

5679 2 消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活

5680 協力員は、事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対して前項各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が同項の規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。

5683 3 前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第一項の規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

5685

(協定又は規約)

5687 第三十一条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。

5691 2 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない。

5693 一 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。

5695 二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

5696 三 不当に差別的でないこと。

5697 四 当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。

5698 3 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項の認定を受けた協定又は規約が前項各号のいずれかに適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。

5700 4 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。

5702 5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第七条第一項及び第二項（同法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。）、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の四第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。

5706

(協議)

5708 第三十二条 内閣総理大臣は、前条第一項及び第四項に規定する内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

5710

(権限の委任等)

5712 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。

5713 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。

5715 3 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、事業者に対し、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は第二十八条第一項の規定による勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限（第二十九条第一項の規定による権限に限る。）を当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任することができる。

5720 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。

5722 5 事業者の事業を所管する大臣は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

5724 6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限及び第四項の規定による権限（次項において「金融庁長官権限」と総称する。）について、その一部を証券取引等監視委員会に委任するこ

5725



- 5726 とができる。
- 5727 7 金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限（前項の規定により証券取引等監視委員会に委任  
5728 されたものを除く。）の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 5729 8 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第六項の規定により委任された権限の一部を財務局  
5730 長又は財務支局長に委任することができる。
- 5731 9 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会  
5732 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
- 5733 1049 第六項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は物件の提出の命令（第八項の規定により  
5734 財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。）についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行う  
5735 ことができる。
- 5736 1144 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、  
5737 都道府県知事が行うこととすることができる。
- 5738
- 5739
- 5740 （内閣府令への委任等）
- 5741 第三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
- 5742 2 第三十二条の規定は、内閣総理大臣が前項に規定する内閣府令（第三十一条第一項の協定又は規約について  
5743 定めるものに限る。）を定めようとする場合について準用する。
- 5744
- 5745
- 5746
- 5747 （関係者相互の連携）
- 5748
- 5749 第三十五条 内閣総理大臣、関係行政機関の長（当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機  
5750 関）、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、不当な景品類及び表示に  
5751 による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な  
5752 連携の確保に努めるものとする。
- 5753
- 5754 第三十六条 第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。  
5755 2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
- 5756
- 5757 第三十七条 第二十九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽  
5758 の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問  
5759 に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
- 5760
- 5761 第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は  
5762 財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。  
5763
- 5764 一 第三十六条第一項 三億円以下の罰金刑  
5765 二 前条 同条の罰金刑
- 5766 2 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の  
5767 各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金  
5768 刑を科する。
- 5769 一 第三十六条第一項 三億円以下の罰金刑  
5770 二 前条 同条の罰金刑
- 5771 3 前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又

5772 は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の規定を準用する。

5773

5774 第三十九条 第三十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置  
5775 を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人（当該法人で事業者団体に  
5776 該当するものを除く。）の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。

5777

5778 第四十条 第三十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を  
5779 講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員  
5780 若しくは管理人又はその構成事業者（事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が  
5781 構成事業者である場合には、当該事業者を含む。）に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。

5782 2 前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人そ  
5783 の他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。

5784

5785 第四十一条 第三十条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供  
5786 した適格消費者団体は、三十万円以下の過料に処する。

5787

5788 ○ 不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件（昭和37年  
5789 公正取引委員会告示第3号）抄

5790 1 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第2条第1項に規定する景品類とは、顧客を誘引する  
5791 ための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に  
5792 提供する物品金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値  
5793 引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務  
5794 に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。

5795 一 物品及び土地、建物その他の工作物

5796 二 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券

5797 三 きょう応（映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。）

5798 四 便益、労務その他の役務

5799 2 法第2条第4項に規定する表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は  
5800 役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、次に掲げるものをいう。

5801 一 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

5802 二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示（ダイレクトメ  
5803 ール、ファクシミリ等によるものを含む。）及び口頭による広告その他の表示（電話によるものを含む。）

5804 三 ポスター、看板（プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。）、ネオン・サイン、  
5805 アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告

5806 四 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。）、映写、演劇又は電  
5807 光による広告

5808 五 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示（インターネット、パソコン通信等によるものを含む。）

5809

5810 ○ 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限（昭和52年公正取引委員会告示第3号）抄

5811 1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額  
5812 を定めることをいう。

5813 一 くじその他偶然性を利用して定める方法

5814 二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法

5815 2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額（当該金額が十万円を超える

- 5816 場合にあつては、十万円）を超えてはならない。
- 5817 3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超えてはならない。
- 5818 4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、懸賞により景品類を提供するときは、景品類
- 5819 の最高額は三十万円を超えない額、景品類の総額は懸賞に係る取引の予定総額の百分の三を超えない額とする
- 5820 ことができる。ただし、他の事業者の参加を不当に制限する場合は、この限りでない。
- 5821 一 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
- 5822 二 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。ただし、中元、年末等の
- 5823 時期において、年三回を限度とし、かつ、年間通算して七十日の期間内で行う場合に限る。
- 5824 三 一定の地域において一定の種類 of 事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
- 5825 5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特
- 5826 定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。
- 5827
- 5828 ○ 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限（昭和52年公正取引委員会告示第5号）抄
- 5829 1 一般消費者に対して懸賞（「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」（昭和52年公正取引委員会告示
- 5830 第3号）第1項に規定する懸賞をいう。）によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価
- 5831 額の十分の二の金額（当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円）の範囲内であつて、正常な商慣習に照
- 5832 らして適当と認められる限度を超えてはならない。
- 5833 2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない。
- 5834 一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであつて、正常な商慣習に
- 5835 照らして適当と認められるもの
- 5836 二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
- 5837 三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な
- 5838 商慣習に照らして適当と認められるもの
- 5839 四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当
- 5840 と認められるもの
- 5841
- 5842

5843

## （参考）主な関係通知等

発出年月日	番号	標題
● II-1) 関係		
平成19年3月30日	薬食発第0330037号	一般用医薬品の区分の指定等について
平成19年3月30日	薬食安発第0330007号	一般用医薬品の区分リストについて
平成19年11月22日	薬食審査発第1122001号 薬食安発第1122001号	新たに承認された第一類医薬品について
平成20年1月25日	薬食審査発第0125003号 薬食安発第0125001号	新たに承認された第一類医薬品について
平成20年4月16日	薬食審査発第0416001号 薬食安発第0416001号	新たに承認された第一類医薬品について
平成20年7月7日	薬食審査発第0707001号 薬食安発第0707001号	新たに承認された第一類医薬品について
平成21年1月5日	薬食審査発第0105003号 薬食安発第0105001号	新たに承認された第一類医薬品について
平成21年2月23日	薬食審査発第0223009号 薬食安発第0223003号	新たに承認された第一類医薬品について
平成21年10月29日	薬食審査発1029第1号 薬食安発1029第1号	新たに承認された第一類医薬品について
平成22年1月22日	薬食審査発0122第1号 薬食安発0122第1号	新たに承認された第一類医薬品について
平成22年6月25日	薬食審査発0625第12号 薬食安発0625第9号	新たに承認された第一類医薬品について
平成22年11月5日	薬食審査発1105第1号 薬食安発1105第1号	新たに承認された第一類医薬品について
平成23年1月21日	薬食審査発0121第8号 薬食安発0121第5号	新たに承認された第一類医薬品について
平成23年1月28日	薬食審査発0128第1号 薬食安発0128第1号	新たに承認された第一類医薬品について
平成23年5月9日	薬食審査発0509第1号 薬食安発0509第1号	新たに承認された第一類医薬品について
平成23年5月19日	薬食審査発0519第1号 薬食安発0519第1号	新たに承認された第一類医薬品について
平成23年11月18日	薬食審査発1118第1号 薬食安発1118第1号	新たに承認された第一類医薬品について
平成24年9月28日	薬食審査発0928第1号 薬食安発0928第4号	新たに承認された第一類医薬品について
平成24年9月28日	薬食審査発0928第1号 薬食安発0928第4号	新たに承認された第一類医薬品について
平成27年3月13日	医薬食品局審査管理課 事務連絡	要指導医薬品として指定された医薬品について
平成20年10月8日	薬食安発第1008001号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成21年7月13日	薬食安発0713第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成21年12月24日	薬食安発1224第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成23年1月7日	薬食安発0107第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成23年5月30日	薬食安発0530第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成23年9月30日	薬食安発0930第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成23年12月26日	薬食安発1226第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成24年5月31日	薬食安発0531第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成24年9月4日	薬食安発0904第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成25年4月26日	薬食安発0426第4号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成25年1月11日	薬食安発0111第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成25年4月26日	薬食安発0426第4号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成25年12月16日	薬食安発1216第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成26年9月12日	薬食安発0912第1号	一般用医薬品の区分リストの変更について
平成27年1月22日	薬食安発0122第1号	「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について
平成27年4月6日	薬食安発0406第1号	「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について
平成27年9月25日	薬食安発0925第1号	「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について
平成28年9月21日	薬生安発0921第1号	「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について

試験問題の作成に関する手引き（平成30年令和4年3月）第4章 薬事関係法規・制度

平成28年10月19日	薬生安発10-19第1号	「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について
平成30年1月5日	薬生安発0-10-5第1号	「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について
平成26年9月26日	薬食安発09-26第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について
平成26年10月24日	薬食安発10-24第3号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について
平成26年12月5日	薬食安発12-05第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について
平成27年1月9日	薬食安発0-10-9第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について
平成27年10月19日	薬食安発10-19第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について
平成27年10月30日	薬生安発10-30第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について
平成28年2月1日	薬生安発0-20-1第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について
平成29年1月6日	薬生安発0-10-6第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について
平成29年1月13日	薬生安発0-1-13第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について
平成29年1月20日	薬生安発0-1-20第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について
平成29年7月7日	薬生安発0-70-7第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について
平成30年9月18日	薬生安発0-9-18第1号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について
平成31年1月10日	薬生薬審発0-1-10第1号 薬生安発0-1-10第3号	要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について
平成21年12月24日	薬食監麻発12-24第3号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成23年1月7日	薬食監麻発0-10-7第2号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成23年9月30日	薬食監麻発09-30第2号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成23年12月26日	薬食監麻発12-26第1号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成24年5月31日	薬食監麻発05-31第1号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成24年9月4日	薬食監麻発09-04第1号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成25年1月11日	薬食監麻発0-1-11第1号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成25年4月26日	薬食監麻発04-26第4号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成26年2月28日	薬食監麻発0-2-28第1号	一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成26年9月26日	薬食監麻発09-26第1号	医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成26年10月24日	薬食監麻発10-24第1号	医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成26年12月5日	薬食監麻発12-05第2号	医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成27年1月9日	薬食監麻発0-10-9第1号	医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
平成27年4月6日	薬食監麻発04-06第1号	医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
		「要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について」 「新たに承認された第一類医薬品について」 「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について」 「一般用医薬品の区分リストの変更について」

		「医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について」等により随時改正
平成20年5月21日	薬食発第0521001号	薬事法施行規則の一部を改正する省令の公布について
平成20年9月30日	薬食審査発第0930001号	一般用漢方製剤承認基準の制定について
平成23年10月14日	薬食安発1014第7号 薬食審査発1014第8号	一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意について
昭和46年6月1日	薬発第476号	無承認無許可医薬品の指導取締りについて
昭和59年5月21日	薬監第43号	無承認無許可医薬品の指導取締りの徹底について
昭和62年9月22日	薬監第88号	無承認無許可医薬品の監視指導について
平成21年2月20日	薬食発第0220001号	医薬品の範囲に関する基準の一部改正について
平成23年1月20日	薬食発0120第1号	医薬品の範囲に関する基準の一部改正について
平成24年1月23日	薬食発0123第3号	医薬品の範囲に関する基準の一部改正について
平成25年7月10日	薬食発0710第2号	医薬品の範囲に関する基準の一部改正について
平成27年4月1日	薬食発0401第2号	「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の一部改正について
平成14年11月8日	一般用医薬品承認審査合理化等検討会	中間報告「セルフメディケーションにおける一般用医薬品のあり方について」
平成2年6月 平成3年7月	セルフケア領域における検査薬に関する検討会	第一次報告 第二次報告
平成26年12月25日	薬食発1225第1号	体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用について
平成26年12月25日	薬食機参発1225第4号 薬食総発1225第1号	一般用検査薬の販売時の情報提供の充実について
昭和40年7月22日	薬事第129号	薬事法第四十七条の規定の解釈について
平成11年1月13日	医薬発第34号	毒劇物及び向精神薬等の医薬品の適正は保管管理及び販売等の徹底について
平成15年5月20日	医薬発第5200001号	生物由来製品及び特定生物由来製品の指定並びに生物由来原料基準の制定等について
平成22年4月1日	薬食審査発0401第2号	一般用漢方製剤承認基準の改正について
平成27年3月25日	薬食発0325第28号	かぜ薬の製造販売承認基準について
平成27年3月25日	薬食発0325第30号	解熱鎮痛薬の製造販売承認基準について
平成27年3月25日	薬食発0325第26号	鎮咳去痰薬の製造販売承認基準について
平成27年3月25日	薬食発0325第23号	鼻炎用内服薬の製造販売承認基準について
● II-2) 関係		
平成11年8月12日	医薬発第983号	一般用医薬品の使用上の注意記載要領について
平成23年10月14日	薬食発1014第3号	一般用医薬品の使用上の注意記載要領について
平成11年8月12日	医薬発第984号	一般用医薬品の添付文書記載要領について
平成23年10月14日	薬食発1014第6号	一般用医薬品の添付文書記載要領について
平成11年8月12日	医薬安第96号	一般用医薬品の添付文書記載要領の留意事項について
平成23年10月14日	薬食安発1014第7号 薬食審査発1014第8号	一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意について
平成23年10月14日	薬食安発1014第4号 薬食審査発1014第5号	かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意について
平成24年7月10日	医薬食品局安全対策課 事務連絡	一般用医薬品の使用上の注意記載要領の訂正について
平成24年8月30日	医薬食品局安全対策課・審査管理課 事務連絡	かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意及び一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意の訂正について
平成24年9月21日	薬食安発0921第1号 薬食審査発0921第2号	かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について
平成25年1月25日	医薬食品局安全対策課 事務連絡	一般用医薬品の使用上の注意における腎障害に係る記載について(回答)
平成27年4月1日	薬食安発0401第2号 薬食審査発0401第9号	かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について
令和元年5月30日	薬生薬審発0530第11号 薬生安発0530第2号	かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について
令和元年7月9日	薬生薬審発0709第9号 薬生安発0709第13号	かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について
令和3年5月13日	薬生薬審発0513第1号 薬生安発0513第2号	一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について

令和3年6月16日	薬生薬審発0616第13号 薬生安発0616第1号	かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について
<b>● II-3) 関係</b>		
昭和36年11月18日	薬発第470号	医薬部外品を指定する告示の一部改正について
昭和37年9月6日	薬発第464号	医薬部外品の取扱いについて
平成11年3月12日	医薬発第280号	医薬品販売規制緩和に係る薬事法施行令の一部改正等について
平成16年7月16日	薬食発第716002号	一般用医薬品から医薬部外品への移行措置に係る薬事法施行令の一部改正等について
平成16年7月16日	薬食発第716006号	一般用医薬品から医薬部外品に移行する品目の範囲について
平成16年7月26日	薬食審査発第726002号	一般用医薬品から医薬部外品に移行する品目を一般小売店で販売するに当たっての留意事項について
平成27年3月25日	薬食発0325第33号	染毛剤製造販売承認基準について
平成27年3月25日	薬食発0325第35号	パーマメント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について
平成27年3月25日	薬食発0325第37号	薬用歯みがき類 製造販売承認基準について
平成27年3月25日	薬食発0325第39号	浴用剤製造販売承認基準について
平成27年3月25日	薬食発0325第17号	生理処用品製造販売承認基準について
昭和55年10月9日	薬発第1341号	医薬部外品及び化粧品等の効能効果の範囲の改正について
昭和60年5月	薬務局監視指導課事務連絡（監視速報No. 214）	化粧品における特定成分の特記表示について
平成12年12月28日	薬発第1339号	化粧品の効能の範囲の改正について
平成13年3月9日	医薬監麻発第288号	化粧品の効能の範囲の改正について
平成23年7月21日	薬食発0721第1号	化粧品の効能の範囲の改正について
昭和46年4月8日	衛発第222号	特別用途食品の表示許可について
平成3年7月11日	衛新第64号	栄養改善法施行規則の一部改正について
平成13年3月27日	医薬発第244号	保健機能食品制度の創設について
平成16年3月25日	食安発第325002号	「栄養機能食品」への3成分（亜鉛、銅及びマグネシウム）追加等について
平成16年3月25日	食安新発第325001号	「栄養成分の補給ができる旨の表示」及び「栄養機能食品」の対象成分への亜鉛、銅及びマグネシウム追加について （健康増進法施行規則の一部を改正する省令、栄養表示基準の一部を改正する件及び栄養機能食品の表示に関する基準の一部を改正する件の施行等について）
平成17年2月1日	薬食発第201001号	「健康食品」に係る制度の見直しについて
平成17年2月1日	食安新発第201003号	特定保健用食品における疾病リスク低減表示について
平成17年2月28日	食安新発第228001号	「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集について
平成14年7月17日	医薬監麻発第717004号	ろう 痩身用健康食品と称した未承認医薬品等の監視指導について
平成14年7月19日	食新発第719002号	健康食品による健康被害事例に対する取り組みについて
平成21年2月12日	食安発第0212001号	特別用途食品の表示許可等について
平成21年2月12日	食安新発第0212001号	特別用途食品の表示許可等に係る留意事項について
平成21年8月28日	保発0828第16号 薬食発0828第9号	消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う改正食品衛生法等の施行について
<b>● III-1) 関係</b>		
昭和33年5月7日	薬発第264号	薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について
昭和36年2月8日	薬発第44号	薬事法の施行について
平成18年6月14日	薬食発第0614006号	薬事法の一部を改正する法律について
平成21年5月8日（最終改正：平成24年5月30日）	薬食発第0508003号	薬事法の一部を改正する法律等の施行等について
平成24年3月26日	薬食発0326第1号	登録販売者に対する研修の実施について
平成24年5月30日（一	薬食発0530第14号	薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行

部改正：平成26年3月10日		について
平成26年3月10日	薬食発0310第1号	薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について
平成26年3月18日	薬食発0310第6号	薬事法第36条の5第2項の「正当な理由」等について
平成26年6月4日	薬食発0604第2号	薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品（告示）の施行等について
平成26年8月19日	薬食発0819第1号	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
平成29年8月24日	薬生総発0824第1号	登録販売者に対する研修の実施について
平成29年9月26日	薬生発0926第10号	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について
平成29年10月5日	薬生発1005第1号	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について
昭和31年12月1日	薬収第1036号	薬事法施行上の疑義について
昭和44年11月6日	薬事第326号	薬事法に対する疑義について
昭和44年12月2日	薬事第342号	医薬品を分割販売（零売）するときの表示について
昭和45年3月17日	薬事第82号	医薬品を分割販売（零売）するときの表示について
平成21年11月2日	安全対策課事務連絡	一般用医薬品（かぜ薬（内用）、鎮咳去痰薬（内用）、鼻炎用内服薬のうち、小児の用法を有する製剤）の小児への使用に関する注意喚起について
平成22年12月22日	薬食総発1222第1号 薬食安発1222第1号	一般用医薬品のかぜ薬（内用）、鎮咳去痰薬（内用）及び鼻炎用内服薬のうち、小児の用法を有する製剤の販売に係る留意点について（周知依頼）
昭和62年3月5日	薬企第5号	鎮咳去痰薬の内服液剤の販売について
平成4年5月11日	薬監第31号	薬局開設者及び医薬品販売業者における一般用検査薬（妊娠検査）の適正販売について
平成9年12月25日	薬監第104号	組合せ医薬品等の取扱いについて
平成9年12月25日	事務連絡	組合せ医薬品等の取扱いについて
● III-2) 関係		
昭和38年10月3日	薬収第822号	医薬品の販売方法について
昭和41年7月28日	薬監第118号	医薬品等の販売方法などの疑義について
● IV-1) 関係		
平成29年9月29日	薬生発0929第4号	医薬品等適正広告基準の改正について
平成29年9月29日	薬生監麻発0929第5号	医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
平成10年3月31日	薬監第60号	医薬品等の広告について
平成10年9月29日	薬監第148号	薬事法における医薬品等の広告の該当性について
平成10年11月5日	薬監第968号	医薬品等の広告の取扱いについて
昭和63年7月13日（最終改正：平成12年10月2日）	日本浴用剤工業協会	浴用剤（医薬部外品）の表示、広告について
平成12年12月6日	日本ヘアカラー工業会・染毛剤懇話会	染毛剤の表示・広告に関する自主基準について
昭和42年4月17日	日本化粧品工業連合会・東日本歯磨工業会・西日本歯磨工業会	化粧品歯磨の広告に関する自主申し合わせについて
平成15年4月7日	日本化粧品工業連合会 広告宣伝委員会	化粧品・薬用化粧品等に関する広告表現ガイドライン
昭和60年6月28日	薬監第38号	痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等について
平成15年8月29日	薬食発第0829007号	食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）について
平成15年8月29日	食安監発第829005号 食安基発第829001号	食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及



		び広告等適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）に係る留意事項について
平成16年12月8日	食安新発第1208001号	体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告等の適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）について
平成17年6月1日	食安監発第601002号 食安基発第601001号	「食品として販売に供する物 <sup>うた</sup> に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）に係る留意事項について」の一部改正について
● IV-3) 関係		
令和2平成30年8月31日	薬生発08-131第31-5号	「薬事監視指導要領」及び「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」の一部改正について
平成12年3月8日 (最終改正：平成26年7月1日)	医薬発第237号	医薬品・医療機器等の回収について

5844

## 1 第5章 医薬品の適正使用・安全対策

### 問題作成のポイント

- 医薬品の添付文書、製品表示等について、記載内容を的確に理解し、購入者への適切な情報提供や相談対応に活用できること
- 副作用報告制度、副作用被害救済制度に関する基本的な知識を有していること
- 医薬品の副作用等に関する厚生労働大臣への必要な報告を行えること
- 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により重篤な健康被害を生じた購入者等に対し、副作用被害救済の制度につき紹介し、基本的な制度の仕組みや申請窓口等につき説明できること

2

### 3 I 医薬品の適正使用情報

4 医薬品は、効能・効果、用法・用量、起こり得る副作用等、その適正な使用のために必要な情報  
5（適正使用情報）を伴って初めて医薬品としての機能を発揮するものである。

6 要指導医薬品又は一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売又は授与する者  
7 薬剤師、登録販売者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、  
8 自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、  
9 その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。それらの記載は、一般の生活者に理解  
10 しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。

11 そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応  
12 を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購  
13 入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供  
14 が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。

15

#### 16 1) 添付文書の読み方

17 法第52条第2項の規定により、要指導医薬品、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品には、  
18 それに添付する文書（添付文書）又はその容器若しくは被包に、「用法、用量その他使用及び取扱  
19 い上の必要な注意」等の記載が義務づけられているが、それらの記載が明瞭なものとなるよう、  
20 使用上の注意等として添付文書に記載されている場合が多い。一般用医薬品の添付文書の記載は、  
21 以下のような構成となっている。

#### 22 ① 改訂年月

23 一般用医薬品を含めて、医薬品の添付文書の内容は変わるものでありならないものではなく、  
24 医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、必要に応じて随時  
25 改訂がなされている。重要な内容が変更された場合には、改訂年月を記載するとともに改訂  
26 された箇所を明示することとされており、以前からその医薬品を使用している人が、添付文

27 書の変更箇所<sup>①</sup>に注意を払うことができるようになっている。

28  
29 ② 添付文書の必読及び保管に関する事項

30 添付文書の販売名の上部に、「使用にあたって、この説明文書を必ず読むこと。また、必要

31 なときに読めるよう大切に保存すること。」等の文言が記載されている。

32 添付文書は開封時に一度目を通されれば十分というものでなく、実際に使用する人やその

33 時の状態等によって留意されるべき事項が異なってくるため、必要なときにいつでも取り出

34 して読むことができるように保管される必要がある。

35 販売時に専門家から直接情報提供を受けた購入者以外の家族等がその医薬品を使用する際

36 には、添付文書に目を通し、使用上の注意等に留意して適正に使用されることが特に重要で

37 ある。また、一般用医薬品を使用した人が医療機関を受診する際にも、その添付文書を持参

38 し、医師や薬剤師に見せて相談<sup>②</sup>がなされることが重要である。

39 ③ 販売名、薬効名及びリスク区分（人体に直接使用しない検査薬では「販売名及び使用目的」）

40 通常の医薬品では、承認を受けた販売名が記載されている。

41 薬効名とは、その医薬品の薬効又は性質（例えば、主たる有効成分など）が簡潔な分かり

42 やすい表現で示されたもので、販売名に薬効名が含まれているような場合には（例えば、「〇

43 〇〇胃腸薬」など）、薬効名の記載は省略されることがある。

44 各製品のリスク区分が記載されている。

45 ④ 製品の特徴

46 医薬品を使用する人に、その製品の概要を分かりやすく説明することを目的として記載さ

47 れている（概要を知るために必要な内容を簡潔に記載）。

48 ⑤ 使用上の注意

49 「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」から構成され、適正使用

50 のために重要と考えられる項目が前段に記載されている。枠囲い、文字の色やポイントを替

51 えるなど他の記載事項と比べて目立つように記載されている。また、「使用上の注意」、「して

52 はいけないこと」及び「相談すること」の各項目の見出しには、それぞれ例示統一された標

53 識的マークが付されていることが多い。

54  **使用上の注意**



**してはいけないこと**



**相談すること**

56 各項目における記載の理由や根拠となっている配合成分及びその薬理作用、その他の要因

57 等に関する出題は、第3章を参照して問題作成のこと。また、それらに関する実務的な知識、

58 理解を問う出題として、事例問題を含めることが望ましい。

60 ○ **してはいけないこと**（別表5-1）

61 守らないと症状が悪化する事項、副作用又は事故等が起こりやすくなる事項について記  
62 載されている。一般用検査薬では、その検査結果のみで確定診断はできないので、判定が  
63 陽性であれば速やかに医師の診断を受ける旨が記載されている。[ccxxviii](#)

64 (a) 「次の人は使用（服用）しないこと」

65 アレルギーの既往歴、症状や状態、基礎疾患、年齢、妊娠の可能性の有無、授乳の有無  
66 等からみて重篤な副作用を生じる危険性が特に高いため、使用を避けるべき人について、  
67 生活者が自らの判断で認識できるよう記載することとされている。

68 また、その医薬品では改善が期待できない症状等や、使用によって状態が悪化するお  
69 それのある疾病や症状で、一般の生活者において誤って使用されやすいものがある場合  
70 等にも、適正使用を図る観点から記載がなされる。

71 重篤な副作用として、ショック（アナフィラキシー）、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮  
72 壊死融解症、<sup>ぜん</sup>喘息等が掲げられている医薬品では、アレルギーの既往歴がある人等は使  
73 用しないこととして記載されている。

74 小児が使用した場合に特異的な有害作用のおそれがある成分を含有する医薬品では、  
75 通常、「次の人は使用（服用）しないこと」の項に「15歳未満の小児」、「6歳未満の小  
76 児」等として記載されている。

77 (b) 「次の部位には使用しないこと」

78 局所に適用する医薬品は、患部の状態によっては症状を悪化させたり、誤った部位に  
79 使用すると副作用有害事象を生じたりするおそれがある。それらに関して、使用を避け  
80 るべき患部の状態、適用部位等に分けて、簡潔に記載されている。

81 (c) 「本剤を使用（服用）している間は、次の医薬品を使用（服用）しないこと」

82 要指導医薬品又は一般用医薬品は、複数の有効成分が配合されている場合が多く、使  
83 用方法や効能・効果が異なる医薬品同士でも、同一成分又は類似の作用を有する成分が  
84 重複することがある。併用すると作用の増強、副作用等のリスクの増大が予測されるも  
85 のについて注意を喚起し、使用を避ける等適切な対応が図られるよう記載されている。

86 なお、医療用医薬品との併用については、医療機関で治療を受けている人が、治療の  
87 ために処方された医薬品の使用を自己判断で控えることは適当でないため、「相談するこ  
88 と」の項において、「医師（又は歯科医師）の治療を受けている人」等として記載されて  
89 いる。

[ccxxviii](#) 「一般用黄体形成ホルモンキットに係る情報提供の徹底について」（平成30年5月31日付け薬生総発0531第1号、薬生安発0531第1号、薬生機審発0531第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品安全対策課長及び医療機器審査課長連名通知）において、一般用黄体形成ホルモンキットでは、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊目的で使用できないことを周知徹底するよう求めている。

## 90 (d) その他「してはいけないこと」

91 副作用又は副作用により誘発される事故の防止を図るため、避けるべき事項が記載さ  
92 れている。小児では通常当てはまらない内容もあるが、小児に使用される医薬品におい  
93 ても、その医薬品の配合成分に基づく一般的な注意事項として記載されている。その主  
94 なものとして、次のような記載がある。

## 95 ● 「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」

96 その医薬品に配合されている成分の作用によって眠気や異常なまぶしさ等が引き起  
97 こされると、重大な事故につながるおそれがあるため、その症状の内容とともに注意  
98 事項が記載されている。

## 99 ● 「授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること」

100 体に吸収されると一部が乳汁中に移行して、乳児に悪影響を及ぼすおそれがあるこ  
101 とが知られている成分が配合された医薬品において記載されている。

## 102 ● 「服用前後は飲酒しないこと」

103 摂取されたアルコールによって、医薬品の作用の増強、副作用を生じる危険性の増  
104 大等が予測される場合に記載されている。

105 ● 「長期連用しないこと」「〇日以上（継続して）使用（服用）しないこと」「症状があ  
106 るときのみでの使用にとどめ、連用しないこと」等

107 連用すると副作用等が現れやすくなる成分、効果が減弱して医薬品に頼りがちにな  
108 りやすい成分又は比較的作用の強い成分が配合されている場合に記載される。症状が  
109 改善したか否かによらず、漫然と使用し続けることは避ける必要がある。

110

111 ○ **相談すること**（別表5-2）

112 ● その医薬品を使用する前に、その適否について専門家に相談した上で適切な判断がな  
113 されるべきである場合として、次のような記載がある。

## 114 (a) 「医師（又は歯科医師）の治療を受けている人」

115 医師又は歯科医師の治療を受けているときは、何らかの薬剤の投与等の処置がなさ  
116 れており、その人の自己判断で要指導医薬品又は一般用医薬品が使用されると、治療  
117 の妨げとなったり、医師又は歯科医師から処方された薬剤（医療用医薬品）と同種の  
118 有効成分の重複や相互作用等を生じることがある。

119 そのため、治療を行っている医師又は歯科医師にあらかじめ相談して、使用の適否  
120 について判断を仰ぐべきであり、特に、医療用医薬品を使用している場合には、その  
121 薬剤を処方した医師若しくは又は歯科医師、又は若しくは調剤を行った薬剤師に相談  
122 するよう説明がなされる必要がある。

## 123 (b) 「妊婦又は妊娠していると思われる人」

124 胎児への影響や妊娠という特別な身体状態を考慮して、一般的に、医薬品の使用に  
125 は慎重を期す必要がある（第1章Ⅱ-4）(c) 参照）。

126 「してはいけないこと」の項で「次の人は使用（服用）しないこと」として記載され  
127 ている場合と異なり、必ずしもヒトにおける具体的な悪影響が判明しているものでな  
128 いが、妊婦における使用経験に関する科学的データが限られているため安全性の評価  
129 が困難とされている場合も多い。

130 そのため、一般の生活者の自己判断による医薬品の使用は、最低限にとどめること  
131 が望ましく、既に妊娠が判明し、定期的な産科検診を受けている場合には、担当医師  
132 に相談するよう説明がなされる必要がある。

133 (c) 「授乳中の人」

134 摂取した医薬品の成分の一部が乳汁中に移行することが知られているが、「してはい  
135 けないこと」の項で「授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳  
136 を避けること」として記載するほどではない場合に記載されている。

137 購入者等から相談があったときには、乳汁中に移行する成分やその作用等について、  
138 適切な説明がなされる必要がある。

139 (d) 「高齢者」

140 使用上の注意の記載における「高齢者」とは、およその目安として65歳以上を指  
141 す。一般に高齢者では、加齢に伴い副作用等を生じるリスクが高まる傾向にあり、ま  
142 た、何らかの持病（基礎疾患）を抱えていること等も多い（（第1章Ⅱ-4）(b) 参照）。

143 65歳以上の年齢であっても、どの程度リスクが増大しているかを年齢のみから一  
144 概に判断することは難しく、専門家に相談しながら個々の状態に応じて、その医薬品  
145 の使用の適否について慎重な判断がなされるべきであり、使用する場合には、  
146 副作用等に留意しながら使用される必要がある。

147 (e) 「薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人」

148 その医薬品を使用してアレルギー症状を起こしたことはなくても、他の医薬品でア  
149 レルギーの既往歴がある人や、アレルギー体質の人は、一般にアレルギー性の副作用  
150 を生じるリスクが高く、その医薬品の使用の適否について慎重な判断がなされるべき  
151 であり、やむを得ず使用する場合には、アレルギー性の副作用の初期症状等に留意し  
152 ながら使用される必要がある。

153 (f) 「次の症状がある人」

154 その医薬品の使用の適否について、一般の生活者において適切な判断を行うことが  
155 必ずしも容易でなく、軽率な使用がなされると状態の悪化や副作用等を招きやすい症  
156 状（その医薬品では改善が期待できないにもかかわらず、一般の生活者が誤って使用  
157 してしまいやすい症状を含む。）や、その状態等によっては医療機関を受診することが

158 適当と考えられる場合について記載されている。

159 専門家に相談しながら、個々の状態に応じて慎重な判断がなされるべきであり、症  
160 状の内容や程度によっては、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用によらず、医療機  
161 関を受診するべきであることもある。

162 (g) 「次の診断を受けた人」

163 現に医師の治療を受けているか否かによらず、その医薬品が使用されると状態の悪  
164 化や副作用等を招きやすい基礎疾患等が示されている。

165 その医薬品の使用の適否について、専門家に相談しながら、個々の状態に応じて慎  
166 重な判断がなされるべきである。また、使用する場合にも、基礎疾患への影響等に留  
167 意する必要がある。なお、医師の治療を受けている場合には、治療を行っている医師  
168 に相談するよう説明がなされる必要がある。

169

170 ● その医薬品を使用したあとに、副作用と考えられる症状等を生じた場合、薬理作用か  
171 ら発現が予測される軽微な症状が見られた場合や、症状の改善がみられない場合には、  
172 いったん使用を中止した上で適切な対応が円滑に図られるよう、次のような記載がな  
173 されている。

174 (a) 副作用と考えられる症状を生じた場合に関する記載

175 i) 「使用（服用）後、次の症状が現れた場合」

176 ii) 「まれに下記の重篤な症状が現れることがあります。その場合はただちに医師  
177 の診療を受けること」

178 副作用については、i) まず一般的な副作用について**関係発現**部位別に症状が記載さ  
179 れ、そのあとに続けて、ii) まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状  
180 が記載されている。

181 一般的な副作用については、重篤ではないものの、そのまま使用を継続すると状態  
182 の悪化を招いたり、回復が遅れるおそれのあるものである。また、一般的な副作用と  
183 して記載されている症状であっても、発疹<sup>しん</sup>や発赤などのように、重篤な副作用の初期  
184 症状である可能性があるものも含まれているので、軽んじることのないよう説明がな  
185 されることが重要である。

186 重篤な副作用については、入院相当以上の健康被害につながるおそれがあるもので  
187 あり、そうした重大な結果につながることを回避するため、その初期段階において速  
188 やかに医師の診療を受ける必要がある。

189 主な副作用の症状、医師の診療を受ける以前の対応等に関する出題は、第2章Ⅲを  
190 参照して問題作成のこと。

191 (b) 薬理作用等から発現が予測される軽微な症状がみられた場合に関する記載

192 各医薬品の薬理作用等から発現が予測され、容認される軽微な症状（例えば、抗ヒ  
193 スタミン薬の眠気等）であるが、症状の持続又は増強がみられた場合には、いったん  
194 使用を中止した上で専門家に相談する旨が記載されている。

195 (c) 一定期間又は一定回数使用したあとに症状の改善が見られない場合に関する記載  
196 その医薬品の適用範囲でない疾患による症状や、合併症が生じている可能性等が考  
197 えられ、また、その医薬品の適用となる症状の性質にかんがみて、要指導医薬品又は  
198 一般用医薬品で対処できる範囲を超えており、医師の診療を受けることが必要な場合  
199 もある。

200 漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られる  
201 とされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載され  
202 ている（本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの）。

203 一般用検査薬では、検査結果が陰性であっても何らかの症状がある場合は、再検査  
204 するか又は医師に相談する旨等が記載されている。

205

## 206 ○ その他の注意

207 容認される軽微なものについては、「次の症状が現れることがある」として記載されてい  
208 る。

### 209 ⑥ 効能又は効果（一般用検査薬では「使用目的」）

210 一般の生活者が自ら判断できる症状、用途等が示されている。なお、「適応症」として記載  
211 されている場合もある。このほか、効能又は効果に関連する注意事項がある場合には、効能  
212 又は効果の項目に続けて、これと区別して記載されている。

### 213 ⑦ 用法及び用量（一般用検査薬では「使用方法」）

214 年齢区分、1回用量、1日の使用回数等について一般の生活者に分かりやすく、表形式で  
215 示されるなど工夫して記載されている。

216 小児における使用に関して認められていない年齢区分（使用年齢の制限）がある場合は、  
217 当該年齢区分に当たる小児に使用させない旨が記載される。このほか、定められた用法・用  
218 量を厳守する旨や、剤形・形状に由来する必要な注意<sup>ccxxix</sup>、正しい使用方法に関する注意、誤  
219 りやすい使用方法の指摘、小児に使用させる場合の注意等、用法・用量に関連する使用上の  
220 注意事項がある場合には、用法及び用量の項目に続けて、これと区別して記載されている。

### 221 ⑧ 成分及び分量（一般用検査薬では「キットの内容及び成分・分量」<sup>ccxxx</sup>）

222 有効成分の名称（一般的名称のあるものについては、その一般的名称。有効成分が不明な

<sup>ccxxix</sup> これに関連して、点眼剤に類似した容器に収められた外用液剤では、取り違えにより点眼される事故防止のため、その容器本体に赤枠・赤字で「目に入れない」旨の文字、また、「水虫薬」の文字など点眼薬と区別可能な表示についても目立つよう記載されている。

<sup>ccxxx</sup> 妊娠検査薬では、専門家による購入者等への情報提供の参考として、検出感度も併せて記載されている。



223 ものによっては、その本質及び製造方法の要旨。）及び分量が記載されている。

224 それらの記載と併せて、添加物として配合されている成分も掲げられている（人体に直接  
225 使用しない検査薬等を除く）<sup>ccxxxi</sup>。医薬品の添加物は、それ自体積極的な薬効を期待して配合  
226 されるものでなく、製剤としての品質、有効性及び安全性を高めることを目的として配合さ  
227 れているが、アレルギーの原因となり得ることが知られているものもあり、その成分に対す  
228 るアレルギーの既往歴がある人では使用を避ける必要がある。

229 このほか、尿や便が着色することがある旨の注意や、服用後、尿や便の検査値に影響を与  
230 えることがある場合の注意等、配合成分（有効成分及び添加物）に関連した使用上の注意事  
231 項がある場合には、成分及び分量の項目に続けて、これと区別して記載されている。

232 ⑨ 病気の予防・症状の改善につながる事項（いわゆる「養生訓」）

233 その医薬品の適用となる症状等に関連して、医薬品の使用のみに頼ることなく、日常生活  
234 上、どのようなことに心がけるべきかなど、症状の予防・改善につながる事項について一般  
235 の生活者に分かりやすく記載されていることがある（必須記載ではない）。

236 ⑩ 保管及び取扱い上の注意

237 (a) 「直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しい場所に（密栓して）保管すること」等  
238 の保管条件に関する注意

239 医薬品は、適切な保管がなされないと化学変化や雑菌の繁殖等を生じることがあり、  
240 特にシロップ剤などは変質しやすいため、開封後は冷蔵庫内に保管されるのが望ましい  
241 とされている<sup>ccxxxii</sup>。なお、錠剤、カプセル剤、散剤等では、取り出したときに室温との  
242 急な温度差で湿気を帯びるおそれがあるため、冷蔵庫内での保管は不適當である。

243 (b) 「小児の手の届かないところに保管すること」

244 乳・幼児は好奇心が強く、すぐ手を出して口の中に入れることがある。また、家庭内  
245 において、小児が容易に手に取れる場所（病人の枕元など）、又は、まだ手が届かないと  
246 思っても、小児の目につくところに医薬品が置かれていた場合に、誤飲事故が多く報告  
247 されている。

248 (c) 「他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）」

249 医薬品を旅行や勤め先等へ携行するために別の容器へ移し替えると、日時が経過して  
250 中身がどんな医薬品であったか分からなくなってしまうことがあり、誤用の原因となる

<sup>ccxxxi</sup> 添加物として配合されている成分については、現在のところ、製薬企業界の自主申し合わせに基づいて、添付文書及び外箱への記載がなされている。「香料」「pH調整剤」「等張化剤」のように用途名で記載されているものもある。また、商取引上の機密にあたる添加物については、「その他n成分」（nは記載から除いた添加物の成分数）として記載している場合もある。

「してはいけないこと」又は「相談すること」への記載に伴う情報提供、相談対応が必要な場合を除き、通常、購入者等への説明が求められることは少ないが、購入者側から質問等があった場合には、製造販売元の製薬企業に問い合わせる等の適切な対応がなされるべきである。

<sup>ccxxxii</sup> ただし、凍結すると変質したり、効力が減弱する場合がある。また、家庭における誤飲事故等を避けるため、医薬品は食品と区別して、誰にも分かるように保管されることも重要である。

251 おそれがある。また、移し替えた容器が湿っていたり、汚れていたりした場合、医薬品  
252 として適切な品質が保持できなくなるおそれがある。

253 (d) その他「他の人と共用しないこと」等

254 点眼薬では、複数の使用者間で使い回されると、万一、使用に際して薬液に細菌汚染  
255 があった場合に、別の使用者に感染するおそれがあるため記載されている。

256 可燃性ガスを噴射剤としているエアゾール製品や消毒用アルコール等、危険物に該当  
257 する製品における消防法（[昭和23年法律第186号](#)）に基づく注意事項や、エアゾー  
258 ル製品に対する高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）に基づく注意事項につい  
259 ては、それぞれ法律上、その容器への表示が義務づけられているが、添付文書において  
260 「保管及び取扱い上の注意」としても記載されている。

261 ⑪ 消費者相談窓口

262 製造販売元の製薬企業（以下「製造販売業者」という。）において購入者等からの相談に応  
263 じるための窓口担当部門の名称、電話番号、受付時間等が記載されている。

264 ⑫ 製造販売業者の名称及び所在地

265 製造販売業の許可を受け、その医薬品について製造責任を有する製薬企業の名称及び所在  
266 地<sup>ccxxxiii</sup>が記載されている。販売を他社に委託している場合には、販売を請け負っている販社  
267 等の名称及び所在地も併せて記載されることがある。

268

269 2) 製品表示の読み方

270 毒薬若しくは劇薬又は要指導医薬品に該当する医薬品における表示や、その一般用医薬品が分  
271 類されたリスク区分を示す識別表示等の法定表示事項のほかにも、医薬品の製品表示として、購  
272 入者等における適切な医薬品の選択、適正な使用に資する様々な情報が記載されている。

273 医薬品によっては添付文書の形でなく、法第52条第2項の規定に基づく「用法、用量その他  
274 使用及び取扱い上必要な注意」等の記載を、外箱等に行っている場合がある。また、添付文書が  
275 ある医薬品にあっても、添付文書は通常、外箱等に封入されていることから、購入者等が購入後  
276 に製品を開封して添付文書を見て初めて、自分（又は家族）にとって適当な製品でなかったこと  
277 が分かるといった事態等を防ぐため、医薬品の適切な選択に資する事項として、添付文書の内容  
278 のうち、効能・効果、用法・用量、添加物として配合されている成分<sup>ccxxxiv</sup>等のほか、使用上の注  
279 意の記載から以下の事項については、外箱等にも記載されている。

280 ① 使用上の注意「してはいけないこと」の項において、「次の人は使用（服用）しないこと」、  
281 「次の部位には使用しないこと」、「授乳中は本剤を服用しないか本剤を服用する場合は授

ccxxxiii 医薬品の製造販売業に係る業務を担当する主たる事務所（事業本部等）の所在地が記載される。

ccxxxiv ただし、外箱等は記載スペースが限られることから、添加物成分の記載については、アレルギーの原因となり得ることが知られているもの等、安全対策上重要なものを記載し、「(これら以外の) 添加物成分は、添付文書をご覧ください」としている場合がある。

282 乳を避けること」、「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」等、副作用や事故等  
 283 が起きる危険性を回避するため記載されている内容

284 これに関連して、1回服用量中0.1mLを超えるアルコールを含有する内服液剤<sup>ccxxxv</sup>（滋養  
 285 強壯を目的とするもの）については、例えば「アルコール含有〇〇mL以下」のように、アル  
 286 コールを含有する旨及びその分量が記載されている。

287 ② 「使用にあたって添付文書をよく読むこと」等、添付文書の必読に関する事項

288 包装中に封入されている医薬品（内袋を含む）だけが取り出され、添付文書が読まれない  
 289 といったことのないように記載されている。

290 ③ 専門家への相談勧奨に関する事項

291 症状、体質、年齢等からみて、副作用による危険性が高い場合若しくは医師又は歯科医師  
 292 の治療を受けている人であって、一般使用者の判断のみで使用することが不適当な場合につ  
 293 いて記載されている。記載スペースが狭小な場合には、「使用が適さない場合があるので、使  
 294 用前には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」等と記載されて  
 295 いる。

296 ④ 「保管及び取扱い上の注意」の項のうち、医薬品の保管に関する事項

297 購入者によっては、購入後すぐ開封せずにそのまま保管する場合や持ち歩く場合があるた  
 298 め、添付文書を見なくても適切な保管がなされるよう、その容器や包装にも、保管に関する  
 299 注意事項が記載されている。

300 使用期限の表示については、適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定で  
 301 あることが確認されている医薬品において法的な表示義務はないが、流通管理等の便宜上、外箱  
 302 等に記載されるのが通常となっている（配置販売される医薬品では、「配置期限」として記載され  
 303 る場合がある）。

304 表示された「使用期限」は、未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限であり、い  
 305 ったん開封されたものについては記載されている期日まで品質が保証されない場合がある。した  
 306 がって、購入後、開封されてからどの程度の期間品質が保持されるかについては、医薬品それぞ  
 307 れの包装形態や個々の使用状況、保管状況等によるので、購入者等から質問等がなされたとき  
 308 は、それらを踏まえて適切な説明がなされる必要がある。

309 製品表示のうち、法の規定による法定表示事項に関する出題については、第4章Ⅱ-2）を参  
 310 照して問題作成のこと。なお、法の規定による法定表示事項のほか、他の法令に基づいて製品表  
 311 示がなされている事項としては、次のようなものがある。

312 ○ 可燃性ガスを噴射剤としているエアゾール製品や消毒用アルコール等、危険物に該当する  
 313 製品に対する消防法に基づく注意事項（「火気厳禁」等）

<sup>ccxxxv</sup> 有効成分としてでなく、生薬成分の抽出や有効成分の溶解補助のためアルコールが含有されており、アルコールの低減・除去は、製剤技術的に困難な場合がある。

- 314 ○ エアゾール製品に対する高圧ガス保安法に基づく注意事項
- 315 「高温に注意」、使用ガスの名称等
- 316 ○ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）に基づく、容器包装の識別
- 317 表示（識別マーク）

318

319 3) 安全性情報など、その他の情報

320 法第68条の2の5第1項の規定により、医薬品の製造販売業者等は、医薬品の有効性及び安  
321 全性に関する事項その他医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集し、検討するとともに、  
322 薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者及びそこに従事する薬剤師や登録販売者に対して、提  
323 供するよう努めなければならないこととされている。

324 また、製造販売業者等による情報提供がなされる場合にあっても、広範囲の医薬関係者へ速や  
325 かに伝達される必要があるときには、関係機関・関係団体の協力及び行政庁の関与の下、周知が  
326 図られている。

327

328 【緊急安全性情報】 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について緊急かつ重大な注意喚起や  
329 使用制限に係る対策が必要な状況にある場合に、厚生労働省からの命令、指示、製造販売業者  
330 の自主決定等に基づいて作成される。製造販売業者及び行政当局による報道発表、(独)医薬  
331 品医療機器総合機構<sup>ccxxxvi</sup>（以下「総合機構」という。）による医薬品医療機器情報配信サー  
332 ビスによる配信（PMDAメディナビ）、製造販売業者から医療機関や薬局等への直接配布、ダイ  
333 レクトメール、ファックス、電子メール等による情報提供（1ヶ月以内）等により情報伝達  
334 されるものである。A4サイズの黄色地の印刷物で、イエローレターとも呼ばれる。<sup>ccxxxvii</sup>

335 医療用医薬品や医家向け医療機器についての情報伝達である場合が多いが、<sup>しょうさいことう</sup>小柴胡湯による  
336 間質性肺炎に関する緊急安全性情報（平成8年3月）のように、一般用医薬品にも関係する緊  
337 急安全性情報が発出されたこともある。

338

339 【安全性速報】 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について一般的な使用上の注意の改訂情  
340 報よりも迅速な注意喚起や適正使用のための対応の注意喚起が必要な状況にある場合に、厚生  
341 労働省からの命令、指示、製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。総合機構による  
342 医薬品医療機器情報配信サービスによる配信（PMDAメディナビ）、製造販売業者から医療機関  
343 や薬局等への直接の配布、ダイレクトメール、ファクシミリ、電子メール等による情報提供（1  
344 ヶ月以内）等により情報伝達されるものである。A4サイズの青色地の印刷物で、ブルーレ

ccxxxvi 略称は総合機構、PMDA

ccxxxvii イエローレター等については、「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」（平成26年10月31日付け薬食  
安発1031第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）の別添「緊急安全性情報等の提供に関する指針」により示され  
ている。

345 ターとも呼ばれる。

346

347 【医薬品・医療機器等安全性情報】 厚生労働省においては、医薬品（一般用医薬品を含む）、医  
348 療機器等による重要な副作用、不具合等に関する情報をとりまとめ、「医薬品・医療機器等安全  
349 性情報」として、広く医薬関係者向けに情報提供を行っている。

350 その内容としては、医薬品の安全性に関する解説記事や、使用上の注意の改訂内容、主な対  
351 象品目、参考文献（重要な副作用等に関する改訂については、その根拠となった症例の概要も  
352 紹介）等が掲載されている。（別表5-3）

353 医薬品・医療機器等安全性情報は、各都道府県、保健所設置市及び特別区、関係学会等への  
354 冊子の送付がなされているほか、厚生労働省ホームページ及び総合機構ホームページへ掲載さ  
355 れるとともに、医学・薬学関係の専門誌等にも転載される。

356

357 【総合機構ホームページ】 総合機構のホームページでは、添付文書情報、厚生労働省より発行  
358 される「医薬品・医療機器等安全性情報」のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品に関連した  
359 以下のような情報が掲載されている。

- 360 ○ 厚生労働省が製造販売業者等に指示した緊急安全性情報、「使用上の注意」の改訂情報
- 361 ○ 製造販売業者等や医療機関等から報告された、医薬品による副作用が疑われる症例情報
- 362 ○ 医薬品の承認情報
- 363 ○ 医薬品等の製品回収に関する情報
- 364 ○ 一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書情報
- 365 ○ 患者向医薬品ガイド [くすりのしおり](#)
- 366 ○ その他、厚生労働省が医薬品等の安全性について発表した資料

367 総合機構では、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出されたときに、ホ  
368 ームページに掲載するとともに、その情報を電子メールによりタイムリーに配信する医薬品医  
369 療機器情報配信サービス（PMDA メディナビ）を行っている。このサービスは誰でも利用可能で  
370 あり、最新の情報を入手することができる。

371

#### 372 4) 購入者等に対する情報提供への活用

373 薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者及び医薬品の販売に従事する薬剤師や登録販売者に  
374 においては、医薬品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に、製造販売業者等から  
375 提供される情報の活用その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければなら  
376 いとされている（法第68の2の5第3項）。

377

#### 378 【添付文書情報の活用】

379 令和3年8月1日から、医療用医薬品への紙の添付文書の同梱を廃止し、注意事項等情報は  
380 電子的な方法により提供されることとなった。具体的には医薬品の容器又被包に当該情報を入  
381 手するために必要な符号（バーコード又は二次元コード）を記載することが求められている。  
382 この符号をスマートフォン等のアプリケーションで読み取ることで、総合機構のホームページ  
383 で公表されている最新の添付文書等の情報にアクセスすることが可能である。添付文書につい  
384 ては、通常、外箱等に封入されていることから、使用上の注意等がすべて外箱等に記載されて  
385 いる医薬品以外では、開封しなければ現物を確認することは難しい。そのため、一般の購入者  
386 が添付文書の内容について事前に関覧できる環境の整備として、総合機構では、医療用医薬品  
387 及び医療機器のほか、要指導医薬品又は一般用医薬品についても添付文書情報を、平成19年  
388 3月から順次、ホームページへ掲載している。

389 一方で、一般用医薬品等の消費者が直接購入する製品は、使用時に添付文書情報の内容を直  
390 ちに確認できる状態を確保する必要があるため、引き続き紙の添付文書の同梱される。事前に  
391 入手可能な紙媒体による添付文書情報については、主として医薬関係者向けの出版物として刊  
392 行されている。また、製薬企業によっては、自社製品について添付文書集を作成し、医薬関係  
393 者に提供している場合もある。

394 医薬品の販売等に従事する専門家においては、総合機構に掲載されている最新の添付文書情  
395 報等から封入されている添付文書の実物に代えて、こうした添付文書情報を活用することによ  
396 って、医薬品の適切な選択、適正な使用が図られるよう、購入者等に対して情報提供を行うこ  
397 とが可能である。一般的には、「してはいけないこと」の項に記載された内容のうち、その医薬  
398 品を実際に使用する人（購入者本人とは限らない）に当てはまると思われる事項や、「相談する  
399 こと」の項に記載された内容のうち、その医薬品を実際に使用する人における副作用の回避、  
400 早期発見につながる事項等が、積極的な情報提供のポイントとなる。また、購入者等が抱く疑  
401 問等に対する答えは添付文書に記載されていることも多く、そうした相談への対応においても、  
402 添付文書情報は有用である。

403 なお、購入者等への情報提供の実効性を高める観点からも、購入後、その医薬品を使い終わ  
404 るまで、添付文書等は必要なときいつでも取り出して読むことができるよう大切に保存する必  
405 要性につき説明がなされることも重要である。

#### 407 【製品表示情報の活用】

408 添付文書情報が事前に関覧できる環境が整っていない場合にあっては、製品表示から読み取  
409 れる適正使用情報が有効に活用され、購入者等に対して適切な情報提供がなされることが一層  
410 重要となる。

411 要指導医薬品並びに一般用医薬品のリスク区分のうち第一類医薬品及び第二類医薬品は、そ  
412 の副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるものであり、こ

413 れらリスク区分に分類されている旨が製品表示から容易に判別できることによって、副作用等  
414 の回避、早期発見のため必要な注意事項に自ずと関心が向けられ、積極的な情報提供を行う側  
415 も受ける側も、その意義や必要性について認識することができる。第三類医薬品に分類された  
416 医薬品については、その製品が医薬品であることが製品表示から明確となることにより、その  
417 本質として、適正に使用された場合であっても身体の変調・不調が起り得ることや、添付文  
418 書を必ず読む意義、用法・用量等を守って適正に使用する必要性等について、その医薬品を購  
419 入し、又は使用する一般の生活者に認識できる。

420 また、添付文書に「使用上の注意」として記載される内容は、その医薬品に配合されている  
421 成分等に由来することも多く、使用上の注意の内容について、配合成分等の記載からある程度  
422 読み取ることも可能である。

423

#### 424 【その他の適正使用情報の活用】

425 添付文書や外箱表示は、それらの記載内容が改訂された場合、実際にそれが反映された製品  
426 が流通し、購入者等の目に触れるようになるまでには一定の期間を要する。健康に対する一般  
427 の生活者の意識・関心の高まりに伴って、医薬品の有効性や安全性等に関する情報に対するニ  
428 ーズが多様化・高度化する傾向にある。医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者  
429 等に対して、常に最新の知見に基づいた適切な情報提供を行うため、得られる情報を積極的に  
430 収集し、専門家としての資質向上に努めることが求められる。

431 情報通信技術の発展・普及に伴って、一般の生活者においても、医薬品の有効性、安全性等  
432 に関して速やかな情報入手のほか、相当程度専門的な情報にも容易にアクセスできる状況とな  
433 っている。販売時に専門家から説明された内容について、購入者側において検証することも可  
434 能であり、不十分な情報や理解に基づいて情報提供が行われた場合には、医薬品の販売等に従  
435 事する専門家としての信用・信頼が損なわれることにつながりかねない。

436 その一方で、一般の生活者が接する医薬品の有効性や安全性等に関する情報は、断片的かつ  
437 必ずしも正確でない情報として伝わっている場合も多く、医薬品の販売等に従事する専門家  
438 においては、購入者等に対して科学的な根拠に基づいた正確なアドバイスを与え、セルフメディ  
439 ケーションを適切に支援することが期待されている。

440

## 441 II 医薬品の安全対策

442 現在、医薬品の市販後の安全対策として、副作用等の情報を収集する制度、収集された安全性  
443 情報を評価し適切な措置を講じる体制が整備されているところである。また、医薬品を適正に使  
444 用したにもかかわらず生じた健康被害に対する救済制度等が設けられている。これらは、これま  
445 での薬害事件が和解により集結した後、その経験や教訓を踏まえて、拡充されてきたものである。  
446 契機となった薬害事件に関する出題については、第1章 IV(薬害の歴史)を参照して作成のこと。

447

## 448 1 医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置

449 1961年に起こったサリドマイド薬害事件を契機として、医薬品の安全性に関する問題を世  
450 界共通のものとして取り上げる気運が高まり、1968年、世界保健機関（WHO）加盟各国を  
451 中心に、各国自らが医薬品の副作用情報を収集、評価する体制（WHO国際医薬品モニタリング  
452 制度）を確立することにつながった。

453

## 454 1) 副作用情報等の収集

455 【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】 法第68条の10第2項の規定により、薬局開設  
456 者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売  
457 者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を  
458 知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めると  
459 きは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされている。なお、実務上は、法第  
460 68条の13第3項の規定により、報告書を総合機構に提出することとされている。

461 本制度は、医薬品の使用、販売等に携わり、副作用等が疑われる事例に直接に接する医薬関  
462 係者からの情報を広く収集することによって、医薬品の安全対策のより着実な実施を図ること  
463 を目的としており、WHO加盟国の一員として日本わが国が対応した安全対策に係る制度の一  
464 つである。

465 本制度は、1967年3月より、約3000の医療機関をモニター施設に指定して、厚生省  
466 （当時）が直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。また、  
467 一般用医薬品による副作用等の情報を収集するため、1978年8月より、約3000のモニ  
468 ター薬局で把握した副作用事例等について、定期的に報告が行われるようになった。その後、  
469 1997年7月に「医薬品等安全性情報報告制度」として拡充し、2002年7月には薬事法  
470 が改正され、医師や薬剤師等の医薬関係者による副作用等の報告を義務化することにより、副  
471 作用等に関する情報の収集体制がより一層強化された。2006年6月の薬事法改正による登録  
472 販売者制度の導入に伴い、登録販売者も本制度に基づく報告を行う医薬関係者として位置づけ  
473 られている。

474

475 【企業からの副作用等の報告制度】 医薬品の市販後においても、常にその品質、有効性及び安  
476 全性に関する情報を収集し、また、医薬関係者に必要な情報を提供することが、医薬品の適切  
477 な使用を確保する観点からも、企業責任として重要なことである。

478 製造販売業者等には、法第68条の10第1項の規定に基づき、その製造販売をし、又は承  
479 認を受けた医薬品について、その副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、その使用に  
480 よるものと疑われる感染症の発生等を知ったときは、その旨を定められた期限までに厚生労働



481 大臣に報告することが義務づけられている（別表5-4）。なお、実務上は、法第68条の13  
482 第3項の規定により、報告書を総合機構に提出することとされている。

483 なお、薬局開設者、医療施設の開設者、医薬品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師その  
484 他の医薬関係者（登録販売者を含む。）においては、法第68条の2の5第2項により、製造販  
485 売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならないこととされている。

486 本制度は、1979年の薬事法改正により制度化され、製造販売業者等に対して国への報告  
487 を求めてきたが、その後1996年の薬事法改正により、製造販売業者等が副作用等の情報収  
488 集の義務を負うことが明記されている。

489 1979年に創設された副作用・感染症報告制度において、医薬品等との関連が否定できな  
490 い感染症に関する症例情報の報告や研究論文等について、製造販売業者等に対して国への報告  
491 義務を課しているが、それに加えて2003年7月からは、その前年に行われた薬事法改正に  
492 より、血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業に対して、当該製品又は当該製品の原料  
493 又は材料による感染症に関する最新の論文や知見に基づき、当該企業が製造販売する生物由来  
494 製品の安全性について評価し、その成果を定期的に国へ報告する制度を導入している。

495 一般用医薬品に関しても、承認後の調査が製造販売業者等に求められており、副作用等の発  
496 現状況等の収集・評価を通じて、承認後の安全対策につなげている。具体的には既存の医薬品  
497 と明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、10年を超えない範囲で厚生労働大  
498 臣が承認時に定める一定期間（概ね8年）、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚  
499 生労働省へ提出する制度（再審査制度）が適用される。また、医療用医薬品で使用されていた  
500 有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として承認後の一定期間  
501 （概ね3年）、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められている。要指導医薬品は、上  
502 記と同様に調査結果の報告が求められている。

503

## 504 2) 副作用情報等の評価及び措置

505 収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等において評価・検討され、必要な  
506 安全対策が図られる。各制度により集められた副作用情報については、総合機構において専門委  
507 員の意見を聴きながら調査検討が行われ、その結果に基づき、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生  
508 審議会の意見を聴いて、使用上の注意の改訂の指示等を通じた注意喚起のための情報提供や、効  
509 能・効果や用法・用量の一部変更、調査・実験の実施の指示、製造・販売の中止、製品の回収等の  
510 安全対策上必要な行政措置を講じている。

511

512 【健康危機管理体制の整備】 1997年に厚生省（当時）は、血液製剤によるHIV感染被害  
513 を深く反省し、国民の信頼を回復するためには、健康危機管理体制を抜本的に見直すことが必  
514 要であるとの認識に立ち、健康危機管理、すなわち、医薬品、食中毒、感染症、飲料水等に起因

515 する、国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して、健康被害の発生予防、拡大防止等の対  
516 策を迅速に講じていくための体制を整備した。

517 健康危機管理に当たっては、国民の生命・健康に関わるという危機意識を常に持ち、事実  
518 対しては予断を持って判断することなく真摯に受け止め、科学的・客観的な評価を行うととも  
519 に、情報の広範な収集、分析の徹底と対応方針の弾力的な見直しに努め、国民に対して情報の  
520 速やかな提供と公表を行うことを基本としている。

521

## 522 2 医薬品による副作用等が疑われる場合の報告の仕方

523 法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告<sup>ccxxxviii</sup>では、保健衛生上の危害  
524 の発生又は拡大を防止するためとの趣旨に鑑みて、医薬品等<sup>ccxxxix</sup>によるものと疑われる、身体の  
525 変調・不調、日常生活に支障を来す程度の健康被害（死亡を含む。）について報告が求められてい  
526 る。なお、医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得る。ま  
527 た、安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健  
528 康被害についても報告がなされる必要がある。

529 医薬品の副作用は、使用上の注意に記載されているものだけとは限らず、また、副作用の症状  
530 がその医薬品の適応症状と見分けがつきにくい場合（例えば、かぜ薬による間質性肺炎など）も  
531 ある。したがって、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等からの訴えに素直に  
532 耳を傾け、あるいはそのような副作用があるのでないかという、真摯な対応がなされることが重  
533 要である<sup>ccxli</sup>。

534 報告様式（別表5-5）は、医薬品・医療機器等安全性情報と同様、総合機構ホームページか  
535 ら入手できる。また、関係機関・関係団体の協力の下、医学・薬学関係の専門誌等にも掲載され  
536 ている。報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門  
537 家においては、購入者等（健康被害を生じた本人に限らない）から把握可能な範囲で報告がなさ  
538 れればよい。なお、複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又  
539 は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直  
540 接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分である。


541 報告期限は特に定められていないが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告  
542 の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、

<sup>ccxxxviii</sup> 「医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について」（平成27年3月25日付け薬食発0325第19号厚生労働省医薬食品局長通知）の別添「「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領」により実施方法が示されている。

<sup>ccxxxix</sup> 医薬部外品又は化粧品による健康被害についても、自発的な情報協力が要請されている。  
なお、無承認無許可医薬品又は健康食品によると疑われる健康被害については、最寄りの保健所に連絡することとなっている。

<sup>ccxli</sup> 総合機構ホームページでは、製薬企業から報告された、医薬品の副作用が疑われる症例に関する情報について公表しており、使用上の注意に記載されていなくても、それらの中に類似の事例があれば、医薬品による副作用である可能性が考慮されるべきである。なお、疑われる症例に関する情報は、因果関係が評価されているものでないこと、重複が含まれることに留意すべきである。

543 法第68条の13第3項の規定に基づき、報  
 544 告書（別表5-5）を総合機構に送付することとされている。報告者に対しては、安全性  
 545 情報受領確認書が交付される。なお、本報告  
 546 情報は、令和3年4月から、ウェブサイトへ直接  
 547 入力することによる電子的な報告が可能とな  
 548 った。



### 551 III 医薬品の副作用等による健康被害の救済

552 サリドマイド事件、スモン事件等を踏まえ、  
 553 1979年に薬事法が改正され、医薬品の市販後の安全対策の強化を図るため、再審査・再評価  
 554 制度の創設、副作用等報告制度の整備、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための緊急  
 555 命令、廃棄・回収命令に関する法整備等がなされたが、それらと併せて、医薬品副作用被害救済  
 556 基金法（現「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成14年法律第192号）」）による救  
 557 済制度が創設された。

558 医薬品は、最新の医学・薬学の水準においても予見しえない副作用が発生することがあり、ま  
 559 た、副作用が起こり得ることが分かっているにもかかわらず、医療上の必要性から使用せざるをえない場合も  
 560 ある。また、副作用による健康被害については、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、  
 561 たとえ追求することが出来ても、多大な労力と時間を費やさなければならない。このため、医薬  
 562 品（要指導医薬品及び一般用医薬品を含む。）を適正に使用したにもかかわらず副作用による  
 563 一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を  
 564 図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度である。

#### 566 1) 医薬品副作用被害救済制度

567 医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、  
 568 製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より運営が開始された。

569 健康被害を受けた本人（又は家族）の給付請求を受けて、その健康被害が医薬品の副作用によ  
 570 るものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなど、医学的薬学的判断を要する事項につ  
 571 いて薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療  
 572 費、障害年金、遺族年金等の各種給付が行われる。

573 救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構  
 574 法第19条の規定に基づいて、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられるほか、  
 575 事務費については、その2分の1相当額は国庫補助により賄われている。

576

577 この医薬品副作用被害救済制度に加え、2002年の薬事法改正に際して、2004年4月1  
 578 日以降に生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、それを介して生じた感染等による疾病、  
 579 障害又は死亡について、医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行うことなどにより、生物由来  
 580 製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした「生物由来製品感染等  
 581 被害救済制度」が創設されている。

582 このほか、総合機構においては、関係製薬企業又は国からの委託を受けて、裁判上の和解が  
 583 成立したスモン患者に対して健康管理手当や介護費用の支払業務を行っている。また、(公財)  
 584 友愛福祉財団からの委託を受けて、血液製剤によるHIV感染者・発症者に対する健康管理費用  
 585 の支給等を行っている。

586

587 2) 医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介

588 医薬品副作用被害救済制度による被害者の救済には、医薬関係者の理解と協力が不可欠である。  
 589 要指導医薬品又は一般用医薬品の使用により副作用を生じた場合であって、その副作用による健  
 590 康被害が救済給付の対象となると思われたときには、医薬品の販売等に従事する専門家において  
 591 は、健康被害を受けた購入者等に対して救済制度があることや、救済事業を運営する総合機構の  
 592 相談窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待され、そのためには、救済給付の範囲や給付  
 593 の種類等に関する一定の知識が必要となる。

594 (a) 給付の種類

595 給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時  
 596 金及び葬祭料がある。給付の種類によっては請求期限が定められており、その期限を過ぎた  
 597 分については請求できないので注意する必要がある。

給付の種類		請求の期限
医療費	医薬品の副作用による疾病の治療(*)に要した費用を実費補償するもの(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分。)	医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内
医療手当	医薬品の副作用による疾病の治療(*)に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるもの(定額)	請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内
障害年金	医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるもの(定額)	請求期限なし
障害児養育年金	医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるもの(定額)	請求期限なし
遺族年金	生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるもの(定額)ただし、最高10年間を限度とする。	死亡のときから5年以内 <sup>ccxli</sup> 。遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合には、その死亡のときから2年以内。
遺族一時金	生計維持者以外の方が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるもの(定額)	遺族年金と同じ
葬祭料	医薬品の副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるもの(定額)	遺族年金と同じ

598 (\*) 医療費、医療手当の給付の対象となるのは副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合

ccxli ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内。

## 599 (b) 救済給付の支給対象範囲

600 医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって  
601 一定程度以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものである。

602 したがって、救済給付の対象となるには、添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、  
603 使用上の注意に従って使用されていることが基本となる。医薬品の不適正な使用による健康  
604 被害については、救済給付の対象とならない。

605 救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病のため、入院を必要と  
606 する程度の医療（必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる  
607 場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれる。）を受ける場合や、副作用によ  
608 る重い後遺障害（日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害。）が残った場合であり、医  
609 薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要せずに寛解し  
610 たような軽度のものについては給付対象に含まれない。

611 また、救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬  
612 品では、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤（人体に直接使用するものを除く）、一般用検査薬、一  
613 部の日局収載医薬品（精製水、ワセリン等）が該当する。

614 このほか、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品（い  
615 わゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。）の  
616 使用による健康被害についても救済制度の対象から除外されている。

## 617 (c) 救済給付の請求にあたって必要な書類

618 要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求<sup>ccxlii</sup>に当たっ  
619 ては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類（[受診証明書領収書等](#)）などのほか、そ  
620 の医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。  
621 医薬品の販売等に従事する専門家においては、販売証明書の発行につき円滑な対応を図る必  
622 要がある。

623

624 【医薬品PLセンター】 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良  
625 など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。

626 平成6年、~~製造物責任法（平成6年法律第85号。以下「PL法」という。）~~が国会において  
627 成立するに当たり、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の  
628 紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で附帯決議され、各業界に対して裁判によらな  
629 い紛争処理機関の設立が求められた。これを受けて、日本製薬団体連合会において、平成7年  
630 7月のPL法の施行と同時に[医薬品PLセンター](#)が開設された。

<sup>ccxlii</sup> 医薬品の副作用であるかどうか判断がつかい兼ねる場合でも、給付請求を行うことは可能である。

631 消費者が、医薬品又は医薬部外品に関する苦情（健康被害以外の損害も含まれる）について  
 632 製造販売元の企業と交渉するに当たって、公平・中立な立場で申立ての相談を受け付け、交渉  
 633 の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としている。

634

#### 635 IV 一般用医薬品に関する主な安全対策

##### 636 (a) アンプル入りかぜ薬

637 解熱鎮痛成分としてアミノピリン、スルピリンが配合されたアンプル入りかぜ薬の使用に  
 638 よる重篤な副作用（ショック）で、1959年から1965年までの間に計38名の死亡例  
 639 が発生した。

640 アンプル剤は他の剤形（錠剤、散剤等）に比べて吸収が速く、血中濃度が急速に高値に達  
 641 するため、通常用量でも副作用を生じやすいことが確認されたことから、1965年、厚生  
 642 省（当時）より関係製薬企業に対し、アンプル入りかぜ薬製品の回収が要請された。その後、  
 643 アンプル剤以外の一般用かぜ薬についても、1970年に承認基準<sup>ccxliiii</sup>が制定され、成分・分  
 644 量、効能・効果等が見直された。

##### 645 (b) 小柴胡湯<sup>しょうさいことう</sup>による間質性肺炎

646 小柴胡湯<sup>しょうさいことう</sup>による間質性肺炎については、1991年4月以降、使用上の注意に記載されて  
 647 いたが、その後、小柴胡湯<sup>しょうさいことう</sup>とインターフェロン製剤の併用例による間質性肺炎が報告された  
 648 ことから、1994年1月、インターフェロン製剤との併用を禁忌とする旨の使用上の注意  
 649 の改訂がなされた。しかし、それ以降も慢性肝炎患者が小柴胡湯<sup>しょうさいことう</sup>を使用して間質性肺炎が発  
 650 症し、死亡を含む重篤な転帰に至った例もあったことから、1996年3月、厚生省（当時）  
 651 より関係製薬企業に対して緊急安全性情報の配布が指示された。

##### 652 (c) 一般用かぜ薬による間質性肺炎

653 2003年5月までに、一般用かぜ薬の使用によると疑われる間質性肺炎の発生事例が、  
 654 計26例<sup>ccxliv</sup>報告された。厚生労働省では、

- 655 ● 一般用かぜ薬は、一般の消費者が自らの選択により購入して使用するものであること
  - 656 ● 間質性肺炎は重篤な副作用であり、その初期症状は一般用かぜ薬の効能であるかぜの  
 657 諸症状と区別が難しく、症状が悪化した場合には注意が必要なこと
- 658 を踏まえ、同年6月、一般用かぜ薬全般につき使用上の注意の改訂を指示することとした。  
 659 それ以前も一般用かぜ薬の使用上の注意において、「5～6回服用しても症状が良くならない

<sup>ccxliiii</sup> 承認審査の合理化、透明化を図るため、薬効群ごとに、その成分・分量、用法・用量、効能・効果等に関する概括的な基準を定めたもので、現在、かぜ薬のほか、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、胃腸薬、瀉下薬、鎮暈薬、眼科用薬、ビタミン主薬製剤、洗腸薬、駆虫薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、外用痔疾用薬、みずむし・たむし用薬、鎮痒消炎薬について、承認基準が制定されている。

いわゆるスイッチO.T.C医薬品等、承認基準に合致しない医薬品については、製薬企業が承認申請を行うに際してより詳細な資料の提出が要求され、有効性、安全性及び品質に関して厳格な審査が行われる。

660 場合には服用を中止して、専門家に相談する」等の注意がなされていたが、それらの注意に  
 661 加えて、まれに間質性肺炎の重篤な症状が起きることがあり、その症状は、かぜの諸症状と  
 662 区別が難しいため、症状が悪化した場合には服用を中止して医師の診療を受ける」旨の注意  
 663 喚起がなされることになった。

664 (d) 塩酸フェニルプロパノールアミン含有医薬品

665 塩酸フェニルプロパノールアミン（PPA）は、鼻充血や結膜充血を除去し鼻みず、鼻づ  
 666 まり等の症状の緩和を目的として、鼻炎用内服薬、鎮咳去痰薬<sup>がい たん</sup>、鎮咳去痰薬、かぜ薬等に配合  
 667 されていた。

668 PPA含有医薬品については、2000年5月米国において、女性が食欲抑制剤（日本我  
 669 が国での鼻炎用内服薬等における配合量よりも高用量）として使用した場合に、出血性脳卒  
 670 中の発生リスクとの関連性が高いとの報告がなされ、米国食品医薬品庁（FDA）から、米  
 671 国内におけるPPA含有医薬品の自主的な販売中止が要請された。

672 日本我が国では食欲抑制剤として承認されていないことなどから、同年11月、直ちに販  
 673 売を中止する必要はないものとして、心臓病の人や脳出血の既往がある人等は使用しないよ  
 674 う注意喚起を行っていた。しかし、2003年8月までに、PPAが配合された一般用医薬  
 675 品による脳出血等の副作用症例<sup>ccxlv</sup>が複数報告され、それらの多くが用法・用量の範囲を超え  
 676 た使用又は禁忌とされている高血圧症患者の使用によるものであった。そのため、厚生労働  
 677 省から関係製薬企業等に対して、使用上の注意の改訂、情報提供の徹底等を行うとともに、  
 678 代替成分としてプソイドエフェドリン塩酸塩（PSE）等への速やかな切替えにつき指示が  
 679 なされた。

680

## 681 V 医薬品の適正使用のための啓発活動

682 登録販売者においては、薬剤師とともに一般用医薬品の販売等に従事する医薬関係者（専門家）  
 683 として、適切なセルフメディケーションの普及定着、医薬品の適正使用の推進のため、こうした  
 684 活動に積極的に参加、協力することが期待される。

685 医薬品の持つ特質及びその使用・取扱い等について正しい知識を広く生活者に浸透させること  
 686 により、保健衛生の維持向上に貢献することを目的とし、毎年10月17日～23日の1週間を  
 687 「薬と健康の週間」として、国、自治体、関係団体等による広報活動やイベント等が実施されて  
 688 いる<sup>ccxlv</sup>。

689 また、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」を広く普及し、薬物乱用防止を一層推進するため、毎  
 690 年6月20日～7月19日までの1ヶ月間、国、自治体、関係団体等により、「ダメ。ゼッタイ。」

ccxlv なお、これらの症例は、いずれも回復又は軽快している。

ccxlvii 法第68条の3において、「国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品及び医療機器の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努める」と規定されている。

691 普及運動が実施されている。薬物乱用や薬物依存は、違法薬物（麻薬、覚醒せい剤、大麻等）によ  
 692 るものばかりでなく、一般用医薬品によっても生じ得る。特に、青少年では、薬物乱用の危険性  
 693 に関する認識や理解が必ずしも十分でなく、好奇心から身近に入手できる薬物（一般用医薬品を  
 694 含む。）を興味本位で乱用することがある。要指導医薬品又は一般用医薬品の乱用をきっかけとし  
 695 て<sup>ccxlvii</sup>、違法な薬物の乱用につながることもあり、その場合、乱用者自身の健康を害するだけで  
 696 なく、社会的な弊害を生じるおそれ大きい<sup>ccxlviii</sup>。医薬品の適正使用の重要性等に関して、小中  
 697 学生のうちからの啓発が重要である。  
 698

<sup>ccxlvii</sup> 一般用医薬品においても、エフェドリン、コデイン（鎮咳去痰薬に限る。）、ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る。）、  
 プロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン及びメチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。）の水和物及びそ  
 の塩類を有効成分として含有する製剤は濫用等のおそれのある医薬品として指定されている。

<sup>ccxlviii</sup> 大量摂取やアルコールとの同時摂取による急性中毒から転倒、昏睡、死亡などのほか、長期の乱用によって、臓器障  
 害、情緒不安定、対人関係・社会生活上の障害などにいたった事例が報告されている。



699  
700  
701

第5章 別表

I - 1) 関係

5-1. 主な使用上の注意の記載とその対象成分・薬効群等

● 「してはいけないこと」		
「次の人は使用（服用）しないこと」		
○ アレルギーの既往歴	主な成分・薬効群等	理 由
「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人」	かぜ薬、解熱鎮痛薬	アレルギー症状の既往歴のある人が再度使用した場合、ショック（アナフィラキシー）、皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症（ライエル症候群）等の重篤なアレルギー性の副作用を生じる危険性が高まるため。
	デキストロメトトルファン臭化水素酸塩水和物、 <a href="#">デキストロメトトルファンフェノールフタリン酸塩</a> <a href="#">デキストロメトトルファン</a>	
	クエン酸チペピジン、チペピジンヒベンズ酸塩	
	アミノフィリン水和物、テオフィリン	
	リドカイン、リドカイン塩酸塩	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩、ベラドンナ総アルカロイド・ <a href="#">塩酸</a> <a href="#">ブソイドエフェドリン</a> <a href="#">塩酸</a> <a href="#">塩</a> ・カフェイン又は <del>ク</del> クロルフェニラミンマレイン酸塩・ <del>ベ</del> ラドンナ総アルカロイド・ <a href="#">ソ</a> イドエフェドリン硫酸塩・カフェインを含有する鼻炎用内服薬	
	ヨードチンキを含有するみずむし・たむし用薬	
	ポビドンヨードが配合された含嗽薬、口腔咽喉薬、殺菌消毒薬 ブチルスコポラミン臭化物	
	ロペラミド塩酸塩	
	メキタジン	
リドカイン、リドカイン塩酸塩、アミノ安息香酸エチル、塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル又はジブカイン塩酸塩が配合された外用痔疾用薬（坐薬、注入軟膏）	喘息発作を誘発するおそれがあるため。	
インドメタシン、フェルピナク、ケトプロフェン又はピロキシカムが配合された外用鎮痛消炎薬		
「 <a href="#">喘息ぜんそく</a> を起こしたことがある人」		
「本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を使用（服用）して <a href="#">喘息ぜんそく</a> を起こしたことがある人」	アセトアミノフェン、アスピリン、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン等の解熱鎮痛成分	アスピリン喘息を誘発するおそれがあるため。
「次の医薬品によるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人 チアプロフェン酸を含有する解熱鎮痛薬、スプロフェンを含有する外用鎮痛消炎薬、フェノフィブラートを含有する高脂血症治療薬」	ケトプロフェンが配合された外用鎮痛消炎薬	接触皮膚炎、光線過敏症を誘発するおそれがあるため。
「次の添加物によるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人 オキシベンゾン、オクトクリレン		接触皮膚炎を誘発するおそれがあるため。

を含有する製品（日焼け止め、香水等）」		
「本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人」	リゾチーム塩酸塩	リゾチーム塩酸塩は、鶏卵の卵白から抽出したタンパク質であり、鶏卵アレルギーの人でリゾチーム塩酸塩が配合された医薬品を服用して重篤なアレルギー症状を呈したとの報告があるため。
「本剤又は本剤の成分、牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人」	タンニン酸アルブミン カゼイン、カゼインナトリウム等（添加物）	タンニン酸アルブミンは、乳製カゼインを由来としているため。 カゼインは牛乳タンパクの主成分であり、牛乳アレルギーのアレルゲンとなる可能性があるため。
○ 症状・状態		
「次の症状がある人」	主な成分・薬効群等	理由
胃酸過多	カフェイン、無水カフェイン、カフェインクエン酸塩等のカフェインを含む成分を主薬とする 眠気防止薬	カフェインが胃液の分泌を亢進し、症状を悪化させるおそれがあるため。
前立腺肥大による排尿困難	プソイドエフェドリン塩酸塩	交感神経刺激作用により、尿の貯留・尿閉を生じるおそれがあるため。
激しい腹痛又は吐き気・嘔吐	ヒマシ油が配合された瀉下薬	急性腹症（腸管の狭窄、閉塞、腹腔内器官の炎症等）の症状である可能性があるため。
「患部が化膿している人」 「次の部位には使用しないこと： 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部」	ステロイド性抗炎症成分が配合された外用薬	細菌等の感染に対する抵抗力を弱めて、感染を増悪させる可能性があるため。
	インドメタシン、フェルピナク、ケトプロフェン又はピロキシカムが配合された外用薬	感染に対する効果はなく、逆に感染の悪化が自覚されにくくなるおそれがあるため。
○ 基礎疾患等		
「次の診断を受けた人」	主な成分・薬効群等	理由
心臓病	プソイドエフェドリン塩酸塩	徐脈又は頻脈を引き起こし、心臓病の症状を悪化させるおそれがあるため。
	芍薬甘草湯	
胃潰瘍	カフェイン、無水カフェイン、カフェインクエン酸塩等のカフェインを含む成分を主薬とする 眠気防止薬	胃液の分泌が亢進し、胃潰瘍の症状を悪化させるおそれがあるため。
高血圧	プソイドエフェドリン塩酸塩	交感神経興奮作用により血圧を上昇させ、高血圧を悪化させるおそれがあるため。
甲状腺機能障害		甲状腺機能亢進症の主症状は、交感神経系の緊張等によってもたらされおり、交感神経系を興奮させる成分は、症状を悪化させるおそれがあるため。
糖尿病		肝臓でグリコーゲンを分解して血糖値を上昇させる作用があり、糖尿病を悪化させるおそれがあるため。
「日常的に不眠の人、不眠症の診断を受けた人」	抗ヒスタミン成分を主薬とする 催眠鎮静薬（睡眠改善薬）	睡眠改善薬は、慢性的な不眠症状に用いる医薬品でないため。 医療機関において不眠症の治療を受けている場合には、その治療を妨げるおそれがあるため。
その他	主な成分・薬効群等	理由
「透析療法を受けている人」	スクラルファート、水酸化アルミニウムゲル、ケイ酸アルミン酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウム、合成ヒドロタルサイト、アルジオキサ等のアルミニウムを含む成分が配合された胃腸薬、胃腸鎮痛鎮痙薬	長期間服用した場合に、アルミニウム脳症及びアルミニウム骨症を発生したとの報告があるため。
「口の中に傷やひどいただれのある人」	クロルヘキシジングルコン酸塩が配合された製剤 （口腔内への適応を有する場合）	傷やただれの状態を悪化させるおそれがあるため。
○ 小児における年齢制限		
	主な成分・薬効群等	理由

「15歳未満の小児」	アスピリン、アスピリンアルミニウム、サザピリン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、サリチル酸ナトリウム	外国において、ライ症候群の発症との関連性が示唆されているため。
	プロメタジン塩テオタル酸塩等のプロメタジンを含む成分	外国において、乳児突然死症候群、乳児睡眠時無呼吸発作のような致命的な呼吸抑制が現れたとの報告があるため。
	イブプロフェン	一般用医薬品では、小児向けの製品はないため。
	抗ヒスタミン成分を主薬とする催眠鎮静薬（睡眠改善薬）	小児では、神経過敏、興奮を起こすおそれがあるため。
	オキセサゼイン	一般用医薬品では、小児向けの製品はないため。
	ロペラミド	外国で乳幼児が過量摂取した場合に、中枢神経系障害、呼吸抑制、腸管壊死に至る麻痺性イレウスを起こしたとの報告があるため。
「6歳未満の小児」	アミノ安息香酸エチル	メトヘモグロビン血症を起こすおそれがあるため。
「3歳未満の小児」	ヒマシ油類	
○ 妊婦、授乳婦等		
	主な成分・薬効群等	理由
「妊婦又は妊娠していると思われる人」	ヒマシ油類	腸の急激な動きに刺激されて流産・早産を誘発するおそれがあるため。
	ジフェンヒドラミン塩酸塩を主薬とする催眠鎮静薬（睡眠改善薬）	妊娠に伴う不眠は、睡眠改善薬の適用症状でないため。
	エチルエストロジオール、エストラジオール	妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって、胎児の先天性異常の発生が報告されているため。
	オキセサゼイン	妊娠中における安全性は確立されていないため。
「出産予定日12週以内の妊婦」	アスピリン、アスピリンアルミニウム、イブプロフェン	妊娠期間の延長、胎児の動脈管の収縮・早期閉鎖、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加のおそれがあるため。
「授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること」	ジフェンヒドラミン塩酸塩、ジフェンヒドラミンサリチル酸塩等のジフェンヒドラミンを含む成分が配合された内服薬、点鼻薬、坐薬、注入軟膏	乳児に昏睡を起こすおそれがあるため。
	アミノフィリン水和物、テオフィリンが配合された鎮咳去痰薬、鎮暈薬	乳児に神経過敏を起こすことがあるため。
	ロートエキスが配合された内服薬、外用痔疾用薬（坐薬、注入軟膏）	乳児に頻脈を起こすおそれがあるため。（なお、授乳婦の乳汁分泌が抑制されることがある。）
	センノシド、センナ、ダイオウ又はカサントラノールが配合された内服薬	乳児に下痢を起こすおそれがあるため。
	ヒマシ油類 コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩	コデインで、母乳への移行により、乳児でモルヒネ中毒が生じたとの報告があるため。
「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」		
薬効群	主な成分等	懸念される症状
かぜ薬、催眠鎮静薬、乗酔酔い防止薬、鎮咳去痰薬、口腔咽喉薬、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬、内服痔疾用薬	ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩等の抗ヒスタミン成分	眠気等
かぜ薬、鎮咳去痰薬	コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩	
解熱鎮痛薬、催眠鎮静薬	プロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素	
止瀉薬	ロペラミド塩酸塩、ロートエキス	

胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い防止薬	スコポラミン臭化水素酸塩水和物、メチルオクタトロピン臭化物	眠気、目のかすみ、異常なまぶしさを生じることがあるため。
胃腸薬	ピレンゼピン塩酸塩水和物	目のかすみ、異常なまぶしさを生じることがあるため。
かぜ薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い防止薬	スコポラミン臭化水素酸塩水和物、メチルオクタトロピン臭化物以外の抗コリン成分	
○ 連用に関する注意		
薬効群	主な成分等	理由
かぜ薬、解熱鎮痛薬、抗菌性点眼薬、鼻炎用内服薬、鎮静薬、アレルギー用薬 「長期連用しないこと」	(成分によらず、当該薬効群の医薬品すべてに記載)	一定期間又は一定回数使用しても症状の改善がみられない場合は、ほかに原因がある可能性があるため。
外用鎮痛消炎薬 「長期連用しないこと」	インドメタシン、フェルビナク、ケトプロフェン、ピロキシカム	
瀉下薬 「連用しないこと」	ヒマシ油	
鼻炎用点鼻薬 「長期連用しないこと」	(成分によらず、左記薬効群の医薬品すべてに記載)	二次充血、鼻づまり等を生じるおそれがある。
眠気防止薬 「短期間の服用にとどめ、連用しないこと」	カフェイン、無水カフェイン、カフェインクエン酸塩等のカフェインを含む成分	眠気防止薬は、一時的に緊張を要する場合に居眠りを防止する目的で使用されるものであり、連用によって睡眠が不要になるというものではなく、短期間の使用にとどめ、適切な睡眠を摂る必要があるため。
短期間の服用に限られる漢方生薬製剤 「短期間の服用にとどめ、連用しないこと」	グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレチン酸、カンゾウ等のグリチルリチン酸を含む成分 (1日用量がグリチルリチン酸として40mg以上、又はカンゾウとして1g以上を含有する場合)	偽アルドステロン症を生じるおそれがあるため。
外用痔疾用薬(坐薬、注入軟膏) 「長期連用しないこと」		
漢方生薬製剤以外の鎮咳去痰薬、瀉下剤、婦人薬 「長期連用しないこと」		
胃腸薬、胃腸鎮痛鎮痙薬 「長期連用しないこと」		
外用痔疾用薬、化膿性皮膚疾患用薬、鎮痒消炎薬、しもやけ・あかぎれ用薬 「長期連用しないこと」	ステロイド性抗炎症成分 (コルチゾン換算で1g又は1mLあたり0.025mg以上を含有する場合。ただし、坐薬及び注入軟膏では、含量によらず記載)	副腎皮質の機能低下を生じるおそれがあるため。
漢方製剤 「症状があるときだけの服用にとどめ、連用しないこと」	芍薬甘草湯	うつ血鬱血性心不全、心室頻拍の副作用が現れることがあるため。
止瀉薬 「1週間以上継続して服用しないこと」	次没食子酸ピスマス、次硝酸ピスマス等のピスマスを含む成分	海外において、長期連用した場合に精神神経症状が現れたとの報告があるため。
浣腸薬 「連用しないこと」	(成分によらず、当該薬効群の医薬品に記載)	感受性の低下(いわゆる“慣れ”)が生じて、習慣的に使用される傾向があるため。
駆虫薬 「〇〇以上続けて服用しないこと」 (承認内容により、回数又は日数を記載)		過度に服用しても効果が高まることはなく、かえって副作用を生じるおそれがあるため。 虫卵には駆虫作用が及ばず、成虫になるのを待つため、1ヶ月以上の間隔を置く必要があるため。

「大量に使用（服用）しないこと」		
	主な成分・薬効群	理由
	センナ、センノシド、ダイオウ、カサントラノール、ピサコジル、ピコスルファートナトリウム等の刺激性瀉下成分が配合された瀉下剤	腸管粘膜への刺激が大きくなり、腸管粘膜に炎症を生じるおそれがあるため。
○ 乱用に関する注意		
	主な成分・薬効群等	理由
「過量服用・長期連用しないこと」	コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩が配合された鎮咳去痰薬（内服液剤）	倦怠感や虚脱感等が現れることがあるため。 依存性・習慣性がある成分が配合されており、乱用事例が報告されているため。
○ 食品との相互作用に関する注意		
	主な成分・薬効群等	懸念される相互作用
「服用前後は飲酒しないこと」	かぜ薬、解熱鎮痛薬	肝機能障害、胃腸障害が生じるおそれがあるため。
	次硝酸ピスマス、次没食子酸ピスマス等のピスマスを含む成分	吸収増大による精神神経系障害が生じるおそれがあるため。
	プロモバレリル尿素又はアリルイソプロピルアセチル尿素が配合された解熱鎮痛薬、催眠鎮静薬、乗物酔い防止薬	鎮静作用の増強が生じるおそれがあるため。
	抗ヒスタミン成分を主薬とする催眠鎮静薬	
「コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないこと」	カフェイン、無水カフェイン、カフェインクエン酸塩等のカフェインを含む成分を主薬とする眠気防止薬	カフェインが過量摂取となり、中枢神経系、循環器系等に作用が強く現れるおそれがあるため。
○ 併用薬に関する注意		
「本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないこと」	主な成分・薬効群等	懸念される相互作用
他の瀉下薬（下剤）	茵陳蒿湯、大黃甘草湯、大黃牡丹皮湯、麻子仁丸、桃核承氣湯、防風通聖散、三黃瀉心湯、大柴胡湯、乙字湯（ダイオウを含む場合）、瀉下成分が配合された駆虫薬	激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすくなるため。
ヒマシ油	駆虫薬（瀉下成分が配合されていない場合）	駆虫成分が腸管内にとどまらず吸収されやすくなるため。
駆虫薬	ヒマシ油	
○ その他：副作用等为了避免するため必要な注意		
「次の部位には使用しないこと」	主な成分・薬効群等	理由
目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）	みずむし・たむし用薬	皮膚刺激成分により、強い刺激や痛みを生じるおそれがあるため。
目の周囲、粘膜等	外用鎮痒消炎薬（エアゾール剤に限る）	エアゾール剤は特定の局所に使用することが一般に困難であり、目などに薬剤が入るおそれがあるため。
	外用鎮痛消炎薬	皮膚刺激成分により、強い刺激や痛みを生じるおそれがあるため。
湿疹、かぶれ、傷口		
陰のう、外陰部等	みずむし・たむし用薬	角質層が薄いため白癬菌は寄生しにくく、いんきん・たむしではなく陰のう湿疹等、他の病気である可能性があるため。また、皮膚刺激成分により、強い刺激や痛みを生じるおそれがあるため。
湿疹		湿疹に対する効果はなく、誤って使用すると悪化させるおそれがあるため。
湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部	（液剤、軟膏剤又はエアゾール剤の場合）	刺激成分により、強い刺激や痛みが現れることがあるため。
目の周囲、粘膜、やわらかな皮膚面（首の回り等）、顔面等	うおのめ・いぼ・たこ用薬	角質溶解作用の強い薬剤であり、誤って目に入ると障害を与える危険性があるため。 粘膜や首の回り等の柔らかい皮膚面、顔面等に対しては作用が強すぎるため。

炎症又は傷のある患部		刺激が強く、症状を悪化させるおそれがあるため。
ただれ、化膿 <sup>のう</sup> している患部	殺菌消毒薬（液体絆創膏 <sup>ばんそうこう</sup> ）	湿潤した患部に用いると、分泌液が貯留して症状を悪化させることがあるため。
湿潤、ただれのひどい患部、深い傷、ひどいやけどの患部	バントラシンが配合された化膿 <sup>のう</sup> 性皮膚疾患用薬	刺激が強く、症状を悪化させるおそれがあるため。
「本剤の使用中は、天候にかかわらず、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も本剤の塗布部を衣服、サポーター等で覆い、紫外線に当てないこと。なお、塗布後も当分の間、同様の注意をすること」	ケトプロフェンが配合された外用鎮痛消炎薬	使用中又は使用後しばらくしてから重篤な光線過敏症が現れることがあるため。

703

I - 1) 関係

704

5-2. 主な使用上の注意の記載とその対象成分・薬効群等

● 「相談すること」	
○ 「妊婦又は妊娠していると思われる人」	
主な成分・薬効群等	理由
アスピリン、アスピリンアルミニウム、サザピリン、エテンザミド、サリチルアミド、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェンが配合されたかぜ薬、解熱鎮痛薬	妊娠末期のラットに投与した実験において、胎児に弱い動脈管の収縮がみられたとの報告があるため。 なお、アスピリンについては、動物実験（ラット）で催奇形性が現れたとの報告があるため。また、イソプロピルアンチピリンについては、化学構造が類似した他のピリン系解熱鎮痛成分において、動物実験（マウス）で催奇形性が報告されているため。
プロモバレリル尿素が配合されたかぜ薬、解熱鎮痛薬、催眠鎮静薬、乗物酔い防止薬	胎児障害の可能性があるため、使用を避けることが望ましいため。
ベタネコール塩化物、ウルソデオキシコール酸、 副腎皮質ホルモンが配合された外用痔疾用薬、鎮痒消炎薬	
コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩が配合されたかぜ薬、鎮咳去痰薬	麻薬性鎮咳成分であり、吸収された成分の一部が胎盤関門を通過して胎児へ移行することが知られているため。コデインリン酸塩水和物については、動物実験（マウス）で催奇形性が報告されているため。
瀉下薬 （カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ジオクチルソジウムスルホサクシネート又はブランタゴ・オパタ種皮のみからなる場合を除く）	腸の急激な動きに刺激されて流産・早産を誘発するおそれがあるため。
洗腸薬、外用痔疾用薬（坐薬、注入軟膏）	
「妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人」	ビタミンA主薬製剤、ビタミンAD主薬製剤
	ビタミンAを妊娠3ヶ月前から妊娠3ヶ月までの間に栄養補助剤から1日10,000国際単位以上を継続的に摂取した婦人から生まれた児に、先天異常（口裂、耳・鼻の異常等）の発生率の増加が認められたとの研究報告があるため。
○ 「授乳中の人」	
薬効群	乳汁中に移行する可能性がある主な成分等
かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬	#メチルエフェドリン塩酸塩、#メチルエフェドリンサッカリン塩、トリプロリジン塩酸塩水和物、プソイドエフェドリン塩酸塩、ペンタキシベリンクエン酸塩、アスピリン、アスピリンアルミニウム、イブプロフェン
かぜ薬、解熱鎮痛薬、眠気防止薬、乗物酔い防止薬、鎮咳去痰薬 （カフェインとして1回分量100mg以上を含有する場合）	カフェイン、無水カフェイン、安息香酸ナトリウムカフェイン
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い防止薬	メチルオクタトロピン臭化物、メチキセン塩酸塩、ジサイクロミン塩酸塩
外用痔疾用薬（坐薬、注入軟膏）	メチルエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリンサッカリン塩
止瀉薬	ロベラミド塩酸塩
婦人薬	エチニルエストラジオール、エストラジオール
○ 「高齢者」	
主な成分・薬効群等	理由
解熱鎮痛薬、鼻炎用内服薬	効き目が強すぎたり、副作用が現れやすいため。
グリセリンが配合された洗腸薬	
メチルエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリンサッカリン塩、プソイドエフェドリン塩酸塩、トリメトキノール塩酸塩水和物、メトキシフェナミン塩酸塩等のアドレナリン作動成分又はマオウが配合された内服薬、外用痔疾用薬（坐薬、注入軟膏）	心悸亢進、血圧上昇、糖代謝促進を起しやすいため。

グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレチン酸又はカンゾウが配合された内服薬、外用痔疾用薬（坐薬、注入軟膏） （1日用量がグリチルリチン酸として40mg以上、又はカンゾウとして1g以上を含有する場合）		偽アルドステロン症を生じやすいため。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物、メチルオクタトロピン臭化物、イソプロパミドヨウ化物等の抗コリン成分又はロートエキスが配合された内服薬、外用痔疾用薬（坐薬、注入軟膏）		緑内障の悪化、口渇、排尿困難又は便秘の副作用が現れやすいため。
○ 小児に対する注意		
	主な成分等	理由
発熱している小児、けいれんを起こしたことがある小児	テオフィリン、アミノフィリン水和物	けいれんを誘発するおそれがあるため。
「水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）」	サリチルアミド、エテンザミド	構造が類似しているアスピリンにおいて、ライ症候群の発症との関連性が示唆されており、原則として使用を避ける必要があるため。
1ヶ月未満の乳児（新生児）	マルツエキス	身体が非常に未熟であり、安易に瀉下薬を使用すると脱水症状を引き起こすおそれがあるため。
○ アレルギーの既往歴		
	主な成分	理由
「薬によりアレルギー症状や喘息ぜんそくを起こしたことがある人」	黄色4号（タートラジン）（添加物） ガジュツ末・真昆布末を含む製剤	喘息誘発のおそれがあるため。 まれにアナフィラキシーを起こすことがあるため。
○ 特定の症状・状態		
「次の症状がある人」	主な成分・薬効群等	理由
高熱	かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、小児五疳薬	かぜ以外のウイルス性の感染症その他の重篤な疾患の可能性があるため。
けいれん	ピペラジンリン酸塩水和物等のピペラジンを含む成分	けいれんを起したことがある人では、発作を誘発する可能性があるため。
むくみ	グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレチン酸、カンゾウ等のグリチルリチン酸を含む成分 （1日用量がグリチルリチン酸として40mg以上、又はカンゾウとして1g以上を含有する場合）	偽アルドステロン症の発症のおそれが特にあるため。
下痢	緩下作用のある成分が配合された内服痔疾用薬	下痢症状を助長するおそれがあるため。
はげしい下痢	小児五疳薬	大腸炎等の可能性があるため。
急性のはげしい下痢又は腹痛・腹部膨満感・吐きけ等の症状を伴う下痢	タンニン酸アルブミン、次硝酸ビスマス、次没食子酸ビスマス等の収斂成分を主体とする止瀉薬 ロペラミド塩酸塩	下痢を止めるとかえって症状を悪化させることがあるため。
発熱を伴う下痢、血便又は粘液便の続く人 便秘を避けなければならない肛門疾患		便秘が引き起こされることがあるため。
はげしい腹痛	瀉下薬（ヒマシ油、マルツエキスを除く）、洗腸薬、ピサコジルを主薬とする坐薬	急性腹症（腸管の狭窄、閉塞、腹腔内器官の炎症等）の可能性があり、瀉下薬や洗腸薬の配合成分の刺激によって、その症状を悪化させるおそれがあるため。
吐き気・嘔吐		
痔出血	グリセリンが配合された洗腸薬	腸管、肛門に損傷があると、傷口からグリセリンが血管内に入って溶血を起こすことや、腎不全を起こすおそれがあるため。
出血傾向	セミアルカリプロティナーゼ、プロメライン	フィブリノゲン、フィブリンを分解するたんぱく分解酵素であり、出血傾向を増悪させるおそれがあるため。
排尿困難	ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩等の抗ヒスタミン成分	排尿筋の弛緩と括約筋の収縮が起こり、尿の貯留を来すおそれがあるため。特に、前立腺肥大症を伴



	ジフェニドール塩酸塩 構成生薬としてマオウを含む漢方処方製剤 スコポラミン臭化水素酸塩水和物、メチルオクタトロピン臭化物、イソプロパミドヨウ化物等の抗コリン成分 ロートエキス	っている場合には、尿閉を引き起こすおそれがあるため。
口内のひどいただれ	含嗽薬	粘膜刺激を起こすおそれのある成分が配合されている場合があるため。
はげしい目の痛み	眼科用薬	急性緑内障、角膜潰瘍又は外傷等の可能性が考えられるため。 特に、急性緑内障の場合には、専門医の処置によって早急に眼圧を下げないと失明の危険性があり、角膜潰瘍の場合も、専門医による適切な処置を施さないと視力障害等を来すことがあるため。
○ 基礎疾患等		
「次の診断を受けた人」	主な成分・薬効群等	理 由
てんかん	ジプロフィリン	中枢神経系の興奮作用により、てんかんの発作を引き起こすおそれがあるため。
胃・十二指腸潰瘍	アスピリン、アスピリンアルミニウム、エテンザミド、イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、サリチルアミド	胃・十二指腸潰瘍を悪化させるおそれがあるため。
	次硝酸ビスマス、次没食子酸ビスマス等のビスマスを含む成分	ビスマスの吸収が高まり、血中に移行する量が多くなり、ビスマスによる精神神経障害等が発現するおそれがあるため。
肝臓病	小柴胡湯	間質性肺炎の副作用が現れやすいため。
	アスピリン、アスピリンアルミニウム、エテンザミド、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン	肝機能障害を悪化させるおそれがあるため。
	サントニン	肝臓における代謝が円滑に行われず、体内への蓄積によって副作用が現れやすくなるため。
	ピペラジンリン酸塩等のピペラジンを含む成分 ガジュツ末・真昆布末を含む製剤	肝機能障害を起こすことがあるため。
甲状腺疾患	ポピドンヨード、ヨウ化カリウム、ヨウ素等のヨウ素系殺菌消毒成分が配合された口腔咽喉薬、含嗽薬	ヨウ素の体内摂取が増える可能性があり、甲状腺疾患の治療に影響を及ぼすおそれがあるため。
甲状腺機能障害 甲状腺機能亢進症	アドレナリン作用成分が配合された鼻炎用点鼻薬	甲状腺機能亢進症の主症状は、交感神経系の緊張等によってもたらされており、交感神経系を興奮させる成分は、症状を悪化させるおそれがあるため。
	メチルエフェドリン塩酸塩、トリメトキノール塩酸塩水和物、フェニレフリン塩酸塩、メトキシフェナミン塩酸塩等のアドレナリン作動成分	
	マオウ	
	ジプロフィリン	中枢神経系の興奮作用により、症状の悪化を招くおそれがあるため。
高血圧	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物、沈降炭酸カルシウム、無水リン酸水素カルシウム、リン酸水素カルシウム水和物、乳酸カルシウム水和物	甲状腺ホルモンの吸収を阻害するおそれがあるため
	アドレナリン作用成分が配合された鼻炎用点鼻薬	交感神経興奮作用により血圧を上昇させ、高血圧を悪化させるおそれがあるため。
	メチルエフェドリン塩酸塩、トリメトキノール塩酸塩水和物、フェニレフリン塩酸塩、メトキシフェナミン塩酸塩等のアドレナリン作動成分	
	マオウ	
	グリチルリチン酸二カリウム、グリチルリチン酸、カンゾウ等のグリチルリチン酸を含む成分 (1日用量がグリチルリチン酸として40mg以上、又はカンゾウとして1g以下)	大量に使用するとナトリウム貯留、カリウム排泄促進が起こり、むくみ(浮腫)等の症状が現れ、高血圧を悪化させるおそれがあるため。

心臓病	上を含有する場合	心臓に負担をかけ、心臓病を悪化させるおそれがあるため。	
	アドレナリン作動成分が配合された鼻 炎用点鼻薬		
	メチルエフェドリン塩酸塩、トリメトキ ノール塩酸塩水和物、フェニレフリン塩 酸塩、メトキシフェナミン塩酸塩等のア ドレナリン作動成分、ジプロフィリン等 のアドレナリン作動成分		
	マオウ		
	スコボラミン臭化水素酸塩水和物、メチ ルオクタトロピン臭化物、イソプロパミ ドヨウ化物等の抗コリン成分		
	ロートエキス		
	アスピリン、アスピリンアルミニウム、 エテンザミド、イブプロフェン、アセト アミノフェン		むくみ（浮腫）、循環体液量の増加が起こり、心臓 の仕事量が増加し、心臓病を悪化させるおそれがあるため。
	グリチルリチン酸の塩類、カンゾウ又は そのエキス （1日用量がグリチルリチン酸として 40mg以上、又はカンゾウとして1g以 上を含有する場合）		大量に使用するとナトリウム貯留、カリウム排泄 促進が起こり、むくみ（浮腫）等の症状が現れ、心 臓病を悪化させるおそれがあるため。
硫酸ナトリウム	血液中の電解質のバランスが損なわれ、心臓の負 担が増加し、心臓病を悪化させるおそれがあるた め。		
グリセリンが配合された浣腸薬	排便直後に、急激な血圧低下等が現れることがあ り、心臓病を悪化させるおそれがあるため。		
腎臓病	アスピリン、アスピリンアルミニウム、 エテンザミド、イブプロフェン、アセト アミノフェン	むくみ（浮腫）、循環体液量の増加が起こり、腎臓 病を悪化させるおそれがあるため。	
	グリチルリチン酸二カリウム、グリチル リチン酸、カンゾウ （1日用量がグリチルリチン酸として 40mg以上、又はカンゾウとして1g以 上を含有する場合）	大量に使用するとナトリウム貯留、カリウム排泄 促進が起こり、むくみ（浮腫）等の症状が現れ、腎 臓病を悪化させるおそれがあるため。	
	スクラルファート、水酸化アルミニウム ゲル、ケイ酸アルミン酸マグネシウム、 ケイ酸アルミニウム、合成ヒドロタルサ イト、アルジオキサ等のアルミニウムを 含む成分が配合された胃腸薬、胃腸鎮痛 鎮痙薬	過剰のアルミニウムイオンが体内に貯留し、アル ミニウム脳症、アルミニウム骨症を生じるおそれ があるため。 使用する場合には、医療機関において定期的に血 中アルミニウム、リン、カルシウム、アルカリフォ スファターゼ等の測定を行う必要があるため。	
	制酸成分を主体とする胃腸薬 酸化マグネシウム、水酸化マグネシウ ム、硫酸マグネシウム等のマグネシウム を含む成分、硫酸ナトリウムが配合され た瀉下薬	ナトリウム、カルシウム、マグネシウム等の無機塩 類の排泄が遅れたり、体内貯留が現れやすいため。	
	ピペラジンリン酸塩等のピペラジン を含む成分、プソイドエフェドリン塩酸塩	腎臓における排泄が円滑に行われず、副作用が現 れやすくなるため。	
糖尿病	アドレナリン作動成分が配合された鼻 炎用点鼻薬	肝臓でグリコーゲンを分解して血糖値を上昇させ る作用があり、糖尿病の症状を悪化させるおそれ があるため。	
	メチルエフェドリン塩酸塩、トリメトキ ノール塩酸塩水和物、フェニレフリン塩 酸塩、メトキシフェナミン塩酸塩等のア ドレナリン作動成分		
	マオウ		
緑内障	眼科用薬	緑内障による目のかすみには効果が期待できず、 また、充血除去作用成分が配合されている場合に は、眼圧が上昇し、緑内障を悪化させるおそれあ るため。	
	パパベリン塩酸塩	眼圧が上昇し、緑内障を悪化させるおそれがある ため。	
	抗コリン成分が配合された鼻炎用内服 薬、抗コリン成分が配合された鼻炎用点 鼻薬	抗コリン作用によって房水流出路（房水通路）が狭 くなり、眼圧が上昇し、緑内障を悪化させるおそれ があるため。	
	ペントキシベリンクエン酸塩		

	スコポラミン臭化水素酸塩水和物、メチルオクタトロピン臭化物、イソプロバミドヨウ化物等の抗コリン成分	
	ロートエキス	
	ジフェニドール塩酸塩	
	ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩等の抗ヒスタミン成分	
血液凝固異常	セミアルカリプロテナーゼ、プロメライン	フィブリノゲン、フィブリンを分解するたんぱく分解酵素であり、出血傾向を増悪させるおそれがあるため。
血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等）、血栓症を起こすおそれのある人	トラネキサム酸（内服）、セトラキサート塩酸塩	生じた血栓が分解されにくくなるため。
貧血	ピペラジンリン酸塩等のピペラジンを含む成分	貧血の症状を悪化させるおそれがあるため。
全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病	イブプロフェン	無菌性髄膜炎の副作用を起こしやすいため。
「次の病気にかったことのある人」	主な成分・薬効群等	理 由
胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病	イブプロフェン	プロスタグランジン産生抑制作用によって消化管粘膜の防御機能が低下し、胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病が再発するおそれがあるため。
○ 併用薬等		
「次の医薬品を使用（服用）している人」	主な成分・薬効群等	理 由
瀉下薬（下剤）	柴胡加竜骨牡蛎湯、響声破笛丸	腹痛、激しい腹痛を伴う下痢が現れやすくなるため。
「モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人」	ブソイドエフェドリン塩酸塩	モノアミン酸化酵素阻害剤との相互作用によって、血圧を上昇させるおそれがあるため。
「インターフェロン製剤で治療を受けている人」	小柴胡湯、小柴胡湯が配合されたかぜ薬	インターフェロン製剤との相互作用によって、間質性肺炎を起こしやすくなるため。

706

I-3) 関係

707

5-3. 「医薬品・医療機器等安全性情報<sup>ccxlix</sup>」：一般用医薬品に関連する主な記事

解 説 記 事	掲載号	発行年月
濫用等のおそれのある市販薬の適正使用について	No. 365	令和元年8月
医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願について	No. 357	平成30年10月
高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）について	No. 354	平成30年7月
「ハーボニー配合錠」偽造品流通事案と国の偽造医薬品対策について	No. 350	平成30年2月
医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願について	No. 347	平成29年10月
「マイ医薬品集作成サービス」について	No. 346	平成29年9月
「医薬品・医療機器等安全性情報報告書」の報告様式の変更について	No. 332	平成28年4月
子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について	No. 330	平成28年2月
医薬品等副作用被害救済制度の概要と医薬品の使用が適正と認められない事例について	No. 328	平成27年12月
ケトプロフェン（外皮用剤）の妊娠中における使用について	No. 312	平成26年4月
医薬部外品及び化粧品副作用報告制度の改正について	No. 311	平成26年3月
医療機関・薬局における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況等に関する調査について	No. 304	平成25年8月
PMDA 医療安全情報の活用について	No. 299	平成25年2月
「患者副作用報告」の開始について	No. 292	平成24年7月
医薬品による重篤な皮膚障害について	No. 290	平成24年4月
医薬部外品・化粧品の使用による全身アレルギー発症について	No. 288	平成24年2月
医薬品副作用被害救済制度における不支給事例と医薬品の適正使用について	No. 286	平成23年12月
「緊急安全性情報等の提供に関する指針」について	No. 284	平成23年10月
重篤副作用疾患対応マニュアルについて	No. 280	平成23年6月
PMD メディナビを活用した安全対策の推進について	No. 278	平成23年3月
ケトプロフェン外用剤による光線過敏症に係る安全対策について	No. 276	平成23年1月
患者からの副作用報告情報を受ける方策に関する調査研究について	No. 276	平成23年1月
医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度について	No. 273	平成22年10月
重篤副作用疾患対応マニュアルについて	No. 268	平成22年4月
医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度について	No. 262	平成21年10月
医薬品による重篤な皮膚障害について	No. 262	平成21年9月
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品医療機器情報提供ホームページ」で提供している安全性情報について	No. 235	平成19年4月
重篤副作用疾患対応マニュアルについて	No. 230	平成18年11月
医薬品による重篤な皮膚障害について	No. 218	平成17年10月
医薬品による重篤な皮膚障害について	No. 203	平成16年7月
卵巣ホルモン製剤の長期投与と安全性について	No. 197	平成16年1月
医薬品による重篤な皮膚障害について	No. 177	平成14年5月
サリチル酸系製剤の小児に対するより慎重な使用について	No. 163	平成13年6月
医薬品による重篤な皮膚障害について	No. 163	平成12年11月
アリストロキア酸を含有する生薬・漢方薬について	No. 161	平成12年7月
ライ症候群とサリチル酸系製剤の使用について	No. 151	平成10年12月
漢方製剤の間質性肺炎について	No. 146	平成10年3月
塩化リゾチームとアナフィラキシー反応	No. 121	平成5年7月
生薬製剤（漢方薬を含む）による薬剤性肝障害	No. 117	平成4年11月

ccxlix ～平成9年5月：「医薬品副作用情報」、平成9年7月～平成11年11月：「医薬品等安全性情報」、平成12年1月～平成17年3月：「医薬品・医療用具等安全性情報」

漢方薬の副作用	No. 111	平成3年11月
アルコールと医薬品の相互作用	No. 109	平成3年7月
消炎鎮痛剤による気管支喘息発作の誘発	No. 32	昭和53年8月
グリチルリチン酸等による偽アルドステロン症	No. 29	昭和53年2月
<b>重篤な副作用等に関する情報</b>	<b>掲載号</b>	<b>発行年月</b>
一般用医薬品による重篤な副作用について	No. 293	平成24年8月
ガジュツ末・真昆布末含有製剤	No. 217	平成17年9月
一般用かぜ薬による間質性肺炎について	No. 191	平成15年7月
ケトプロフェン外用剤と重篤な接触皮膚炎、光線過敏症について	No. 173	平成14年1月
クレオソート・アセンヤク末・オウバク末・カンゾウ末・チンピ末配合剤と肝機能障害について	No. 165	平成13年3月
<small>ショウサイコトウ</small> 小柴胡湯と間質性肺炎について	No. 158	平成12年1月
カゼイン又はその塩類含有製剤と牛乳アレルギーについて	No. 159	平成12年3月
<small>ショウサイコトウ</small> 小柴胡湯の投与による重篤な副作用「間質性肺炎」について	No. 137	平成8年5月
漢方製剤（ <small>サイボクトウ</small> 柴朴湯、 <small>サイレイトウ</small> 柴苓湯、 <small>ショウサイコトウ</small> 小柴胡湯、 <small>サイコケイシトウ</small> 柴胡桂枝湯）と膀胱炎様症状	No. 123	平成5年11月
インターフェロン- $\alpha$ 製剤及び <small>ショウサイコトウ</small> 小柴胡湯と間質性肺炎	No. 118	平成5年1月
タンナルビン（タンニン酸アルブミン）とアナフィラキシー様症状	No. 110	平成3年9月
<small>ショウサイコトウ</small> 小柴胡湯と間質性肺炎	No. 107	平成3年3月
<b>（参考）PPA関連</b>	<b>掲載号</b>	<b>発行年月</b>
塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する医薬品による脳出血に係る安全対策について	No. 193	平成15年9月
塩酸フェニルプロパノールアミン含有医薬品の適正使用について	No. 163	平成12年11月
塩酸フェニルプロパノールアミン含有医薬品の適正使用について	No. 139	平成8年10月

708

709

710

Ⅱ－1）関係

711

5－4. 企業からの副作用等の報告

○ 副作用症例報告		報告期限		
		国内事例	外国事例	
医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生	使用上の注意から予測できないもの	重篤性		
		死亡	15日以内	
		重篤（死亡を除く）	15日以内	
	使用上の注意から予測できるもの	非重篤	定期報告	
		死亡	15日以内	
		重篤（死亡を除く）： 新有効成分含有医薬品として承認後2年以内	15日以内	
		市販直後調査などによって得られたもの	15日以内	
重篤（死亡を除く）： 上記以外	30日以内			
非重篤				
発生傾向が使用上の注意等から予測することが出来ないもの	重篤（死亡含む）	15日以内		
発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれがあるもの	重篤（死亡含む）	15日以内		
○ 感染症症例報告		報告期限		
		国内事例	外国事例	
医薬品によるものと疑われる感染症症例の発生	使用上の注意から予測できないもの	重篤性		
		重篤（死亡を含む）	15日以内	
	非重篤	15日以内		
使用上の注意から予測できるもの	重篤（死亡を含む）	15日以内		
	非重篤			
○ 外国での措置報告		報告期限		
外国における製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施			15日以内	
○ 研究報告		報告期限		
副作用・感染症により、 <sup>がん</sup> その他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告		30日以内		
副作用症例・感染症の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告		30日以内		
承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告		30日以内		

712

713

714

715

II - 2) 関係

716

5-5. 医薬品安全性情報報告書

別紙1 様式①

<input type="checkbox"/> 医療用医薬品	<b>医薬品安全性情報報告書</b> ☆医薬品医療機器法に基づいた報告制度です。 記入前に裏面の「報告に際してのご注意」をお読みください。		化粧品等の副作用等は、様式②をご使用ください。健康食品等の使用によると疑われる健康被害については、最寄りの保健所へご連絡ください。				
<input type="checkbox"/> 要指導医薬品							
<input type="checkbox"/> 一般用医薬品							
患者情報	患者イニシャル	性別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	副作用等発現年齢 歳(乳児: ヶ月 週)	身長 cm	体重 kg	妊娠 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(妊娠 週) <input type="checkbox"/> 不明	
原疾患・合併症	既往歴		過去の副作用歴		特記事項		
	1.	1.	<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有 医薬品名: 副作用名: <input type="checkbox"/> 不明		飲酒 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 喫煙 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 アルギ <sup>※</sup> <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 その他( )		
副作用等に関する情報	副作用等の名称又は症状、異常所見		副作用等の重篤性 「重篤」の場合、<重篤の判定基準>の該当する番号を( )に記入		発現期間 (発現日 ~ 転帰日)		
	1.		<input type="checkbox"/> 重篤 → ( ) <input type="checkbox"/> 非重篤		年 月 日 ~ 年 月 日		
2.		<input type="checkbox"/> 重篤 → ( ) <input type="checkbox"/> 非重篤		年 月 日 ~ 年 月 日			
<重篤の判定基準> ①:死亡 ②:障害 ③:死亡につながるおそれ ④:障害につながるおそれ ⑤:治療のために入院又は入院期間の延長 ⑥:①~⑤に準じて重篤である ⑦:後世代における先天性の疾病又は異常				<死亡の場合>被疑薬と死亡の因果関係: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明		<胎児への影響> <input type="checkbox"/> 影響あり <input type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 不明	
被疑薬及び使用状況に関する情報	被疑薬(副作用との関連が疑われる医薬品の販売名)		製造販売業者の名称 (業者への情報提供の有無)	投与経路	1日投与量 (1回量×回数)	投与期間 (開始日~終了日)	使用理由 (疾患名、症状名)
			( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			~	
↑ 最も関係が疑われる被疑薬に○をつけてください。 併用薬(副作用発現時に使用していたその他の医薬品の販売名 可能な限り投与期間もご記載ください。)							
副作用等の発現及び処置等の経過(記入欄が不足する場合は裏面の報告者意見の欄等もご利用ください。)							
年 月 日 ※被疑薬投与前から副作用等の発現後の全経過において、関連する状態・症状、検査値等の推移、診断根拠、副作用に対する治療・処置、被疑薬の投与状況等を経時的に記載してください。検査値は下表もご利用ください。							
副作用等の発現に影響を及ぼすと考えられる上記以外の処置・診断: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無							
有りの場合 → ( <input type="checkbox"/> 放射線療法 <input type="checkbox"/> 輸血 <input type="checkbox"/> 手術 <input type="checkbox"/> 麻酔 <input type="checkbox"/> その他( ))							
再投与: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 有りの場合 → 再発: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ワクチンの場合、ロット番号( )							
一般用医薬品の場合: <input type="checkbox"/> 薬局等の店頭での対面販売 <input type="checkbox"/> インターネットによる通信販売 購入経路 → <input type="checkbox"/> その他(電話等)の通信販売 <input type="checkbox"/> 配置薬 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> その他( )							
報告日: 年 月 日 (既に医薬品医療機器総合機構へ報告した症例の続報の場合はチェックしてください。→ <input type="checkbox"/> ) 報告者 氏名: 施設名(所属部署まで): (職種: <input type="checkbox"/> 医師、 <input type="checkbox"/> 歯科医師、 <input type="checkbox"/> 薬剤師、 <input type="checkbox"/> 看護師、 <input type="checkbox"/> その他( )) 住所: 〒							
電話: FAX:							
医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度について <input type="checkbox"/> 患者が請求予定 <input type="checkbox"/> 患者に紹介済み <input type="checkbox"/> 患者の請求予定はない <input type="checkbox"/> 制度対象外(抗がん剤等、非入院相当ほか) <input type="checkbox"/> 不明、その他 ※一般用医薬品を含めた医薬品(抗がん剤等の一部の除外医薬品を除く。)の副作用等による重篤な健康被害については、医薬品副作用被害救済制度又は生物由来製品感染等被害救済制度があります(詳細は裏面)。							

➤ FAX又は電子メールでの報告は、下記までお願いします。両面ともお送りください。  
 (FAX: 0120-395-390 電子メール: anzensei-hokoku@pmda.go.jp 医薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理部情報管理課宛)

717

報告者意見（副作用歴、薬剤投与状況、検査結果、原疾患・合併症等を踏まえ、被疑薬と副作用等との関連性についてご意見をご記載ください。）

検査値（投与前、発現日、転帰日の副作用等と関係のある検査値等をご記入ください。）

検査日						
検査項目(単位)	/	/	/	/	/	/

「報告に際してのご注意」

- この報告制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第68条の10第2項に基づき、医薬品による副作用及び感染症によると疑われる症例について、医薬関係者が保健衛生上の危害発生の防止等のために必要があると認めた場合にご報告いただくものです。医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合や一般用医薬品等の誤用による健康被害の場合もご報告ください。
- なお、医薬部外品、化粧品によると疑われる副作用等の健康被害については、任意の報告となるので、様式②をご使用ください。
- 各項目については、可能な限り埋めていただくことで構いません。
- 報告された情報については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構（PMDA）」という。）は、情報の整理又は調査の結果を厚生労働大臣に通知します。また、原則として、機構（PMDA）からその医薬品を供給する製造販売業者等へ情報提供します。機構（PMDA）又は当該製造販売業者は、報告を行った医療機関等に対し詳細調査を行う場合があります。
- 報告された情報については、厚生労働省、国立感染症研究所（ワクチン類を含む報告に限る）、機構（PMDA）で共有いたします。
- 報告された情報について、安全対策の一環として広く情報を公表することがありますが、その場合には、施設名及び患者のプライバシー等に関する部分は除きます。
- 健康食品・無承認無許可医薬品による疑いのある健康被害については最寄りの保健所へご連絡ください。
- 記入欄が不足する場合は、別紙に記載し、報告書に添付いただくか、各欄を適宜拡張して記載願います。
- FAX、郵送又は電子メールによりご報告いただく場合には、所定の報告用紙のコピーを使用されるか、機構（PMDA）のウェブサイトから用紙を入手してください。  
(<https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html>)
- 電子報告システム（報告受付サイト）によりご報告いただく場合には、機構（PMDA）ウェブサイト  
(<https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html>) をご利用ください。
- 医薬品の副作用等による健康被害については、医薬品副作用救済制度又は生物由来製品感染等被害救済制度があります【お問い合わせ先 0120-149-931（フリーダイヤル）】。詳しくは機構（PMDA）のウェブサイト  
(<https://www.pmda.go.jp/relief-services/index.html>) をご覧ください。また、報告される副作用等がこれらの制度の対象となると思われるときには、その患者にこれらの制度をご紹介願います。ただし、使用された医薬品が抗がん剤等の対象除外医薬品である場合や、副作用等による健康被害が入院相当の治療を要さない場合には、制度の対象とはなりません。また、法定予防接種による健康被害は、予防接種後健康被害救済制度の対象となり、これらの救済制度の対象外となるため、具体的には市町村にお問い合わせいただくようご紹介ください。
- 電子メール、FAX 又は郵送でご報告いただいた場合、施設の住所は安全性情報受領確認書の送付に使用しますので、住所もご記入ください。
- 電子報告システム（報告受付サイト）からご報告いただいた場合、利用者登録された電子メールアドレス宛に安全性情報受領確認書を送付いたします。
- ご報告は医薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理部情報管理課宛にお願いします。両面ともお

718

719



送ってください。

電子報告システム（報告受付サイト）：<https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html>

電子メール：anzensei-hokoku@pmda.go.jp

FAX：0120-395-390

郵送：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

722

（参考）主な情報入手先、受付窓口等

<b>厚生労働省</b>	
厚生労働省ホームページ	<a href="https://www.mhlw.go.jp/">https://www.mhlw.go.jp/</a>
○ 医薬品等安全性関連情報	<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/iyaku/index.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/iyaku/index.html</a>
○ 医薬品等回収関連情報	<a href="https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kaisyu/hyousi.html">https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kaisyu/hyousi.html</a>
○ 健康被害情報・無承認無許可医薬品情報	<a href="https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/musyounin.html">https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/musyounin.html</a>
○ 法令等検索ページ	厚生労働省法令等データベース： <a href="https://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/">https://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/</a> 電子政府の総合窓口 e-Gov： <a href="https://www.e-gov.go.jp/">https://www.e-gov.go.jp/</a>
<b>（独）医薬品医療機器総合機構</b>	
（独）医薬品医療機器総合機構ホームページ	<a href="https://www.pmda.go.jp/">https://www.pmda.go.jp/</a>
医薬品による副作用等の報告	住所：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル （独）医薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理第一部安全性情報管理課 FAX：0120-395-390 電子メール： <a href="mailto:anzensei-hokoku@pmda.go.jp">anzensei-hokoku@pmda.go.jp</a>
救済制度相談窓口	電話：0120-149-931（フリーダイヤル） 受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く） 午前9時～午後5時 携帯電話・公衆電話からは03-3506-9411 （この場合、通話料は相談者側にて負担）
<b>国立医薬品食品衛生研究所</b>	
医薬品安全性情報（海外規制機関情報）	<a href="http://www.nihs.go.jp/dig/sireport/index.html">http://www.nihs.go.jp/dig/sireport/index.html</a>
<b>その他</b>	
医薬品等安全性情報 —（大学病院医療情報ネットワークUMIN内）—	<a href="https://www.umin.ac.jp/fukusayou/">https://www.umin.ac.jp/fukusayou/</a> （大学病院医療情報ネットワークUMIN内） <a href="https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html">https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html</a> （（独）医薬品医療機器総合機構）
日本OTC医薬品協会	<a href="https://www.jsmi.jp/">https://www.jsmi.jp/</a>
日本漢方生薬製剤協会	<a href="http://www.nikkankyo.org/">http://www.nikkankyo.org/</a>
NPO法人 セルフメディケーション推進協議会	<a href="http://www.self-medication.ne.jp/index.php">http://www.self-medication.ne.jp/index.php</a>
くすりの適正使用協議会（RAD-AR） くすりの情報ステーション	<a href="https://www.rad-ar.or.jp/">https://www.rad-ar.or.jp/</a>
医薬品PLセンター	電話：0120-876-532（フリーダイヤル） 受付時間：月～金（祝日を除く） 午前9時30分～午後4時30分 携帯電話・公衆電話からは03-6225-2871 （この場合、通話料は相談者側にて負担） FAX：03-3548-0856 ホームページ： <a href="http://www.fpmaj.gr.jp/PL/pl_idx.htm">http://www.fpmaj.gr.jp/PL/pl_idx.htm</a>
（公財）日本中毒情報センター 中毒110番	電話（一般市民専用）： 大阪 072-727-2499 つくば 029-852-9999 受付時間： 大阪 24時間 年中無休 つくば 午前9時～午後9時 年中無休 ホームページ： <a href="https://www.j-poison-ic.jp/">https://www.j-poison-ic.jp/</a> <a href="http://www.j-poison-ic.or.jp">http://www.j-poison-ic.or.jp</a>

